

825 19124

FLORVM, ET
CORONARIARVM
ODORATARVMQVE
NON NVLLARVM
HERBARVM
HISTORIA,

REMBERTO DODONÆO
Mechlinienſi Medico auctore.



ANTVERPIÆ,
Ex officina Christophori Plantini.
M. D. LXVIII.



SVMMA PRIVILEGIORVM.

CAUTVM est Regio priuilegio, ne quis alius præter Christophorum Plantinum, librum cui titulus est, *Florum & coronariarum odoratarumq; nonnullarum herbarum Historia*, Remb. Dodonæo Mechliniensi Medico auctore, imprimat, vel alibi impressum vendat hinc ad sexennium, sub pœna confiscationis librorum, vt latius patet in litteris datis Bruxellæ 2. Decembris M. D. LXVII.

Subsignat.

De Langhe.

Idem cautum est in Consilio Brabantia, ad totidem annos, & sub pœnis ijsdem, vt in superiori Priuilegio; quemadmodum latiùs patet in litteris datis Bruxellæ 3. Decembris eiusdem anni.

Subsignat.

De Langhe.



CLARISSIMO AC
AMPLISSIMO VIRO,
D. IOACHIMO HOPPERO, AV-
rata militiæ Equiti, Domino de Dalem,
Regis Consiliario, & supplicum libella-
rum magistro, cognato suo; Rembertus
Dodoneus Medicus. S. P. D.



DE FLORIBVS, odora-
tisq; ac corónarijs stirpi-
bus, Clarissime HOP-
PERE, multa nobis di-
cenda occurrerent, si
per omnes dicendi lo-
cos discurrere, & en-
comium scribere cogitaremus: sed id fa-
ciendum non instituimus, abunde esse ra-
ti, vtilitatem eorum & quantum mate-
riæ Medicæ conferant, in hac, ad te, præ-
fatione paucis ostendisse. Nam de inuen-
tione ac origine florum herbarumque: de
amœnitate, quæ hortis, viridarijs, ac om-
nibus

nibus ferè locis ex ijs accedit : aut de ea quæ ex aspectu , odore aut tractatione florum , voluptas animi aut recreatio concipitur, quid refert verba facere? De origine siquidem ac inuentoribus florum herbarumque , multa fabulosa apud Poetas & alios subinde auctores, tam Græcos, quàm Latinos reperiuntur , quæ longum & perquam molestum foret huc referre . Maximum verò ornatum , maximumque decorem, summamque gratiam, hortos hinc accipere , notissimum est . Neque etenim ex vllis quantumvis artificiose contextis , aut coloribus ornatis , topiarijs vel perticalibus scenis , umbraculis aut alijs hortensibus operibus , tantum ornatus his accedit, quantum ex floribus , herbisque odoratis coronarijsue ; absque quibus etiam omnia hortensia opera , ornatu , gratia , & amœnitate destituuntur . Voluptas autem & animi recreatio ex his ipsis, non nisi honestissima esse potest . Ad id enim quod pulchrum honestumque, hominem commonefaciunt . Suggestunt siquidem flores sua pulchritudine, coloris elegatia, formæ præstantia , odoris suauitate ac fragrantia , generosis

nerosis animis honesti pulchrique, & omnium virtutum recordationē. Turpe namque, ut quidam sapiens ait, fuerit, pulchra contemplantem, pulchra tractantem, pulchrisque in locis versantem, non pulchrum aut turpem habere animum. Utilitas porro quæ à floribus materiæ medicæ, & pharmaceuticæ accedit, non exigua aut sterilis, sed fecunda, varia & omnino multiplex est. Profunt vel solo odore, non parum: deinde & alijs suis facultatibus, flores quamplurimum. Odore siquidem spiritus refouent, reficiuntque; collapsas vires redintegrant; torpentem animum non raro excitant; subinde remorantem somnum clemēter conciliant; & inter ea quæ *ὀσφραντὰ* siue odorabilia nuncupantur, principem faciliē locum tenent; faciliē videlicet parabiles & amica naturæ consuetudine familiares. Alia etenim quæ ab Indis, extremoſiue Oriente aut Occidente odorata aduehuntur, nō ita familiaria sunt, sumptuosiora interim, neque cuius statim & promptē parabilia: flores verò horti, & subinde arua sponte etiam suppeditant. Alijs verò suis facultatibus, calfaciendi videlicet, re-

frigerandi, reprimendi, corroborandi, concoquendi, digerendi, discutiendi, resol- uendi, aperiendi, attenuandi, leniendi, & si quæ sunt similes; sic conducibiles flores sunt, vt nulla corporis pars malè affici pos- sit, cui non ex floribus remedium adhibe- ri queat: paucae item compositiones mi- xtaque medicamenta, quæ non flores ali- quos admittant. Capitis doloribus & ple- risque alijs eiusdem morbis, flores mede- lam conferunt. Pulmoni, lateriue dolenti- bus flores præsidio sunt. Ventriculum cor- roborant: aluum laxiorem reprimunt; ean- dem adstrictam laxant & aperiunt. Iocino- ris & Lienis medicamentis flores permis- centur. Si calculi, coli aut vesicæ dolor vr- get, flores præsto sunt. Vteri dolores le- niunt: menses sistunt & citant. Antidotis & alijs compositis medicamentis magna vtilitate admiscentur. Recipiuntur in ca- taplasmata, malagmata, emplastra, vn- guenta, fodus, balnea. Rara absque flori- bus enemata. Oleorum ex floribus multæ compositiones. Condiuntur flores. Fiunt ex floribus tragemata, serapia; elicitor ex ipsis liquor. Vino, melli, aceto, flores vires
com-

communicant. Ita nullam alicui stirpi indidisse facultatem natura videtur, quam non & floribus communem fecerit, & subinde etiam cumulatius contulerit. Et tantum quidem abest, ut florum materia vel ieiuna sit aut sterilis; vel ad medicinam nihil faciat; uti sycophantæ & calumniatores quidam indocti clamitant, qui non modo florum, verum omnium herbarum ac simplicium medicamentorum, adde etiam compositorum notitiam, medico non necessariam opinantur; imò veluti superfluum temerario ausu damnant: ad solos Pharmacopœos eam, aut mulieres rejicientes, & pertinere iudicantes. Qua vel sola sententia se indignos titulo ac nomine medici planè ostendunt. Nam ita coherens stirpium, herbarum & reliquorum simplicium medicamentorum, & multorum compositorum cognitio, alijs artis partibus est, ut nemo verè Medicinæ cognitionem habere queat, qui notitiæ eorum rudis sit & imperitus: ut & nos alibi, & Galenus quoque ipse manifestis verbis scriptum reliquit. Si etenim omnis artifex attis suæ instrumenta cognita & in nume-

rato habere debet , quomodo ea ignorans medicus , ab artis suæ imperitia excusari poterit ? Inter instrumenta siquidem quibus ars medendi in curationibus morborum vitur , ipsæ sunt stirpes earumque radices, cortices , medullæ , folia, flores, fructus, semina, succi , lacrymæ , & quæ sunt alia . Neceßum namque est huiuscemodi medicos sæpenuerò hæsitare , & veluti paladundos diuagari, ac in grauissimos perniciosissimosque errores labi . Veluti non ita pridem in celebri quadam ciuitate medico cuidam , magnifico tamen titulo superbiæti accidisse, à fide dignis accepimus. Præscripserat is cuidam Diagridij drachmas duas; monente autem Pharmacopœo excessum quantitatis esse nimium , & percunctante eo , an pro Diagridio cogitasset Diatragachantes scribere ; responsurus interrogauit an ne idem Diagridium & Diatragachantes esset. Adeò stupidus, omnisque materiæ medicamentorum , atque etiam artis ipsius magnificus iste λογιάτρος fuit : vt quantum inter Diatragachantes arteriacam compositionem , ac Diagridium medicamentum potentissimum bilem per alium

uum subducens, discriminis fuerit, plane ignorauerit. Alius nuper aquam elici voluit ex herba quæ Latinis Thyrsus dicitur (ita siquidem scriptum eius habebat) ipse tamen & multum arrogans, & fastu quodam sibi plurimum in modum placens; persuasumque habens, se omnes quotquot sunt medicos iudicio & eruditione superare, quum tamen serò artem cognoscere cœperit ex pēdotriba medicus factus. Meminisse hunc oportebat Thyrsum non aliquam herbam esse, sed propriè quidem hastam aut facem hederis obuinctam; metaphoricè verò Thyrsos, cuiusvis herbæ cauliculos superiores, in quibus flores gignuntur, appellari. Fuit & olim medicus quidam, qui vbi apud Galenum in compositione quadam Origani Onitidis nomen reperisset, ægrotanti mox cuidam compositionem quandam parauit, quæ Onitidem recipiebat. Hic Pharmacopœo ignoranti qualis herba Onitis esset; & percunctanti, quum non haberet quod responderet; suggerenti an Ononidem putaret; mox annuit, ac pro Origano Onitide, Ononidem substitui permisit; herbam

multum ab Origano Onitide differentem. Atque in tales errores medicos perducit, & stirpium materiæque medicæ imperitia, tum & neglecta ea artis pars, quæ sola propriè Medicinæ nomine appellari meretur: curandorum videlicet morborum ratio ac methodus. Fieri etenim non poterit, ut doctus & in operibus artis versatus exercitatusque Medicus, in huiusmodi errores labatur. Dosim siquidem, iustumque pondus singulorum exactè tenebit: ignota, vana, & quæ in rerum natura non sunt, aut quæ ipsi somnianti vel deliranti occurrerunt, ad vsum ducere non putabit: in veterum compositionibus si vnum aliquod desideretur, non nomine ac appellatione simile, sed viribus ac facultate respondens substituet, alteriusque deficientis loco addet. Ex his quantum stirpium materiæque medicæ notitia, medico sit necessaria, plenè & abundè constare potest: & quàm nihil à nostra professione, aut artis in qua versamur exercitatione peregrinum aut alienum sit, hoc quod tractauimus argumentum: quum inter stirpes, non postremo flores sint loco;
& hu-

& humanis vsibus varijs multisque modis vtilis. Et de florum quidem utilitate hæc satis.

N V N C ad te clarissime ac amplissime Hoppere me conuerto, atque hanc nostram de floribus ac odoratis coronarijsque nonnullis herbis historiam, tibi offero & dedico: non modò diuturnæ nostræ amicitiae veluti pignus quoddam apud te futuram; aut absentis cognati & amici *μνημόσυνον*; sed præcipuè & maximè nonnullæ cōgratulationis ergò. Posteaquam enim te magnis muneribus ac præmijs D. Philippus Hispaniæ &c. Rex Catholicus sibi obstringat ac deuinciat, honoribus nō exiguis augeat; alijque procures & magnates summis fauoribus prosequantur; de his tibi, Historiæ huius nostræ dedicatione, omnino congratulandum, pro ea, quæ inter nos à prima adolescentia coaluit amicitia, putavi: ne videlicet amici & cognati officio defuisse videri possem. Solent siquidem amici, prosperis & lætis amicorum rebus non solum gaudere & exultare, verum & verbis ac factis lætitiā exprimere & ostendere. Prodit igitur Historia
ria

ria hæc nostra , & maximi ac potentissimi Regis fauorem & munera , deinde & aliorum nobilium ac magnorum procerum amicitiam tibi gratulans , omniaque fausta & felicia deprecans . Reliquum foret eam commédare, nisi iamdudum gratam tibi ac iucundam futuram , certus essem. Proinde & ne verbum vllum quidem addo , optans modò , studiosis omnibus vtilem, & æquè ac tibi , acceptam esse posse. Bene vale , clarissime D. Hoppere . Nonis Ianuarij, Anno 1568. Mechliniæ.

R E M-

13

REMBERTI DODONÆI
 FLORVM ET CORONARIARVM
 ODORATARVMQVE NONNVLLA-
 RVM HERBARVM HISTORIA.

DE NIGRA SIVE PURPUREA
 VIOLA. CAP. I.



NIGRA siue purpurea Viola mox à radice fo-
 lia promit, multa, lata, venosa, per ambitum
 leuiter creuata, hederæ foliis rotundiora, te-
 nuiora, nigrioraq; præsertim parte superiore,
 inter quæ medijs, tenues exeunt styli, & in singulis flores
 singuli;

singuli, pulchri, odorati, colore in cœruleo subnigro purpurei, nonnunquam sed raro candidi, ex quinque parvis foliolis compositi, quorum infimum maius; ac deinde pensiles calliculi, qui per maturitatem in tres partes debescunt: semen paruum & in rotunditate oblongum est: radicibus tenuibus ac fibrosis firmatur. viret hyeme pariter ac æstate, frigoris patientissima. locis opacis, iuxta dunos, muros, agrorum hortorumq; margines, pingui solo plurima frequensq; emicat: flores vt plurimum Martio, vbi serius Aprili prodeunt mense.

EST huius generis quedam, florum foliola multiplicans, cum purpurea, tum candida, hortensis utraque.

EST & genus quoddam sylvestre, foliis minoribus, floribus pallidioribus, minus aut non odoratis: nascitur id, & locis quidem opacis, ac secus vias & margines agrorum, verum arido steriliq; solo.

VIOLAM autem Græci ἰὼν, & ἰὼν πορφυροῦν, id est, Violam purpuream nuncupant. Theophrastus verò & ἰὼν μέλαν ἢ μελένιον, hoc est, nigram Violam; à nigricantis purpureæ florum colore. Plinius solam hanc Græco nomine, à cæteris Violis discerni, appellariq; ἰὼν, & ab his Ianthinam vestim dici refert. Officina latinum nomen seruant; at herbam Violariam nominant, & matrem violarum. Germani florem, blau veiel oder Mertzzen violen: Galli similiter Violette de Mars, hoc est, Violam Martiam: Belgæ, violetten dicunt.

ἰὼν autem Græcis vocatum in Geoponicis Nicander credit, vt refert Hermolaus, quod Nymphe quadam Ionia, florem eum Ioui primum dedere muneri. Alij ἰὼν dictum affirmant, quòd cum Io puellam adamatam Iupiter in vaccam conuertisset, terra florem hunc pabulo eius produxerit; qui propter ipsam factus, ab ipsa nomē accepit. Atq; inde etiam

Latinis

Latinis Viola, quasi vitula; extrita littera t dici putatur. Servius Violam Latinis etiam vaccinium, eadem occasione dici refert, locum enarrans Vergilij in Bucolicis:

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.

Vergilius tamē Ecloga 10. Vacciniū à Viola differre ostēdit:

Et nigra Violae sunt, & Vaccinia nigra.

Vitruvius etiam Architecturae libro septimo, Violam à Vaccinio distinguit. Nam ex Viola Silis Attici colorem, ex Vaccinio purpuram fieri elegantem memoriae prodidit. Tinctores, inquit, cum volunt Sile Atticum imitari, Silis Attici Violam aridam coniicientes in vas cum aqua confervescere faciunt ad ignem: deinde cum est temperatum, coniiciunt in linteum, & inde manibus exprimētes, recipiunt in mortarium aquam ex Viola coloratam, & ex ea eretrium infundentes, & eam terentes, efficiunt Silis Attici colorem. Eadem ratione Vaccinium temperantes, & lac miscentes, purpuram faciunt elegantem. Quae autem sint appellata Vaccinia, alio, & suo loco explicabitur.

AD Violas reuertimur, quarum & flores & folia temperiem habent frigidam & humidam. Et flores quidem omnibus internis inflammationibus, laterum potissimum & pulmonis, utiles sunt: pectoris, asperae arteriae, nec non faucium asperitates & scabrities leniunt: iocinoris, renum, & vesicae nimios calores restinguunt: ardentium februm ardorem mitigant: bilis acrimoniam obtundunt: sitim arcent & sedant.

QVOD ex ipsis sit *δραστικόν*, suae vii Actuarius nominat *σπερματικόν*, si ex diluto decoquatur in quo pluries recentes Viola fuerint macerata, aluum lenit, & bilem per inferna educit, trium aut quatuor unciae pondum sumptum.

FIT & ex Violis oleum quod refrigerandi humectandiq; potentia pollet: temporibus illitum, sonnum clementer conciliat,

ciliat, quem calida aut sicca intemperies remoratur: cum omni luteo sedis & hæmorrhoidum dolores mulcet: additur quoque vtilissimè cataplasmatibus refrigerantibus, ac dolorem sopientibus.

SIT autem oleum, in quo Viola macerantur aut ex immaturis Oliuis, Græci ὀμωτρίβες ἢ ὀμπαλίον nominant: aut ex Amygdalis dulcibus, vti Mesues ait: Sint & viola ipsæ recentes humentesq; oportet. Arida etenim iam perperdita humiditate, & minus refrigerant, & caliditatis nonnihil adeptæ videntur.

RECENTIORES aridas violas, medicamentis quæ cor roborare creduntur, vtiliter admisceri sentiunt.

FOLIA Violarum in olerè sumpta, refrigerant, humectant, aluumq; leniunt: foris adnotæ, calidas omnes inflammationes mitigant, cum per se, tum cum polenta imposita. Imponuntur & æstuantis stomacho, & oculis, Galeno teste. Dioscorides sedi etiam excidenti imponi scribit. Crapulam, Plinius ait, & grauedines capitis impositis coronis, olfactuue discutunt: anginas ex aqua potæ.

ID quod purpureum est ex iis, comitialibus medetur; maximè pueris in aqua potum.

SEMEN Scorpionibus aduersatur.

DIOSCORIDES florem purpureum non viola, sed Asteris Attici, cum aqua potum anginis & comitali in morbo pueris, auxiliari scribit. Ex cuius historia, hac perperam Viola apud Plinium accessisse suspicari, & non temere quidem, licet.

Plinij locus
suspectus.

DE TRICOLORE VIOLA. CAP. II.

FOLIA tricolori Viola exigua sunt, ac initio quidem rotundiuscula, deinde oblongiora, per ambitum modicè serrata:



Nota: caules infirmi, tennes, angulosi, geniculati, palmi longitudine : flores longiusculis pediculis insident, purpureæ Viola forma similes, & magnitudine vt plurimum pares,

B

triplici

triplici colore splendentes, purpureo videlicet, luteo, candidoq; vel carulco: quorum elegantia ac varietate colorum, maxime placent, cum odorem exiguum aut nullum habeant. In summis duobus flosculi foliolis, & subinde in inferioris, & quandoque etiam in mediorum extrema parte, purpureus relucet Viola nigra. Medius ut plurimum, ac nonnunquam inferiori candidus aut caruleus insidet. Luteus non raro inferius foliolum vel magnam eius partem, semper autem flosculi mediam, intercurfantibus una nigris aliquot radiolis, occupat. Semen exiguis, in rotunditate oblongis, vasculis, ochri magnitudine continetur, quæ decidentibus succedunt floribus, & ultro semine iam maturo dehiscunt. Radicibus nititur fibrosis. In arvis pluribus locis exit: nascitur & in hortis, & crebro quidem sua sponte, sylvestri speciosior & elegantior. Vere una cum Viola nigra aut paulo post emicat, æstate dein tota & maxima Autumni parte, ac subinde etiam hyeme floret.

IACEA à plerisque nominatur: est tamen & alia iacea quæ nigra cognominatur. Aliis, herba Trinitatis, propter triplicem floris colorem, dicitur. Nonnullis herba clauellata. Galli flores pensees nuncupant, quæ etiam appellatione Brabantis ac vicinis Belgis innotuere. Germani Freyscham kraut/ vnd Drysfelticheyt blumen appellant. Cum φλόγι Theophrasti conuenire videtur, quod φλόξ ἢ φλόγιον etiam dicitur, & flos est tantum sylvestris absq; odore. Vere una cum Viola alba aut paulo post exiens, plurimumq; durans: cuiusmodi hæc tricolor Viola est, quæ vti scripsimus, natura sua sylvestris est atque in odora, & diutine floret. φλόγα nitem siue φλόγιον, Gaza Violam flammicam interpretatur.

QUALITATEM herba habet, frigidam quidem obscuram, sed humidam manifestiorem, lenti glutinosiq; succi,

DE LEVCOIO SIVE VIOLA ALBA. 19

succi, vti *Malua*, particeps : emollientis ea de causa quoque facultatis, verum minus quam illa . Prodest, vt recentiores aiunt, febricitantibus maximè pueris & infantibus, quorum convulsionibus ac comitialis morbi accessionibus subuenire creditur : commendatur item ad pulmonis pectorisq₃ inflammationes, & ad scabiem corporisq₃ pruritus : vlcera quoque glutinare fertur.

DE LEVCOIO SIVE VIOLA
ALBA. CAP. III.

LEVCOII voce plura *Violarum* genera comprehenduntur, quorum in florum quidem colore precipua, sed tamen & nonnulla in foliis differentia . Possunt hæc in duo genera distingui . Vnum genus cui folia candidiora & molliora, candidum *Leucoion*, à foliorum non florum colore quis nuncupauerit . Alterum verò *Leucoion* luteum, à floris colore luteo. Sunt autem candidi *Leucoij* genera, rursus duo: maius videlicet & minus.

MAIORI, canlis est bipedalis aut altior, rotundus, in alus nonnullas diuisus : folia oblonga, candida, mollia, & veluti lanuginem habentia, salicis foliis quodammodo similia, verum molliora : flores odorati, ex quatuor foliolis congesti, secundum cauliculos, superiori parte in tenuibus pediculis exeunt, colore aut rubentes, aut candidi, aut ex purpureo punicei, aut cineri candidiori proximi, subinde varij: siliqua inde sequuntur, oblonga, angusta, in quibus semen latum & rotundum : radicibus nititur fibrosis, sed validis. Floret primo Vere & tota propemodum æstate, altero à satione anno, deinde & aliquot sequentibus, si diligentia & cura adhibitis, hybernis mensibus à frigore arceatur.

MINVS genus à priori, non forma sed magnitudine



sola differt : caules foliaq³ habet similia, sed minora : flores etiam non vnius coloris , sed vel candidos vel rubentes , vel punicantes , vti maioris : siliquas etiam & semina similia. Floret istud genus, non quidem Vere , sed Iunio, Iulio, aut Augusto, & eodem quidē quo satum est anno : hyeme perit.

EST verò & Leucoion, florum foliola multiplicans, sed rarissimum, quod ex maioris genere est, primoq³ Vere florescere incipit, & maiorem curam hybernis mensibus, ne à frigore offendatur, requirit. Seruntur serè in hortis.

PRÆTER hæc , est & sylvestre quoddam candidum Leucoion , humile & paruum, quod in Zelandia locis exit maritimis ; ac iuxta Monspeliiū quoq³, vti Gesnerus scribit.

IAM & Leucoion quoddam etiam est bulbosum , de quo subsequētib⁹ capitibus.

MATTHIOLVS & fruticosam quandam depingit Violam solis latis ; flore Consolida regia, odorato ; caule bicubitali ; ex monte Baldo allatam , & ad se à Francisco Calzolari Pharmacopœo Veronensi missam : arborescētem quam Violam nominat.

APPELLATUR autem λευκός , Latinis quidem Viola alba, Arabibus verò Keyri. Nostri maius genus, stock Violieren nominant ; minus verò , hecete Violieren ; Virumque à canitie foliorum , vti diximus , candidum , ad differentiam lutei, quod præstantissimum est, non improprie dici potest.

FACULTATE autē Leucoia hæc, luteo Leucoio haud dissimilia videntur ; viribus tamen infirmiora.

LVTEO Leucoio caules sunt ramosi virentes , folia oblonga angusta, glabra, in virore nigricantia, Leucoij can-



didit solis minoræ : flores lutei perquam odorati ; siliquæ tenuis oblongæ in quibus semen latum . Totus frutex lignosus hyemis rigorem facile sustinet. Floret Aprili & Maio, & si hyems clemens fuerit, etiam Martio vel prius. In peruetustis muris, in ruderibus & aliis saxosis locis libentius nascitur ; seritur & in hortis iuxta parietes ac muros.

Huius Leucoij quoddam quoque est genus, flore multiplici, cui siliquæ nullæ. Seritur hoc surculis, & in hortis colitur.

λευκόιον & istud Græci nominant, & λευκόιον κίχλινον, Latini Violam albam & Leucoion luteum. Arabibus Keyri est: nostris, steen Violieren. Parietinas aut saxatiles Violas dixeris, & geel Violierē. Germanis geel Violaten. Gallis Giroffles iaulnes.

Est autem Leucoij frutex vniuersus, ut Galenus ait, extergentis facultatis, ac tenuium partium, plus tamen flores: & inter hos, qui sint sicciores, magis etiā quam virides.

Dioscorides lutea Leucoia præcipui in medicina vsus esse scribit ; & huius aridos flores in desensionibus decoctos, ad vteri inflammationes & menstrua ducenda facere : carato exceptos sedis rimas sanare, & cum melle oris aphthas : semen duarum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle subditum, menses, secundas, & fœtus educere: radices cum aceto impositas, lienem reprimere, & podagricis prodesse.

Hippocrates lib. de natura muliebri, ad secundas educendas, & sanguinem ex vteris pellendum, Leucoij semen tritum cum vino bibendum exhibet : & ad eadem lutei Leucoij radicem, eodem quoque modo sumendam tradit.

DE VIOLA MATRONALI. CAP. V.

MATRONALIS Viola folia habet mox à radice longa, lata, subnigra, per ambitum crenata : caules cubi-



tales aut altiores, foliis similibus, sed tamen minoribus circundatos; flores in summis alarum virgis erumpunt, Leucois similes, coloris aut candidi aut rubentis, dilutæ aut purpureæ; semen in siliquis oblongis & rotundis gignitur paruum, figura oblongum, colore in ruffo subnigrum; radices subsunt fibrosæ & validæ. Nascitur in hortis. Altero à quo sata est anno, Maio & Iunio mensibus potissimum floret; non raro tota æstate floris eius productio.

GALLI Violettes des dames, & Girofleees des dames appellant, hoc est, Violas matronales; nostri corrupta voce, **Damas bloemen**. Germani **Winter violen** id est Violas hybernas siue hyemales.

SUNT autem harum Violarum folia gustu quidem acria & calida, Erucæ cuius species videntur, sapore & facultate proxima.

DE VIOLA LATIFOLIA. CAP. VI.

FOLIA, Viola latifolia promit, virentia, lata, per ambitum crenata, Alliariæ vocatæ herba similia, sed maiora: caules rotundos ramosos: flores Leucoij colore purpureos subcaruleos; quos sequuntur latæ, planæ & propemodum rotundæ siliquæ ex tenuissimis mēbris, veluti laminis compactæ; intra quas semina plana, lata, obscuri coloris, forma quodāmodo *διστοβίου* Luna, inter quæ media tertia membrana: radices subsunt crassæ, candidæ, in diversa tendentes, Pæoniæ semina alterius, radicibus quodāmodo similes, sed minores & tenuiores, intus porosæ. Belgæ hanc Violam unā cum aliis in hortis serunt: flores Aprili prodeunt mense, altero à quo sata est anno.

BVLBONAC aut Bolbonac voce barbara vulgo, nos Violam latifoliam, aut vt plerisque placet, Violam peregrin-



nam nūcupare maluimus. Brabantī *Wenincbloemen* à siliquarum forma, denarium quodammodo referente, & *Paeschbloemen* quod circa Paschæ solennitatem ferè semper floreat, nominant. Recentiorum pleriq; Lunariam, alij Lunariam Græcam appellant: vel ab ipsius seminis figura, aut siliquarum media membrana argenteo splendore, quo, decidentibus per summam siccitatem cum semine ex utraq; parte membranis, nitet. Veterum autem *Thlaspi* alterum videtur, quod videlicet à *Cratæa* describitur, à *Thlaspi Cratææ*. nonnullis *Sinapi Persicum* appellatum. Nam ut *Dioscorides* ait, *Cratæas Thlaspi* quoddam recenset *πλατύφυλλον καὶ μεγαλόριζον*, id est, latifolium & magnis radicibus; qualis omnino *Viola* hæc est, quam latifoliam cognominauimus.

HVIC latis folijs & siliquis planis ac rotundis similis est & alia quadam *Viola*, quæ perenni radice nititur, ac hyeme non mærescit. Sunt huic caules lignosi cubitales: folia multa lata, siliquæ planæ & latæ, utraq; paulo minora quàm prioris: flores candidi instar *Violæ matronalis*. Reperitur in hortis; floret æstate.

CÆTERVM facultate ac potentia, *Latifolia Viola* semen calidum quidem, & siccum est, gustuq; acre, *Thlaspi* semini sapore & viribus simile: radices acrimonia quoque nonnullæ sed non multæ participes sunt: eduntur cum acetarijs ut quarundam aliarum.

DE VIOLA MARIANA, SIVE RAPO
SYLVESTRI DIOSCORIDIS.

CAP. VII.

MARIANA *Viola* folia primum habet oblonga, lata, subnigra, aspera, nonnihil hirsuta, vulgaris *Buglossi* folijs nigriora, minora minusque aspera. Caules deinde secundo anno profert rotundos, rectos, ramosos, ali-



aliquantulum etiam hirsutos, circa quos folia similia, sed minora: flores in summis virgis exeunt oblongi, caui, rotundi, per oras incisuris quinque sed non profundius divisi, coloris ut plurimum in caeruleo purpurei, subinde canditantes, in quibus stamina duo aut tria candida; qui & priusquam debiscunt quinquangulares sunt. Post flores capitulum nascitur, superiore parte latius, quinque quoque angulos habens, & quinque loculis veluti caligulis asperis & hirsutis deorsum dependentibus circum vestitum, in quo semen exiguum, subruffi, & eius cuius Castanea fructus echino exemptus propemodum coloris. Radices subsunt longæ, crassæ, candidæ, non ingrati saporis. Nascitur ut alunt in sylvis & montibus, nec non in opacis quibusdam tractibus, ut Matthioli refert, plerisque Italia & Germania locis: apud Belgas in hortis colitur, Iunio, Iulio & Augusto mensibus floris eius productio: semen interea ad maturitatem pervenit; neque enim simul sed particulatim floret.

VIOLAM Marianam nostri appellant, & vulgo Mariettes. Recentiorum plerique Medion esse volunt. Medion
 antem Dioscorides tradit folia habere Seridis, (exemplaria quadam Iridis habent) caulem tricubitalem, & in eo florem magnum, rotundum, purpurascens: fructum parvum similem Cnico; radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Cum qua descriptione Viola mariana non admodum respondet: tamen enim illi flos grandis & rotundus; folium tamen proprie nec Iridis nec Seridis: & fructus aut semen, Cnici semine haud simile. Quas ob causas non Medion, sed potius veram Dioscoridis Rapum sylvestre videtur; ῥογγύλη ἄγρια quæ Græcis dicitur, cum cuius descriptione magis convenit. Nam fruticosa est stirps & ramosa, cuius lobi siue capitula appendentibus aliquot loculis circumtectæ, quibus sublatis interior lobus siue capitulum conspicuum

Dioscori-
dis locus
corruptus.

spicuum est: quale Rapum sylvestre esse, ex eius apud Dioscoridem descriptione satis constat. Quæ tametsi supersuorum quorundam accessione corrupta, Rapo tamen sylvestri propriissima complectitur. Describitur autem Rapum sylvestre à Dioscoride his verbis: ἄγρια γογγύλη φύεται ἐν ἀρούραις, θάμνος πυχναῖος τὸ ὕψος, πολύκλαδος, ἐξ ἄκρου λείος. φύλλα ἔχουσα λεία, δακτύλου τὸ πᾶχος, ἢ ἢ μείζονα. καρπὸν δὲ ἐν λοβοῖς καλυκάδεσιν. ἀνοιχθέντων δὲ τῶν περικαρπίων, ἔσονται ἄλλος κεφαλοειδὴς ἑστὶ λοβός, ἐσὶ σπερμῶτια μέλανα, θραυσθέντα δὲ λευκὰ ἐνδοθεν. id est, Rapum sylvestre, nascitur in arvis, frutex altitudine cubitalis, summa parte lavis: folia habens lenia, digiti latitudine aut maiora: fructuum in lobis calyculatis, quorum involucria cum aperiuntur, alius capituli modo lobus subest, in quibus semina nigra, contrita verò intus candida. In quæ descriptione, quæ de lenitate summorum caulium ac foliorum, & seminis nigredine, ac interiori eius medulla candida traduntur, ad sylvestris Rapi, huius præsertim, descriptionem non faciunt, sed aliò pertinent. Huius siquidem sylvestris Rapi caules aut folia non sunt lenia, sed aliquantulum hirsuta: semen etiam non nigrum, verum subruffum, & castaneis, ut diximus, colore affine. Videntur autem, quæ de lenitate foliorum & summorum partium, Campanule convenire, de qua in sequentibus capitibus, quæ fortè & Rapi sylvestris species habita est: semen verò, quod hic describitur, sativi Rapi est. Ita plurium stirpium descriptiones inter se confuse.

CÆTERVM quod ad facultates atinet, radix Viola Mariana refrigerantis & nonnihil adstringentis est potentia: esui ut aliorum sylvestrium Raporum apta est, & non incommode acetarjjs additur.

DE ALIIS SYLVESTRIBVS
RAPIS. CAP. VIII.

SUNT verò & multa alia Rapi sylvestris genera, Cat-
lathoide florum figura ; & radicibus Viola Mariana band
multum dissimilia.

VNI, quod à Viola Mariana alterum, caules sunt cubi-
tales aut altiores, angulosi, asperi, hirsuti, folia aliquantū-
lum aspera, lata, in acutū desinentia, per ambitum crenata;
vrtice folijs & forma & colore quodammodo similia: flores
secundum caules exeunt, Viola Mariana floribus minores,
per ambitum quinque similiter incisuris, sed profundioribus,
divisi, intus aliquantulum hirsuti, colore aut candidi, aut
dilute purpurei, vel ad caeruleum inclinantes. Nominant hoc
genus Germani *Halskraut*/ Nostri *Halscrut*/ id est,
Latinè *Cervicariam*, & *Cervicariam maiorem*, Græcè *τρυχάδιον*, plerique *vuulariam*, Fuchsius *Campanulam*. Cervicaria
maior.

TERTIUM genus caules habet breviores: folia mi-
nora, candidiora, minus aspera, oblonga, *Salvia* folijs simi-
liora: flores *Cervicariae* minores, colore proximi Viola nigra
dilutam purpuram referentes; radices quoque similes. Hoc
genus plerique *Cervicariani* minorem appellant. Nascun-
tur hæc duo in Germania ac Belgio plerisque aridioribus
locis secus pratorum margines, & crebrò locis senticosis;
transferuntur in hortos, florum gratia: florent Iunio, Iulio
& Augusto mensibus.

HIS autem simile & quartum genus est, caules id sa-
cit breviores: folia lata & *Cervicariae* prioris proxima, mi-
nus tamen aspera, minusq; per ambitum crenata: flores
deorsum pendent, coloris ut plurimum dilute purpure: pro
radicibus, multæ, tenues, transversæ & obliquè serpen-
tes fibræ sunt, à quibus multæ oblongæ, candidæ radice,

Rapum-



Rapunculi radicibus similes demittuntur. Ita facile seipsum propagat & latè serpit hoc genus. Secus aruorum margines in Zelandia & alibi locis maritimis reperitur; floret eodem quo reliqua tempore: Ceruicaria marina nuncupari potest.

QUINTVM genus, vulgo *Rapunculum* nominant, ⁵ caules profert tenues: folia oblonga, angusta: flores *Ceruicaria* minores, caruleo vt plurimum colore: radices candidas, digitalis longitudinis, esui aptas. Exit in aruis multis locis frequens, floret plurima aestatis parte: hybernis mensibus radices leguntur, & cum acetarijs inferuntur. Nominant hoc genus vulgo, vt diximus, *Rapunculum*, quasi paruum *Rapum*: Germani *Rapuntzeln*/ Nostri *Rapponce*/ Galli *Raiponce*.

HORVM omnium flores priusquam adaperiuntur, quinquangulares sunt; completi verò rotundi, & inuersi calathi figuram referunt, staminibus intus candidis; & per circumferentiam quinque incisuras, totidemq; eminentes angulos habent: capitula autem in quibus semen, angularia, superiore parte ampliora, sed nuda, & nullis appendicibus aut loculis siue pericardijs circumtecta, vt sunt *Viola Mariana*; quæ eam ob causam, nempe quòd capitula, siue lobos habeat circumtectos, cum sylvestris *Rapi* descriptione exactius, quàm vllum horum conuenit, quæ tamen & omnia *Rapa sylvestria* sunt.

PRÆTER hæc verò & sextum quoddam genus est, ⁶ superioribus forma aliquantulum differens: huic autem folia primum lata, postea secundum caules angustiora: caules dodrantes, summa parte veluti spicam paruorum florum plenam proferunt, quorum singuli antequàm panduntur, corniculi cuiusdam similitudinem referunt; aperti verò in quatuor angusta foliola finduntur, colore aliàs can-

C didi,

câdi, aliâs cerulei, aliâs purpurei : floribus capitula parua succedunt, rapunculi capitulis ferè similia, verùm minora, multa circa caulem sinuul arcteq₃ composita: radices candidæ, vt aliorum vaporum syluestrium. Gignitur locis syluosis & opacis, pingui lutosq₃ solo. Floret Maio, Iunio & Iulio mensibus. Nonnulli Alopecuron appellant, ab ipsa florum plena spica; quæ iam apertis flosculis, mollis & veluti lanuginosa, vulpiumq₃ candidis propemodum asinilis, ea de causa, videtur. Sed Alopecuros alia omnino est herba, in frumentorum & leguminum historia à nobis descripta.

RADICES porro omnium horum refrigerantis potentia sunt & nonnihil adstringentis: possunt autem omnes vni cum alijs acetarijs edi. Sunt etiam qui Ceruicaria radicum decoctum, aduersus incipientes oris & tonsillarum inflammationes conferre affirmant.

DE VIOLA CALATHIANA.

CAP. IX.

CALATHIANA Viola caulibus exit dodrantalibus, tenuibus: folijs oblongis angustis binis ex aduerso positis: flores & in cauliculorum summo, & è foliorum sinubus prodeunt oblongi, calathœides, sursum hiantes, in ceruleo saturato purpurei, staminibus in medio candidis, Rapi syluestris floribus quodammodo forma similes, quinquangulares similiter nondum completi, & quinque per circumferentiam diuisi, sed minus patentes angustiores & minores: semen exiguum in paruis oblongis capitulis continetur: radices subsunt tenues oblongæ, subinde bifidæ, trifidæ, aut in plures diuisæ, gustu amaricantes. Reperitur aliquando in pratis, frequentius in alijs incultis & iisdem quibus Erica humi-



*humidioribus locis : & in pratis quidem procerior, auctuq̃,
amplior, in ericastris tenuior provenit. Augusto & Septem-
bri floret.*

A P V D nostros vulgo nomen non habet ; sunt tamen qui blaw *Welickens* id est, ceruleum Liliū nuncupent : Ananiensia rura vulgo *Pettimborsa* vocant , *Matthiolo* teste: *Plinio* dicta videtur *Calathiana Viola* , de qua lib. 21 . cap. 6. paucis his verbis: In totum sine odore, minutoq³ folio *Calathiana* (videlicet *Viola*) munus *Autumni* , ceteræ *Veris* . *Ruellius* tamen *Calathianam Violam* ex *Plinio* describens, plura & non ita succisa verba adducit: *Calathiana*, inquit , munus *Autumni* , *Viola ceteræ Veris* ; ea min:to est folio *Violæ alba* non dissimili, in totum sine odore, calathi similitudine, *Autumno* tantum proveniens, tanta coloris pulchritudine , vt ceruleum ipsum , quod imitatur, prouocet: in pratis post ætatem emicat ; *Autumnalem Violam* nominant . Videtur eadem à *Valerio Cordo* *Pneumonanthe* nuncupata, quam Germanicè *Lungen blume* dici refert.

Q V A L I T A T E autem hac *Viola* calida est, *Gentiane*, cuius species nonnullis videtur , facultate quodammodo similis, multo tamen imbecillior. Efficax à recentioribus habetur aduersus pestilentes morbos, & ad virulentorum animalium morsus & ictus.

DE CAMPANVLA. CAP. X.

CAMPANVLÆ due sunt: vna *hortensis* maior, altera *syluestris* minor.

HORTENSIS multa è radicibus terra proxima promit folia, oblonga, angusta, viroris saturi, inter quæ caules assurgunt striati, bicubitales, tricubitales, aut subinde altiores, circa quos folia similia, & flores ad superiores partes, in singulis pediculis singuli, maiores & patetiores quàm *Rapunculi*, campanulis aut tintinnabulis similes, colore vt pluri-



plurimum cerulei, non raro candidi, in quibus & candida aliquot stamina: floribus succedunt capitula, Rapunculi capitibus forma quidem satis similia, sed foraminosa & perforata, in quibus semen perquam exiguum: radices candidæ, tennes, fibrosæ.

- 2 SYLVESTRIS hortensi exceptis primis folijs similia est, sed tamen omnino minor: prima & terræ proxima folia lata sunt & pauca, Viola nigra folijs satis similia, attamen non tam magna: reliqua verò oblonga & angusta; flores similes cerulei, sæpe Rapunculi floribus maiores: radices tennes.

UTRAQUE lacti similem succum præbet, cauliculis & folijs vulnératis, copiosorem tamen sylvestris: flores virtusque nondum completi quinquangulares quoque sunt, & patentes in quinque similiter angulos exerunt, sicuti sylvestrium Raporum; quorum hæc ea de causa species putantur, tametsi radices exigue & quæ edules non habeantur. Prior in hortis feritur: altera passim in Belgio iuxta aruorum & agrorum incultos margines nascitur. Florent Iunio, Julio & Augusto mensibus.

VULGO Campanulas nuncupant, & priorem quidem plerique Belvedere nuncupant: sed Italici Belvedere, Græcorum est Oxyris, cum qua Campanula nihil habet similitudinis. Matthiolus hanc eandem hortensem campanulam Phyteuma esse existimat: at nobis Campanula Iasionæ similior videtur. Phyteuma verò esse Antirrhini sylvestris species, de qua inferius suo loco. Ait etenim Theophrastus *ἰασιώνης* florem unico folio constare, similitudinem autem plurium ostendere, quæ tamen non separentur, & superiorem floris partem angulosam esse. Talis certè huius Campanula flos est, & omnium similiter Raporum sylvestrium (excepto generis sexti) quæ tamen ea de causa Iasionæ esse
affir-

affirmari non possunt; si modò eadem Theophrasti & Plinii est Iasione. Plinius siquidem Iasionem lac ait habere copiosam, quod sola Campanula precipuè fundunt. Dubiter fortasse aliquis, & Campanulam non esse Iasionem existimet, quod Plinius olus esse Iasionem scribat sylvestre, in terra repens, flore candido. Sed si olus est omnis herba edulis, & Campanula olus est, cum eam edi posse non sit dubium: repunt verò & in terra subinde radices, atque ea de causa citissime vna aliqua stirps multiplicatur & ampla sit: florem verò hortensis non rarò candidum esse scripsimus; sylvestris verò & talem alicubi reperiri posse quis negauerit? Constat etenim pro locorum & regionum varietate & florum colores & non rarò stirpium ipsarum figuras aliquo modo immutari. Theophrasti autem de Iasione hæc sunt verba, lib. 1. Iasione vbi de florum agit differentiis: Nonnulli, inquit, vnius folij nascuntur, similitudinem tantum plurium ostendentes, ut flos Iasiones; huius etenim non separatur vllum in flore folium, neque conceptaculo pars inferior eget, superior autem angulosa. De Iasione verò Plinius lib. 22. cap. 22. hunc in modum: Iasione olus sylvestre habetur, in terra repens, cum lacte multo, florem fert candidum, Concilium vocant.

PRÆTER verò duas has campanulas, & tertia quedam humilis & parua est, cui caules tenelli, dodrantes, in alas plures divisi, plurima parte humi decumbentes: folia circa cauliculos parua, per ambitum leniter crenata: flores parvuli, in puniceo purpurei, pulchri, multum patentibus tintinnabulis aut campanulis similes, stamine in medio candido, qui interdum patent; circa verò occasum Solis recluduntur, & in quinquangularem speciem contrahuntur, quam etiam nondum aperti, uti alia Campanula, referunt: radices tenuissima sunt. In agris frumentariis, inter segetes exit, fertili & fecundo solo: Iunio & Iulio floret. Anonymos

nostris est herba ; non esse Onobrychim , quod quandoque suspicati fuimus , satis constat . Campanularum videtur esse species , non tamen Iasiones , cum lac nullum vulnerata fundat .

FACULTATEM autem Campanula cōpertam nullam habent , cum nullius in medicina sint vsus .

DE DIGITALI. CAP. XI.

DIGITALIVM plures sunt species , non modo florum colore , sed & foliorum forma disidentes .

VULGATISSIMA purpurei floris est , cui longa lata per ambitum crenata , dilutè virentia folia , Verbasçi quodammodo similia , minora tamen nimisq^{ue} lanuginosa ; caulis recens rotundus , à medio sursum versus compluribus floribus grauidus , non alternatim , aut orbiculatim , sed ab vno caulis latere supra inuicem , aut vt Græci aiunt , ἐπ' ἀλλήλων dispositis , deorsum versus dependentibus , forma oblongis , intus canis dactylotheçis propemodum similibus , colore ex rubore purpureis , punctis quibusdam candidis intercurrentibus ; quos rotunda sequuntur vascula , in quibus semen exiguum : radices multe tenues fibræ sunt . Plurisque Germaniæ & Belgij locis saxosis & vmbrosis , in montium conuallibus , & vbi ferri & Lithantracon fodinæ vicinæ sunt , sponte exit : transfertur etiam in hortos .

2 ALTERA Digitalis , priori folijs similis est , longioribus tamen ac latioribus : flores huius cum prioris floribus forma etiam conueniunt , colore verò candidi .

3 TERTIA , folia habet angustiora , venosa , glabra , saturato virore nigricantia , auersa tamen parte candidiora , per ambitum nonnihil serrata : flores huic lutei , forma prioribus



ribus ferè similes. Sunt duo hæc genera rarissima, & in paucorum hortis tantum conspicua.

- 4 QVARTA digitalis folia promit tertiae similia, in virore quoque obscuro nigricantia, & candidiora similiter parte auersa, sed minora & angustiora; flores paruos, deorsumq; dependentes, verùm minores, colore sublucos aut pallentes. Apud Belgas satis familiaris & cognita hæc est.

APPELLANT autem Germani quidem hanc stirpem vulgari lingua *Fingherhut* & *Fingherkraut*: Belgæ *Wingherhoet*: Galli, *Digitale*, aut, quidam aiunt, *Gants nostre dame*: Fuchsius appositè Latinè *Digitalem* nuncupauit. Nonnulli *Σφραλλίδα* nominant, & *Verbasci* speciem faciunt, quæ *Λυχνίτις* dicitur. Sed *Lychnitis* siue *Thryallis* folia habet pingua, crassa & hirsuta, ad ellychnia in lucernis apta, qualia minimè digitalis, cuius tam crassa aut hirsuta non sunt, vt ellychnij vicem explere queant.

FACULTATEM autem digitalis quidem folia, cum amara sunt, calidam obtinent & siccam, cum nonnulla abstersione coniunctam, interim tamen nullius sunt vsus, nec medicamenti vllis admiscuntur; flos solus, sola pulchritudine & forma placet gratusq; est.

DE LYCHNIDE CORONARIA.

CAP. XII.

LYCHNIS coronaria folia gerit oblonga, pollicis latitudine aut paulo latiora, mollia, lanosa, cana, *Verbasci* folijs minora quidem, sed candidiora & lanuginosiora; caules cubitales, rotundos, geniculatos, canos quoque & lanuginosos, in plures breues alas diuisos; in quarum summo singuli flores, è calycibus suis, aspectu pulchri, sed inodori, *Viola matronalis* floribus maiores, colore rubro & veluti flammeo fulgen-



fulgentes, subinde sed varius candidi, aut dilutè rubentes, ex foliis ut plurimum quinis, rarissimè senis nec pluribus congesti; nisi floris foliis (quod uti alijs floribus hortensibus, ita & huic aliquando contingit) multiplicatis; in medio florum apices sunt acuti & pungentes: radices subsunt tenues. Seritur in hortis; Italiae, Germania, Gallia, Belgioq; familiaris: Apud Ananenses autem, uti Matthiolus refert, etiam sylvestris, sponteq; exit. Iunio, Iulio ac Augusto aestivis mensibus florum exortus.

NOMINANT huic florem Germani, *Franken roszlin* / *Marië roszlin* / *Marghen roszlin* & *Him mel roszlin*: Latine *Dominarum rosam*, *Marianam rosam*, *Celi rosam* & *celi florem*; Belgæ *Christus ooghen* / id est *oculum Christi*; Galli, *Ocillets*, & *Ocillets Dieu*. Dioscoridi *λυχνὶς στεφανωματικὴ* est, hoc est *Lychnis coronaria*, siue *satina*. *Gaza λυχνίδα* lucernulam conuertit. Videtur eadem & *λυχνίτις* ἢ *λυννίτις* per γ, esse *Verbasci* species, quæ & *Θρυαλλίς*: folia siquidem habet mollia, hirsuta, ad lucernarium funiculos siue *ellychnia* apta, cuiusmodi *Lychniridis* esse Dioscorides testatur: florem item ut plurimum rubentem habet, qualem *Θρυαλλίδος* esse, *Nicander* innuit rubentem eam in *Theriakis* nominans:

ὅσσα τε λυχνὶς ἐνερθεῖν, ἐρευνθεῖς τε Θρυαλλίς.

In quo versiculo *Lychnis* intelligi debet *sylvestris*, ut ipse *Nicandri* interpretes monet, ne *coronariam Lychnida* à *Thryallide* differre hinc quis existimet. *Commodus Gesnerus* hunc *Iouis florem* & Græcè *διδὸς ἄνθος* nuncupari existimat. Sed *Theophrastus* inter *Lychnida* & *Iouis florem*, *διδὸς ἄνθος* lib. 6. distinctionem facit; aestiva sunt, ait, *λυχνὶς*, *διδὸς ἄνθος* & c. & similiter *Plinius*, lib. 21. cap. 11. hæc *Theophrasti* verba referens; succedunt illis aestivi, scribit, *Lychnis* & *Iouis flos* & c. Est autem *διδὸς ἄνθος* siue *Iouis flos*, *flos aestivus*,

astius, coronarius, absque odore; cui radices lignosae; Theophrastus lib. 6. Sunt verò & qui velint *Lychnida*, Plinij *Rosa Gra-*
Rosam Gracam esse, quam refert, non nisi in humidis pro- ca.
 venire, nec unquam excedere quinque folia, *Viola* magni-
 tudine, odore nullo. Porro *Lychnidis* & alia multa repe-
 riuntur nomina, inter notha tamen & supposititia relata;
 dicitur etenim & ἀθάνατος, quasi immortalis, quod diuti-
 nè pulchritudinem suam retineat. Item ἀκυλόνιον, βαλλά-
 ριον siue *Bellaria*, γερανοπόδιον, hoc est *Gruis pes*; κορύμ-
 βιον; & hanc esse *Corymben* Ruellius iudicat, cuius *Colu-*
mella lib. 10. hoc senario meminit:

Nunc veniat quamvis oculis inimica *Corymbe*.

Corymbe.

Coronis etenim, inquit, inserta, igneo micans aspectu, oculorū aciem obtundit. Iam & *Lychnis* hac ταίριον dicitur: alia tamē, idem Ruellius ait, quæ *Taura* siue *Tora* vulgo no- *Tora.*
 minatur, flore caruleo, folio rotundo, radice *Polypodij* bir-
 suta, & vermis nigri effigie; venenosa herba. Nominatur
 præterea & σκῆπτρον, itē μαλδίον, & Latine *Genicularis*.

FACULTATE autem *Lychnidis coronariæ* semen, Galenus ait, calidum est secundo quodammodo ordine, & siccum eodem modo: cum vino potum, à *Scorpione* iclis auxiliatur, auctore *Dioscoride*.

DE LYCHNIDE SYLVESTRI.

CAP. XIII.

SYLVESTRIS *Lychnis geniculatis* caulibus, folijsq; mollibus, *Coronariæ* *Lychnidi* satis similis est; minus tamen cana, aut lanuginosa; folijs item angustioribus, & caulibus tenerioribus, pluresq; alas facientibus; floribus etiam minoribus, colore candidis aut rubetibus; calycibus tamen maioribus, in quibus semen paruum rotundum subnigricans; radicibus longis & digit alis subinde crassitudinis. Iuxta prætorum,



torum, aruorumq; margines, & alibi sua sponte exit; transferitur etiam in hortos, in quibus quandoq; florū foliola multiplicat. Plurima aestatis parte, & in Autumnū vsq; floret.

NOSTRI Menettekens appellant: Germani etiam *Margen roslein* / & *wilde Margen roslein*: item *Ljdweyck* & *widerstosz*: Galli *Ocillets sauuares*: Grecis *λυχνίς ἀγρία*: Latinis *Lychnis sylvestris* dicitur.


SUNT tamen & alia sylvestres appellata & cognominata *Lychnides*, huic haud similes. *Sylvestris* etenim *Lychnis Antirrhinum* quoque auctore *Dioscoride*: & similiter *Leontopetalon* *Apuleio* teste appellatur.

SUNT verò huic *Lychnidi* & alia quoq; quadam nomenclatura, ut: *τραγόναντον*, *ἀτόλιον*, *ιερεκοπόδιον*, *λαμπάς*, & apud Romanos *Intybum* agreste, quæ inter nothas & reiectitias reperiuntur. Ex recentioribus plerique *Saponarium* hanc nuncupant, est tamē & alia *Saponaria*, de qua inferius. Nonnullis etiam *Ocimastrum* esse videtur, at *ὠκισμοειδές* sine *ocimastrum*, *Ocimo* folijs simile est, ramosq; habet breves dodrantes modo, radicemq; tenuem & superuacuum. *Lychnis* verò hac caules promit cubito longiores, folia oblonga *Ocimo* nullatenus similia, & radices longas crassasq;, quæ manifestam contradictionem, & euidentem huius cum *Ocimastro* differentiam ostendunt.

CÆTERVM *Lychnidis sylvestris* semen, duarum drachmarum pondere potum, biliosa per aluum ducit, & à scorpione ictis conuenit: aiunt etiam scorpiones torpescere, & ad ledendum inefficaces reddi, hac herba ipsis apposita: auctor *Dioscorides*.

DE NIGELLAstro. CAP. XIII.

NIGELLAstrum folijs est oblongis, angustis, acuminatis, culmo cubito altiore, rotundo; vtrisque hirsutis
& pi-



& pilosis; flore purpureo obscuro ad puniceum inclinante, *Lychnidis sativæ* simili sed minori; semine nigro, cum asperitate quadam amaro, quod in oblongis capitulis, siue calycibus *vi sylvestris Lychnidis* continetur; radice tenui. In segetibus passim provenit; intra quas Maio & Iunio floret.

GERMANI, *raden/ ratten/ kornrosz/ kornnegele/ Belgæ*, & *Lozenroosen & negelbloemen* appellat: Itali *githone* siue *gitthone*. Vnde plarique similitudine vocis inducti, verum ac legitimum *Gith* siue *Melanthium* esse crediderunt: quos à veritate recessisse notius est quam refelli debeat. A vero siquidem *Melanthio* non solum folijs, sed & alijs proprietatibus differt. Appellatur tamen & *Gith* siue *Melanthium*, à semine nempe nigredine, verum non simpliciter sed cum adiectione aliqua, ad differentiam legitimi *Melanthij*. Hippocrates siquidem *μελάνθιον ἐκ τῶν πυλῶν*, hoc est, *Melanthium* ex tritico. Octavius Horatianus *Gith* quod in segete nascitur ipsum rominat: & eandem ob causam ab huius ætatis doctis, *Nigellastrum*, *Githago*, & *pseudomelanthium* dicitur. Ruellius à Gallis *nielle* & florem *micaucalū* refert appellari, & Theophrasti *ἄνθεμον συλλῶδες* esse indicat. Sed *Anthemion* Theophrasti, *Anthemis* est apud Dioscoridem, & *ἄνθεμον συλλῶδες* siue foliosum *Anthemidis* species, cum *Nigellastro* parū conveniēs.

CÆTERVM *Nigellastri* semen, calidum & siccum secundo est ordine satis intenso: in pessa cum melle subditum inenses evocat; ut Hippocrates in lib. de morbis muliebribus testatur. Octavius Horatianus, semen frictum & tritum ad auriginem bibendum exhibet.

DE CYANO FLORE. CAP. XV.

CYANO flori caules angulosi; folia verò oblonga sunt, acuminata, per oras aliquo modo angulosa, in virore albi-

D cantia;



cantia ; capitula in summo cauliculis rotunda, turbinata, & in angustius se contrahentia ex multis parvis veluti squamis sibi inuicē impositis, conis alicuius parvi modo composita ; è quibus flores erumpunt ex multis quasi sumbris pulchra serie in orbem digesti, colore cerulei ; semen paruum, forma oblongum, laue, splendidum, superiori parte barbatulum, Centauri maioris semini simile, sed minus & candidius, quod in ipsis capitulis sine calycibus, inter eas, quæ in ipsis gignuntur mollibus pilis, reperitur : radices tenues, fibris quibusdam capillatæ. Nascitur in agris frumentarijs, vnà cum tritico, secali, hordeo & alijs frugibus : feritur & in hortis, qui cultura mangonio colorem sepe permutat, modò albicantis, modò purpurei, & eiu, aliàs dilutè rubentis, aliàs ad puniceum inclinantis. Maio vnà cum frugibus florere incipit, deinde Iunio & Iulio floret.

CYANO flori, ab ipso ceruleo colore, nomen veteres dedere. Recentiorum plarique Vernaculam Germanorum appellationem secuti, florem frumentorum nuncupant. Germani etenim *Kornblumen* & *blauw Kornblumen* : & Belgæ similiter *Tozenbloemen* appellant. Galli *Blauoeole*, *Aubifoin*, aut *bluet*, dicunt. Ab Italis fior *Campese*, & *battifecula* siue *baptifecula* nominatur : quasi *Baptifecula*, quòd metentibus & secantibus officiat, reuera in eius occurso salce.

PRÆTER verò & hunc, & alius est *Cyanus maior*, 2 folijs oblongis, pollice latioribus, mollibus, lauginosis, albicantibus, *Verbasci* tamen folijs & minoribus & nigrioribus : cauliculis dodrantalibus : capitulis etiam squamosis vti alterius : floribus quoque similibus & ceruleis, sed ad purpuram nonnihil vergentibus, ac maioribus : radicibus, quæ crassis hereant fibris, & durabilis naturæ, singulis annis regerminant. In syluis & montosis Trago teste reperitur : no-



ftri in hortis ferunt. Aestate floret. Germani wald kornblumen appellant.

CYANVS maior appositè dici potest. Thryallis Verbasci species nonnullis esse videtur, sed Thryallis, vt superius scripsimus, flore rubet.

PORRO facultates horum florum, nondum satis compertæ sunt; cum nullum in medicina vsuri habeant. Videtur tamen Cyanus prior, siue frumentorum flos, refrigerantis nonnihil esse potentiae, atque hinc oculorum inflammationibus posse prodesse; quod à plarisque ei ascribitur.


DE FLORE REGIO. CAP. XVI.

REGIO flori caules exeunt cubito altiores, rotundi, in ramulos complures diuisi; circa quos folia tenuia, multiplici sectione diuisa, Abrotoni folijs maiora, è virore nigricantia: & ad superiores eorundem partes, flores pulchri, ordine & spicatum digesti, quibus à tergo paruum veluti corniculum, angustum & acuminatum veterum calcaris similitudinem referens: colore aut candidi, aut purpurei, aut carulei: siliquæ inde oblongæ, rotundæ, subnigræ; in quibus semen angulosum & nigrum. In hortis & colitur & singulis annis feritur.

EXIT etiam in agris frumentarijs, latiori solo, sylvestris: qui folijs, floribus, siliquis, semine, satiuo similis, humilior tamen; in singulis etiam ramulis flores pauciores, & colore tantum caeruleo.

FLORET vterque æstiuis mensibus; & diutissimè hortensis.

APPELLATUR à Germanis *Bitter sporn*: à nostris *Ridder sporen*/ hoc est, equitis calcar, & Italicè *Sperone de caualliere*: à Gallis *pied d'alouette*, id est,



Pes Alanda: Latine flos equestris, & flos regius: à nonnullis Consolida Regalis, qui hanc stirpem inter consolidas appellatas referunt. Valerius Cordus calcatrippam nominat: sed Ioannes Ruellius calcatrepam siue chaucetrepam, in spinosarum stirpium numero censet. Videtur etiam esse Delphinium, cuius apud Dioscoridem lib. 3. descriptio occurrit, cum quo conuenire potest, si τὸ δελφινοειδὲς non ad folia, sed ad flores contrabatur. Quo modo in vetustis quibusdam exemplaribus legi, memini me olim audiuisse ex Gerardo à Veltvviçk Caroli V. Imp. apud Turcorum Imp. legati, qui sibi Constantinopoli visum exemplar referebat, quod Delphinio, non folia, sed flores Delphinatorum specie esse, haberet. Quae lectio si vera est, florem Regium, Delphinium esse satis euidenter commonstrat. Nam flores quidem & potissimum prius quàm completi sunt, speciem quandam ac similitudinem eorum Delphinatorum exhibent, quos recurua, repandaq; figura, veteres pictura, & nobilium aliquot familiarum auita insignia, exprimunt: quae etiam imagine caelestis Delphin representatur. Neque refert quòd spirituum aut adulterinum de Delphinio caput existimetur, tametsi enim alterius cuiusdam & non Dioscoridis sit; est alicuius tamen veterum, ex quo Dioscoridis libris accessit.

DESCRIBITVR autem Delphinium his verbis: Delphinium. Δελφίνιον κλώνας ἀνίσσει δισπιθάμους ἢ καὶ μείζονας ἀπὸ μιᾶς ῥίζας, περὶ οὓς φυλλάρια ἐπισχισμένα, λεπτὰ ἐπιμήκη, δελφινοειδῆ, ὅθεν καὶ ὠνόμασται, ἄνθος δὲ ὁμοιον λευκὸν ἐμπόρφυρον. σπέρμα ἐν λοβοῖς κέχρησθ' ἐμφορὲς. Deinde inferius & alterum Delphinium. Δελφίνιον ἕτερον καὶ αὐτὸ ἐμφορὲς τῷ ποδὶ αὐτοῦ. τῷ δὲ φύλλοις καὶ τοῖς κλωνίοις ἰσχυρότερον πολλῶν. Quorum verborum hic est sensus: Delphinium surculos emittit duorum dodrantum, aut maiores ab una radice: circa quos folia fissa, tenuia, oblonga, Delphini

specie : vnde & nomen accepit : flos similis Leucoio purpureus : semen in siliquis milio proximum . Delphinium alterum , etiam ipsum simile superiori , sed folijs & tamis gracilius multo .

H A R V M duarum descriptionum prior , voce *Δελφινίου* ad florem relata , mutanda , & hunc in modum legenda veniet . Delphinium furculos ab vna radice emittit duorum dodrantum , aut maiores : circa quos folia fissa , tenuia , oblonga : flos similis Leucoio , purpureus , Delphini specie ; vnde & nomen accepit : semen in siliquis milio proximum .

A T Q V E hoc modo descriptione se habente erit satius flos Regius similis primo Delphinio : sylvestris verò secundo . Sunt verò Delphinio & nomenclaturæ quædam aliæ , sed quarum plurimæ pro nothis habentur , vt *διάχυσις* , *διάχυτος* , *παράλυσις* , *κάμαρος* , *ύάκινθος* , *νήριον* , *νηρειάδειον* , *σώσανδρον* , *κρόνιον* : & apud Latinos , Bucinus siue Bucinum , & Bucinus minor .

S E D vt ad florem regium reuertamur , non desunt , qui & ipsum Cuminum sylvestre alterum Dioscoridis esse velint , quæ Matthioli est sententia , & veritati multum consona . Cum eius siquidem descriptione similitudinis tantum , quantum quæ plurimum habet . Est etenim folijs tenuibus , satiuo cumino satis similibus , & à singulis floribus cornicula in sublime erigit : semen deinde Melanthij proferet : quale sylvestre Cuminum alterum esse Dioscorides tradidit ; ipsum his verbis delineans . *ἔστι καὶ ἕτερον γένος ἀγρίου κυμίνου ἐμφερές τῳ ἡμέρῳ , ἐξ ἐκάστου δ' ἀνδρὺς ἀφίησι κερᾶτια μετέωρα , ἐν οἷς ἐστι σπέρμα ὁμοιον μελανθίῳ* , id est , Est & alterum genus sylvestris Cumini , satiuo simile , ex singulis floribus cornicula sublimia proferens , in quibus semen Melanthio simile .

Cuminum
sylvestre
alterum.

DE CALENDVLA SIVE CALTHA. §7

ET esse potest, ut idem sit Cuminum sylvestre alterum, & pariter Delphinium; præsertim Delphini descriptione accessoria, & ex aliquo alio auctore in Dioscoridis exemplar translata. Crebrò siquidem eadem stirpes, alijs nominibus, à diuersis scriptoribus appellantur.


CÆTERVM sylvestris alterius Cumini semen potum, ad serpentium morsus remedium est optimum: auxiliatur & ijs, qui vrina stitlicidio laborant, calculosis, & his, qui sanguinis grumos mingunt: sed his Apij semen seruefactum postea bibendum est: auctor Dioscorides. Delphini verò semen potum in vino à scorpione ictos, ut nullum aliud, auxiliatur. Aiunt scorpiones apposita herba resolui, ignauosq; ac torpidos fieri; semota verò, sese recolligere.

DE CALENDVLA SIVE CALTHA.

CAP. XVII.

CALENDVLÆ folia dilutè virent, oblonga, aliquantulum lata, mollia, nonnihil lanuginosa: caules foliosi, striati, fungosa intus medulla, in plures alas diuisi: flores in summo pulchri, rotundi, multiplices, cum grauitate quadam aliquantulum odorati, diluti croci aurinæ purioris colore, in quorum medio multa breuia, simul compressa, lutea vel subnigra stamina; semen à singulis floribus numerosum, recuruum: radices fibrosæ. In hortis & cultis prouenit: circa Monspelium etiam sua spontis, Gesnero teste. Ab Aprili aut Maio mense in hyemem vsque floret: qua etiam clementi flos eius emicat.

CALENDVLAM recentior ætas appellat; quòd serè singulis mensium Calendis florere conspiciatur. Germani *Ringelblumen*: Belgæ *Boutbloemen* ab auri amulo floris colore. Galli Soucie & Soulsie. In Herruria, inquit



Matthiolus, Fior rancio. Sunt qui Solsequium vocitent; quia sub vesperam flos contrahatur: non est tamen Heliotropium, multo etiam minus Scorpioides, ut plerique temere crediderunt: sed veterum potius est Caltha. Vergilius etenim & Columella Caltham florem esse ostendunt, luteum aut flammum colore. Et Vergilius quidem in Georgicis egloga secunda, sic scribens:

Mollia luteola pingit Vacinia Caltha.

Columella verò in hortis libro decimo, his verbis:

Candida Lencois & flauentia lumina Calthæ.

PLINIVS autem lib. 21. cap. 6. Caltham etiam grauitèr odoratam esse ait. qualis in totum Calendula est, quæ ut diximus, cum grauitate quadam odorata, & auri colore luteo splendet.

CÆTERVM facultate flos quidem Calendula calidus est, secundo propemodum ordine; præsertim resiccatus & aridus: creditur cor corroborare, venenis resistere, & aduersus pestilentes febres, quocunque modo sumptus, efficax esse. Fuchsius ex vino potum menses ciere, & suffitum secundas educere, scriptum reliquit.

HERBÆ autem folia calidiora sunt, acrimoniā enim quandam feruidam habent, sed quæ propter humiditatem ei coniunctam non protinus se exerit, ratione citius in olere sumpta, aluum mouent & leniunt. Fuchsius succum dentium dolores sedare scribit, si os eo colluatur. Alij ad idem puluerem foliorum cum xylinò dentibus admovent. Sunt etiam qui herbam acetarijs admisceant.

EST verò & alia præter hanc Caltha, Alpina à Ges² Caltha Alpina. nero cognominata; folijs plantaginis, radice acri & aromatica; flore Caltha aureo: nascitur copiose in summis Alpium pratis.

INTER *Calthas* numerandus etiam videtur flos cognomento *Aphricanus*. Huius duæ sunt species; una minor, humilis, ramulis cubitalibus, per terram plurima parte stratis: altera maior, procera & erecta, ad tres vel amplius cubitus assurgens.

FOLIA utrique sunt secundum caules striatos multa, oblonga, ex multis singularibus per ambitus crenatis, coniuncta; tanaceri folijs propemodum similia; quæ cribri modo, soli aut lumini opposita, perforata cernuntur: flores in summis ramorum surculis ex longis calycibus ampli, rotundi, ex octo aut decem foliolis congesti, inferius luteis, superiori verò parte in fulvo rubentibus, & obscure rubens villosum holosericum amulantibus; inter quæ media exeunt stamina lutea: semen nigrum, forma oblongum & tenue: pro radicibus fibræ. Est utraque species, cum folijs, tum floribus graviter odorata. Vtriusque etiam flores, sed maioris frequentius, subinde multiplicantur; quorum foliola ab utraque parte ut plurimum lutea. Apud Belgas, Germanos & alibi, in hortis colitur, & singulis annis feritur. In *Aphrica* plerisque locis sponte provenit: vnde primum in has regiones inuectus: quando videlicet D. Carolus V. Roma. Imp. apud Tunetum celebri potitus esset victoria: ex quo illi & *Aphricano* aut *Tunetensi* cognomen. Minor Iunio, deinde & reliqua æstatis parte: maior Augusto demum mense flores edit.

BRABANTI *Flandriæ*, vulgo *Thunis bloemen* nuncupant. Germani *Indianisch blumen* & *Indianisch negelin* id est, florem aut caryophyllum indicum: vnde & Gallis *Oeilletz d'Inde*. *Cordus Tanacetum Perunianum*



Petilius
flos.

ruuiam appellat : à similitudine videlicet tanaceti & Petri America provincia , ex qua primum in Europam illatus , à Germanis creditus est . Gesnerus Caltham nominat Aphricanam, & Pumca lingua Pedua, ait, vocatur. Sunt qui velint Plinij Petilium esse florem. Sed Petilus flos est autumnalis , circa reptes nascens , tantum colore commendatus, qui est Rosæ sylvestris : folijs paruis quinis ; calyce paruo, versicolore, luteam semen includente. Mirum est in eo flore, inflecti cacumen , & non nisi retorto folia nasci . Plinius lib. 21. cap. 8.

ANDREAS Lacina, Othonnam herbam esse, suspicatus fuit , cum cuius tamen descriptione, haud per omnia flos iste conuenit: nisi forte squalidior, & paucioribus folijs, Erucæ similioribus , manifestiusq; perforatis in Aphrica, quàm in Europa nascatur. In hac etenim amplius, multifolius , folijs Tanaceto , quàm Erucæ similioribus , hisq; non verè perforatis , sed quæ talia luminis opposita tantummodo apparent, gignitur.

ET non tarò quidem euenit, vt ex feruenti, calida siccaq; regione ; & sterili , aut inculto , & aprico solo, in humidius cultiusq; , vbique calum clementius , translata stirpes luxurient . Nam soli caliq; mutatio , ad stirpium mutationem plurimum habet momenti ; & maxime accedente cultura mangonio . Quæ tamen an tantum potuerit , vt florem hunc totum penè transformauerit , expendendum relinquimus.

Othonna.

EST autem Othonna, Troglodytica quadam herba, in eo Arabia tractu nascens , qui ad Aegyptum spectat : έχει δὲ, Dioscorides ait, τὰ φύλλα ἐν ὥμῳ ἐμφορῇ, πολύτρητα ὡς περ σπητιόωπα, ψαφαρά, ὀλιγόφυλλα. αὐτὸς δὲ φέρει κρόκινον, πλατύφυλλον, ὃθεν ἔδοξαν ἀρεμῶνους αὐτὸ τινες εἶδος ἵναί: hoc est, folia habet Erucæ similia ; foraminosa, veluti à tinea

*tineis crofa : squalida : paucifolia : florem fert crocinum ,
latifolium : quare quidam Anemones speciem esse puta-
uerunt.*

GALENVS lib. 4. de simpl. medic. facult. Lycopersi Lycoper-
sium. cuiusdam herbae meminit , cuius succum Centurio quidam ex Barbarica circa Aegyptiū regione comportauerat , odore aded grani, adeoq; inameno, ut ne gustare quidem ipse ausus fuerit Galenus, sed lethalem esse conijceret: utebatur autem eo Centurio ille ad vrgentes articulorum dolores : atq; ipsis etiam laborantibus refrigerandi facultate pollere visus est. Est autem, Galenus ait, colore subflauo : odore tam graui, quā Cicuta : nisi quod leuem quandam instar aromatum odoris adferat gratiam . Nomen herbae ex qua succus hic exprimitur, Lycopersium esse dicebat. Quali autem praeterea sit forma, Galenus non addidit: ideoq; etiam an Lycopersium flos Aphricanus sit, definiri absolute non potest. Videtur tamen illi, si non idem, simillimus. folia etenim, & praesertim flores graui admodum & ingrato praedita sunt odore: qualitateq; venenosa, Cicuta proxima. Cuiusmodi autem eius expressus & resiccatus succus, nondum quidem obseruasse nos confitemur: verosimile tamen est, ex floribus haud alterius, quā flauī aut sublutei coloris, & graueolentem futurum.

VENENOSA autem & refrigerandi potentia, florem Aphricanum donatum esse, odor ingratus, caput aggrauans, Cicuta similis, qualis Lycopersi succo, ostendit: deinde & experimētis nonnullis constat. Memini etenim in puero, qui flores mandere inceperat, labia & os inflata me vidisse; sicuti crebro ijs accidit, qui Cicuta fistulis ludentes aut modulantes, intra labia eas aliquandiu continuerunt. Feli etiam flores cum calycibus, recenti casco permistos olim dedimus, quae mox valde inflata, & paulo post mortua fuit.

Mures

64 DE CARYOPHYLLEIS FLORIBVS.

Mures quoque qui semen arrosant, mortui feruntur reperi. Quæ omnia venenosam & deleteriam huius herba facultatem ostendunt: & non audiendos esse eos, qui hanc Tanaceti vel Artemisiæ speciem, aut innoxiam stirpem fore autuant.

DE CARYOPHYLLEIS FLORIBVS. CAP. XIX.

CARYOPHYLLEORVM florum species quidem sunt complures, armerijs nuncupatis in horum numero repositis; ijs autem relictis dua præcipue: vna maior, altera minor.

MAIORI caules laues, teretes, cubitales sunt aut altiores, geniculari: folia è singulis geniculis bina, oblonga, dura, angusta, per extremum acuminata. colore quasi cæsia: flores speciosi, ex longis, teretibus, denticulatis calycibus, & è senis vt plurimum, qui simplices sunt; ex pluribus verò multiplices, ijsq; lentè sinubriatis commissi; odore admodum suauis & odoratos Indicos caryophyllos referentes; colore aliàs in diluta purpura, aliàs in saturata rubentes, subinde candidi aut ex candido purpurascetes, interdum versicolores; in quorū medio stamini emicant gemini apices candidi: semen in vasculis oblongis paruum & nigrum: radices fibrosæ. Habentur in hortis; sed speciosissimi ferè in fictilibus vasis. Seruntur frequentius anulsi exiguis cum folijs surculis; seminibus rarius. Nam è semine nati, ad agrestem naturam redeunt, floresq; minores, minusq; odorati, & simplices; etiam si prius multiplices, redduntur. Adiguntur subinde surculis cum plantantur fissis Caryophylli; quo illorum odorem flores allicient, & iucundam eorum suauitatem naribus abundantius representent. Viuax est planta, & multis



& multis durat annis, si hybernis mensibus, à frigoris iniuria tuta, in cellis vinarjjs aut alijs similibus locis tepidis asseruetur. Floret diutissimè, tota quidem æstate & Autumno: in cellis etiam interdum, fauente loci tepore, hyeme tamen si rigida.

CARYOPHYLLEVM florem, ab odore Caryophyllorum recentiores nominant: Germanis *Regelblumen*/ *Bratzblumen*: Italis *Garofoli*: Gallis *Oeilletz*, *Ouilletz*. Belgis *Binoffelbloemen* & *Broffels bloemē*/ & Latinè à plerisque *Ocellus*, *Ocellus Damasceus*, *Ocellus Barbaricus*, & *Barbarica* nuncupatur. Sunt etiam, qui *Betoniam*, aut *Vetonicam* sine *Pettonicam* appellent, *altilem* aut *coronariam* cognomento; (*Matthiolus Vettonicum coronarium* dicere maluit) ad differentiam videlicet alterius *Betonica*, quæ Græcis κέσρον καὶ ψυχότροπον dicitur; atque hinc etiam herbam tunicam dictam, hanc esse plerique existimant: sed *Bernardus Gordonius* herbam tunicam *Dioscoridis Polemonium* esse tradidit. *Turnerus Caryophyllen Cantabricam* facit, quæ *Plinius* cap. 8. in Hispania inuentam scribit.

Cantabrica *Cantabris* repertam. Nesciur ubique aut in iunco, pedali; in quo sunt flosculi oblongi, velut calathi: in his semen perquam minutum. *Leonhartus* verò *Fuchsius*, *Vetonicam* siue *Betonicam* alteram esse voluit, quæ inter notha *Dioscoridis* descripta reperitur; & quidem his verbis: Βεττονική

Vettonica
altera. γεννᾶται ἐν χορτοκοπέοις καὶ ὄρεινοις τόποις, καὶ καθαροῖς, καὶ ἡμέροις; περὶ τὰ γεννήματα. ἔχει δὲ τὴν μὲν ῥίζαν ὅλην ἐρυθράν, καὶ εὐώδη. τὰ δὲ φύλλα πράσινα. καὶ τὸ μέσον τῶν φύλλων φοινικεύον. καὶ εἰς τὸ ὀρθοκάλαιμον τριγώνια. καὶ ἐπ' αὐτῶν ἀνθὴ πορφυρεῖοντα: id est, *Vettonica* nascitur in pratis & montanis locis, mundis item & cultis: radicem habet totam rubentem & odoratam: folia porracea, & medium

diu eorum puniceum, in recto calamo triangula, & in ipsis flores purpureos. Ioannes Ruellius Caryophylleum florem incognitum veteribus existimauit; cuius optimum iudicium videtur; nam certè *Vettonica altera*, aut *Cantabrica* parum flos iste similis est. Mirum creditu, ait, ut tam celebris flos, tamq̃ iucundus, fuerit à veteribus silentio prætermisus: qui amplitudine, pulchritudine, varietate, Rosa non inferior videri potest.

ALTERA & minor Caryophylleorum species, priori² tenuibus caulibus folijsq̃, simillima est, vtriusq̃, tamen minoribus: flores etiam habet ex oblongis, paruis & teretibus calycibus similes, verùm minores & per ambitum magis dissectos ac fimbriatos; colore candidos, aut è candore purpurascemes. Apud Belgas in hortis nascitur; Gesnerus autem apud Germanos in pratis humidis eam reperiri refert. Aestate flores emicant.

VETTONICAM altilem siue coronariam minorem, aut alteram nonnulli nominant; Germani *Burwiller* aut *Hochmunt*; atque hinc etiam à plerisque *superba*: Nostri *Bluykens* à flosculorum folijs fimbriatis & plumarum similitudine dissectis; & *cleyn Binooslen* hoc est, Caryophylleum minorem appellant.

VSVS autem Caryophylleorum florum in medicina verè quidem nullus est, in coronis verò propè nimius; & præsertim floris altilis; qui etiam acetum iucundo sapore, & colore, auctore Ruellio, commendat. Fuchsius tamen, non modo ex floribus, quam conseruam vulgò appellant, verùm & radices altilis ad pestis contagia à recentioribus commendari; syluestris verò succum calculo atterendo ac educendo, nec non comitiali morbo laborantibus vtilem credi, scriptum reliquit.

ARMERIORVM florum aliquot etiam species sunt foliorum ipsius stirpis, cum magnitudine, tum colore præcipuè differentes.

PRIMA species cauliculos habet rotundos, geniculatos, veluti Caryophyllei flores, circa inferiora genicula ut plurimum rubentes, cubito breuiores; folia plurima parte oblonga, sed aliquantulum, quàm maioris Caryophyllei latiora, colore herbaceo virentia; flosculos in summo cauliculorum paruulos exiguis Caryophylleis persimiles, verum minores, plures simul in quandam veluti umbellam congestos, particulatim ut plurimum prodeuntes, & semper ferè cocci rubore splendentes, punctis interim candidis circa medium interdum variegatos, rarissimè candidos. Ornat hic flosculus Belgicorum hortorum areas: apud Italos & alibi locis incultis & aridis exit. Gesnerus circa Gryphij lacus ripas in Heluetia à se repertum scribit: provenit & alicubi in Belgio locis desertis, iuxtaq; aruorum & pratorum margines ac scrobes, sed multo quàm in hortis minor & tenuior. Maturè & Aprili sæpe mense aut Maio floret, Caryophylleos flores antecedens: plurima inde æstatis parte viget.

GALLI Armoires & Armoiries appellant: Ruelius Armerios flores hinc nuncupat: Germani **Donder negele**/felt negele: Belgæ **keykens**/quasi dicas fasciculum. florū etenim fasciculos nostri propria lingua **keykens** nominant. Caryophylleorum florum species quadam sylvestris videtur; quam ob causam & à recentiorum quibusdam *Vettonica agrestis* aut *sylvestris* dicitur: nec desunt qui tunicam herbam esse volunt: sed nihilo magis hic, quàm Caryophylleus cum *Vettonica* altera aut *Polemonio* conuenit.

ALTE-



- 2 ALTERA Armeriorum species folia circum caules geniculatos, multo fert latiora, maiora & crebriora, nec non candidiora, Constantinopolitani floris folijs haud multum dissimilia: flores in umbella vna plures simul congesti, pulchri, rubentes, exiguis candidulis punctis ornati, prioribus Armerijs similes sunt. In petrosis collibus & asperis, sabulosis apricisq; locis, apud Germanos & alias nationes nascitur; à Belgis in hortis seritur, vbi secundo anno cum alijs Caryophylleis aestate floret.

GERMANI *Steinnegele* vocant, aliqui *Scarlatam* à rubeo floris colore coccū referente. Et sylvestris hic Caryophylleus est, veluti & praecedēs: vterq; certè nulla cura eget: natura sua viuax, & hyemis iniuriā nō difficulter sustinet.

- 3 IAM & tertia quaedam est Armeriorum florum species cauliculis rotundis, geniculatis, tactu glutinosi, pedis altitudine; folijs ex singulis geniculis binis oblongis angustis acuminatis, in virore candicantibus & quasi castis: floribus in umbella similiter pluribus simul congestis, pulchris, Armerijs similibus, verum minoribus & rubentis diluta purpurea colore: semine in oblongis vasculis pusillo: radicibus tenuibus ac fibrosis. Seritur in hortis. floret à Maio aut Iunio mense in Autumnum vsque, & eodem quo sata est anno.

SUNT qui velint *Limonij* aut *Behen* siue *Been*, vulgo nunc dicti, speciem aliquam esse, propter eam quam cum *Behen* rubentis floris, quod *Matthiolus* *Limonij* speciem facit similitudinem habeat. Nam cauliculis geniculatis & folijs illi aliquantulum sed colore similior est. Caules tamen breviores & teneriores, foliaq; minora; color verò leuitasq; foliorum in vtriusq; ferè eadem. At nos hanc stirpem non *Behen*, aut *Limonium*, sed *Armeriorum* florum speciem aliquam esse autumamus, quam ob causam & tertium ei, inter eos locum fecimus.



- 4 PRÆTER hos verò & alia quadam est, vel Caryophylleorum vel Armeriorum species, omnino, vbiq̃ue, & apud Belgas quoque sylvestris: cauliculos habet dodrantales: folia è singulis geniculis bina, parua, acuminata: flores in cauliculorum summo singulos, per ambitum simbriatos, Caryophylleis minoribus, & forma, & magnitudine satis similes, colore verò cocci diluto rubentes. Exit passim in pratis & locis riguis. Maio & Iunio mensibus flores potissimum conspicui.

BELGÆ *Tracyenbloemkens* appellant, id est, Cornicis flores.

CÆTERVM Armeriorum omnium istorum flores, nec vllum quoque, aut in medicina, aut in cibatu vsum habent: sed coronarij sunt & hortos ac corollas exornant.

DE FLORE CONSTANTINOPOLITANO. CAP. XXI.

CONSTANTINOPOLITANO flori caules sunt è radice plures, bicubitales, tenues, geniculati, inanes: folia è singulis geniculis bina, oblonga, aliquantulum lata, acuminata, obscurè virentia, nonnihil aspera & hirsuta; sicuti & caules: flores in latis vmbellis, multi simul congesti, aspectu pulchri, ceterùm inodori, colore floris *Calendulae*, vel purpurei lilij, siue maturi mali anarantij corticis, subinde candidi: semen in oblongis acuminatis vasculis exiguum & subrussum: radices longæ, in plures tenues diuise, gustu aliquantulum acres. Belgis, peregrinus est slos: seritur in hortis. Iunio & Iulio altero à satione anno floret, deinde pluribus sequentibus alijs. Radice etenim constat viuaci: diuq̃ durat, hyemis & frigoris patiens.

- 2 EST & huius altera & minor species, cubitalis, aut paulo



paulo altior, rarioribus floribus, quæ primo anno flores profert: Gesnero teste.

NOSTRI vulgo Constantinopolitanū appellant florem: Germani verò florem Hierosolymorum: Aldrouandus Creticum cognominat. Sunt qui velint Lanariam nuncupatam Latinis radicem esse, quæ Græcis στρούθιον: Arabibus Condisi dicitur, quæ ad purgandas lanas, qui eas eluunt, olim utebantur; quos veritatem minus assecutos esse evidētius est, quàm ut refelli debeat. Neque enim spinosa aut aculeata huius floris stirps est, quale Struthion esse Theophrastus & Plinius referunt: radicem etiam non habet magnam; aut Oleæ folia, uti Struthio sunt.

Pothus
flos.

NON deerunt autem fortasse, & qui florem hunc Constantinopolitanum, πόθος veteribus dictum florem esse suspicabuntur, quem Gaza Latinè desiderium vocat: quorum sententiæ cur aduersetur, modò non habemus. Pothum enim florem Theophrastus, Plinius, & Athenæus, inter æstiuos reponunt, duorumq; esse generum referunt: vnum hyacintho similem, alterum ἀχρῶν non coloratum siue candidum. Constantinopolitanus autem, æstiuis mensibus floret, & colore vel hyacinthum scriptum, quem purpureum Liliū vocant, proximè refert, vel candidus est. Quæ magnam Constantinopolitani floris cum Potho similitudinem ostendunt.

CÆTERVM flos Constantinopolitanus, præter eam, quam in hortis & coronis gratiam assecutus est, nullum, quod sciamus, medicum vsum habet: facultas eius ea de causa incomperta est.

DE SAPONARIA. CAP. XXII.

SAPONARIÆ, vulgo dictæ, caules sunt glabri, tenues, rotundi, geniculati, cubitales aut altiores: folia lata, venosa,




venosa, plantaginis latifolia folijs simillima, sed tamen minora, è singulis geniculis bina, vt plurimum, & praesertim radicibus viciniora, deorsum reflexa: flores in summo cauliculorum, & circa superiora genicula multi, odorati, colore aliàs pulchro roseo rubentes, aliàs dilutè purpurascents, aut candidi, qui ex teretibus & oblongis calycibus exeunt, ex quinque foliolis commissi; in quorum medio exigua quadam stamina: radices crassa, longae, obliquè serpentes, quibus fibra quadam adherent, veratri nigri radicibus similes. Apud Belgas in hortis colitur: alibi iuxta fluuios & torrentes, locis apricis, sponte nascitur. In hortis, duu durat, & vita est pertinacis. Iunio & Iulio floret.

SAPONARIAM vulgo nuncupant, ab abstergendi potentia, qua folia pollent: succum etenim quendam ex se remittunt, dum confricantur, saponis ferè modo extergentem. Ruellius tamen & aliam quandam saponalem describit. Nonnulli herbam Tunicam appellant: non est tamen Vettonica coronaria, multo minus Polentonij aliqua species; quas pro Tunicis herbis haberi, Cap. de Caryophylleis scripsimus. Videri citius posset Alisma, siue Damasonium, nisi caulis ei crebro, non simplex, sed subinde in alas quasdam diuisus; & radices essent quàm veratri nigri crassiores: folia siquidem habet Alismatis descriptioni conuenientia, & globosam florum in summo caulium congeriem. Sed Alismatis tenuis est caulis & simplex; & radices similiter tenues: qua differentiam Saponaria huius & Alismatis ostendunt.

Alisma.

DESCRIBITVR enim Alisma à Dioscoridè hoc modo: Alisma, sunt qui Alceam, qui Damasonium, qui Acyron, qui Lyron nominant, folia Plantagini similia habet, angustiora tamen versus terram reflexa: caulis tenuis est, simplex, cubito altior, capitula habens, Thyrso similis:



lis : flores tenues , candidi , sublutes ; radices veluti Verratri nigri tenues , odorata , acres , subpingues : loca amaraquosa.

Idem Plinius iisdem penè verbis lib. 25. cap. 10. depingit : sed duo eius statuit genera ; vnum in aquosis , quod quidem à Dioscoride describitur ; alterum in sylvis proueniens , nigrius , ac maioribus folijs . folium etiam ei laciniatum esse ait , quod Dioscorides omisit ; & caulem capite Thyrsi , pro eo quod ille *ῥυρσοειδὲς* enim esse scribat ; qualis sit Thyrsoides caulis sic insinuans : nempe superiore parte & crassior & latior.

Thyrus.

THYRSVS enim siue *ῥύρσος* , virga , fax aut hasta est , frondibus aut hederis obrecta , cuius fastigium pluribus frondibus aut floribus stipatur , instar videlicet globi aut pile . Sic etenim in antiquissimis quæ Romæ passim extant marmoribus depictum reperiri Thyrsum , testis est Melchior Guilandinus in epistola ad Langium ; summo videlicet cacumine globosum quiddam instar pile gestantem . Talem etiam Thyrsum esse , quarundam stirpium & descriptiones ostendunt . Acanthum enim herbam (Brancam vrsinam nominant) Dioscorides *κακὰλὸν ῥυρσοειδὲς* habere scribit ; huius autem caulis cum primum prodit , priusquam integrè adoleuit , summa parte crassior est . Thymus etiam *ῥυρσίου* appellatur , qui in cauliculis globosum capitulum profert : vnde & *κακὰλῶτος* & capitatus cognominatur . *ῥυρσίου* item Orobanche dicitur , caulis cui superiori parte crassior est : Thyrsus , iam & ferula caulis nuncupatur , qui licet sensim extenuetur , summo tamen cacumine umbellam latam & rotundam florum primum , deinde seminum plenam Thyrsi modo promit : vnde & *ῥάβδης* siue ferula , pro Thyrsa subinde dicitur ; atque hinc Bacchus , qui *ῥυρσοφόρος* , etiam aliquando *ῥαβδικοφόρος* appellatur à Thyrsi , qui

in eius

in eius argijs olim quatiebantur. Quæ omnia Thyrsum virgam, baculum aut hastam esse ostendunt; globoso ex frondibus aut floribus cacumine: & *Thyrseidiv* caulem dici; summa parte sphaeroidem aut latiore. Neque repugnat nobis in Saturnalium lib. 1. Macrobius, ubi Liberum patrem cum Thyrsum tenet, latens telum gerere scribit. Nam inde Thyrsum non in exacutum cacumen, sed potius in retusum & globosum apicem desinere colligitur: ex eo enim quod latens telum dicit, ostendit ita cacumen contextum, ut agnoscere non possit; quod quidem multis sit frondibus circum compositis. Verba Macrobij hæc sunt: Colitur apud Lacedæmonios simulachrum Liberi patris, *hæsta* insigne, non Thyrsos: sed cum Thyrsum tenet, quid aliud quam latens telum geritur, cuius mucro hedera lambente protegitur? Et de Thyrsos hæcenus.

QUANDO QUIDEM autem *Alismatis* siue *Dama-*²
sonij mentio incidit, non prætermittenda videbatur peregrina quaedam planta, quam *Damasonium* nonnulli esse existimant, cuius iconem nobis communicavit Ioannes Vrecominus Bruxellensis, sit piæ barbarumq; diligentissimus cultor. Pingitur hæc caule singulari, folijs venosis & *Damasonium*
Plantaginis similibus, flore verò magno, quatuor foliorum, notum.
 dilute rubente, è cuius medio, coniforma quiddam intus ca-
 tum eminet; radice crassa obliqua, à qua tenues fibræ de-
 pendent. Ferunt hanc in vico quodam supra Augustam re-
 periri, appellariq; vulgo *Dapen schoen* ac Latine *Dama-*
sonium. Sed & hæc nihil, aut parum admodum, mul-
 to certè minus quam *Saponaria*, cum *Alismate* siue *Dama-*
sono convenit.

DEPINGIT & *Alisma* quoddam *Marrubiolus*, sed ta-³
 men quod minus quam istud cum vero *Alismate* conveniat:
 neque enim ei solum *Plantaginis* modo nervosum; neque
 caulis

caulis θυρσοειδής; sed vnicum tantum florem proferens, qui à θυρσοειδῇ differens esse videtur.

PORRO Saponaria, calida quidem & sicca est temperie, facultate autem abstergerendi non exigua prædita.

DE AQUILEIA. CAP. XXIII.

AQUILEIA folia fert Chelidonij maioris, paulo tamen rotundiora per ambitum incisa, colore in virore cærulea, quæ ruberata nullum, multò minus luteum, succum reddunt: caulem verò cubitaleni, tenuem, rubentem, & leniter hirsutum; cuius ala singulos proferunt flores, ex quinque dependentibus concavis veluti corniculis, & totidem intermedijs, sursum erectis parvis foliolis, qui simplices sunt, compositi (multiplices etenim ex pluribus corniculis commixti sunt) colore aliàs cærulei, aliàs in rubro purpurei, aliàs candidi vel ex candido purpurascens, subinde varij & ex cæruleo candidoq; permixtis relucens; erumpentibus è medio staminibus, à quibus parvi apices dependent: siliqua post singulos flores quinq; surgunt, in quibus semen paruum, nigrum & splendens: radices subsunt crassæ fibrosa, quæ pluribus annis durant. In Belgij & Gallia hortos infertur: in Germania & alibi, in apricis collibus, sylvestris montibus & pinguibus pratis sponte gignitur. Flores Maio & Iunio vigent.

RECENTIORES Aquileiam aut Aquilinam nuncupant: Germani Agley & Ageley; nostri Akelepen. Galli Ancoiles, ou Ancolye.

QUIBUS autem viribus prædita, nondum satis compertum; nullum siquidem alium usum habet, quàm quòd coronas & hortos exornet. Tragus tamen semen, drachma pondo cum croci obolo in vino, iocinoris obstructione & morbo



morbo regio laborantibus vtiliter dari scribit ; sed eum qui assumpsit diligenter coopertum , sudare deinde oportere. Plurique ei Aegylopiæ , alijs Centaurij maioris vires , sed temperè & citra omnem rationem tribuunt.

DE ANTIRRHINO. CAP. XXIII.

ANTIRRHINO caules sunt rotundi, glabri, fragiles, & ramosi: folia multa vt plurimum oblonga & acuminata, Linariæ similia sed maiora ; subinde breuiora latioraq³, & Anagallidis similiora: flores secundum caules superiori parte ordine digesti, forma oblongi, anteriori parte latiores, dum conclusi, vt nascuntur, permanent rana ori quodammodo similes ; aperti verò biantis leonis rictum referentes ; colore roseo rubentes, aut candidi, vel ex candido dilutè purpurascens, non raro etiam sublutei ; eius videlicet cuius folia sunt latiora & breuiora: quos deinde capitulum sequitur, oblongum, anteriore parte angustius & foraminosum, narium vituli, aut canini capitis similitudine ; in quibus semen paruum & subnigricans : è radicibus non magnis fibræ dependent. In hortis apud Belgas, Italos, Germanos, & alibi feritur. Maio mense, quod hyemem superauit, & reliqua deinde æstate, floret : serius verò & sub æstatis finem, eiusdem anni vere, satum. Hyemem autem, nisi clemens admodum fuerit, aut in cellis vinarijs repositum, absque iniuria in Belgio non sustinet.

GRÆCIS ἀντίρρινον ἢ ἀντίρριζον, si nō vitiosum Theophrasti exemplar, & ἀνάρρινον dicitur : Latinus similiter Antirrhinum. Auctore Galeno etiam βουκράνιον & λυχνὶς ἄγρια, siue Lychnis sylvestris, nominatur. Apuleius etiam ἀμέθυσον, πειθικιον, κυνοκεφάλιον, Canis cerebrum, herbam sinininam, Venuſtam minorem & Opalim gratam, appellat



lari refert. Creditur quoque esse Leo herba, quam inter flores Columella lib. 10. refert. sic scribens:

Narciſſiq; com. 35, & hiantis ſaua Leonis

Ora ſeri.

Item & infra:

Oſcitāt & Leo.

Gefnerus tamen hunc Leonem, Aquileiam eſſe exiſtimauit, quam ea de cauſa Leontoſtomial nuncupauit: ſed hoc nominis Antirrhino magis conuenire, quàm Aquileia, nobis videtur. Nam illius hians floſ, Leonis rictum citius, quàm huius, refert.

EST verò & alius Leo, qui ὄσπρον, & leguminum Leo dicitur, alio nomine Orobanche, de quo in Frumentorum hiſtoria egimus.

EST & alia Amcthyſtos herba, cuius Plutarchus meminit, κατέμεινεν videlicet: de qua alio loco, in Olerum videlicet agetur hiſtoria.

BELGÆ, Antirrhinum, *Orant* appellant.

CÆTERVM Antirrhini ſemen inutile in medicina, vt Galenus ait, eſt. Herba verò ipſa aſſimilis cum Bubonio facultatis, ſed multo minoris.

NARRANT, inquit Dioſcorides, appenſum venetijs aduerſari: & gratiam conciliare, ſi quis eo perunctus ſit cum oleo liliorum, aut Cyprino.

APVLEIVS, radice in aqua decoctum, ſotu epiphoras oculorum, celeriter lenire refert.

DE ANTIRRHINO SYLVESTRI SIVE
MINORI. CAP. XXV.

PRÆTER hortenſe Antirrhinon ſuperiori capite deſcriptum, & aliud reperitur, tota ſua natura ſylueſtre, quod ſatiuo & minus, & humilius eſt, & aliquantulum, ſed tamen modicè hiſutum. Cauliculi huic quoque ſunt tenues,
ramoſi:



ramosi: folia oblonga & angusta: flores autem non ad summum caulis, sed iuxta foliola ex ipsorum sinubus exeunt, Antirrhini similes, sed minores, colore rubro purpureo, in medio lutei. Capitula similiter minora & breviora, foraminosa, hominis calvariæ propemodum referentia, in quibus semen minutum: radices subsunt tenues. Nasquitur multis Belgij & Germania locis, circa margines, & in ipsis agris, iuxta vias, in hortis, & alibi. Et vno quidem loco procerius ac vegetius; alio brevius & tenebrius reperitur. Iulio & Augusto floret, hyeme perit: æstiva enim est herba.

NOSTRI cleyu Quant appellant: Antirrhini autem haud dubie species est sylvestris. Sunt qui velint Orontium esse, similitudine nominis inducti, cuius decocto Archigenes, apud Galenum κατὰ τόπον lib. 9. auriginosos lauandos consulit. Sed an verè ipsum sit, affirmari non potest, eius descriptione nusquam, nec nomine, alibi quàm hoc loco, extante. Quam etiam ob causam, Ianus Cornarius Orontij vocem deprauatam suspicatus est, & legendum esse, Origanum; quod, Dioscoride auctore, in balneo auriginosis prodest.

PLVS similitudinis Antirrhinum sylvestre cum Phyteuma. teumate habet, quod à Dioscoride, his verbis, lib. 4. describitur. φύτευμα φύλλα ἔχει ὅμοια στρουθίῳ, μικρότερα δὲ καρπὸν πολὺν τετραμένον ῥίζαν μικράν, λεπτήν, ἐπιπόλαιον. id est, Phyteuma folia habet similia Struthio, sed minora: fructum multum, perforatum, radicem parvam, tenuem, terræ superficiei inhaerentem. Quæ descriptio Antirrhino sylvestri aptissimè & propriè conuenit. Nam quidem quod ad folia attinet, ea omnino habet Struthij minora: siquidem, vt Plinius ait, Struthium folio est Olea minori; sunt etenim eius folia oleaginis angustiora & minora.

nora. Fructum etiam siue καρπὸν copiosum habet, eumq³ perforatum; quando pro fructu totum illud capitulum, quo semen continetur accipitur, quod non raro, vti & ipsius Antirrhini capitulum, καρπὸς appellatur. De radicibus du- καρπὸς, bitari non potest, quæ tales, cuiusmodi Phyteumati tribuuntur, sunt. Quibus de causis Antirrhinon istud sylvestre verum Phyteuma esse apparet. Matthiolus tamen non Antirrhinum istud, quod olim pro legitimo exhibuit, sed Campanulam pro Phyteumate depingit: de qua superius cap. 10. vbi & improbatæ sententiæ Matthioli, & nostri iudicij rationem indicauimus.

PORRO Antirrhinum istud sylvestre nullius quidem est vsus: si autem verum est Phyteuma, ad amores profuerit. Vt etenim auctor est Dioscorides, Phyteuma ad amatoria philtæ commodum esse perhibetur.

DE LINARIIS. CAP. XXVI.

ANTIRRHINI species quoque quadam videntur, quas Linarias vulgo nominant.

QVAVM vna cauliculos habet bicubitales, complures, rotundos, tenues: folia multa, angustæ, oblonga, lini folijs similia: flores luteos secundum caules iuxta summum, anteriore quidem parte Antirrhini floribus similes, posteriore verò in caudam siue corniculum quoddam desinentes, floris Regij similitudine; quos sequitur capitulum rotundum, in quo semen nigrum: radix longa, tenuis & alba.

ALTERA species huic caule, folijs & floribus similis 2 est: caulibus tamen ferè longioribus; folijs verò angustioribus; floribus parvis, multoq³ quàm alterius minoribus, in ceruleo purpureis, nonnunquam etiam subcandidis aut subluteis; capitulis similiter exiguis, radicibus tenuibus & fibrosis.



NASCITUR prior *Linaria* passim secus agrorum margines, & alijs locis; altera similibus, quibusdam in regionibus exit, sed inuentur rarior. Florent Iulio & Augusto.

UTRAQUE species, *Linaria* nostris dicitur, nonnullis *Vrinalis*. Germanis, *Lynkraut* / *flaschkraut* / *harnkraut* / *onser frauwē flaschz* / *waldt flaschz* / *kröten flaschz*. Belgis *wilt vlas*; Gallis, *Lin lauuage*. Existimatur à multis esse *Osyris*: sed *Osyris* ab hac differens est stirps, ex qua videlicet *νομήματα*, hoc est, scopas hac atate, in Italia componunt: ut & olim Galeni seculo; quam vulgo *Belvedere* nuncupant.

EST autem *Linaria* calida quidem & aliquantulum sicca temperie, & aperiendi potentia prädita; nam, ut & *Rhizotomi* nostri temporis existimant, *vrinas* decoctum eius pronocat. Addunt multi, Regio morbo laborantibus prodesse; quod ab *Osyride* huc translatum est.

DE AMARANTO PURPUREO.

CAP. XXVII.

CAULE *Amarantus* purpureus surgit cubitali, vel altiori, striato, iuxta radicem subinde rubente, lani, in alas quasdam diuiso; circa quem folia oblonga, lata, acuminata, mollia, glabra, colore virentia, aut in virore nonnihil rubentia: pro floribus exeunt spicae, aspectu gratissimae, cæterum inodora, in purpura splendentes, coccum saturatum qui in holoserico villosio micat, referentes, ac quodammodo coloris gratia superantes; quæ in attritu similem ferè colore succum reddunt, & decerptæ diutinè pulchritudinem suam retinent, aliquot etiam annis non marcescentes; vnde & nomen inuenit: Semen maturatis spicis insidet paruum, nigrum, & multum splendens: Radices breues & fibrosæ.



Mirum in eo, Plinius ait, gaudere decerpi, & letius renasci. Alexandrino pabna est, qui decerptus afferuatur. Mirumq; postquam defecere cuncti flores, madefactus aqua reuiuiscit, & hybernas coronas facit.

Αμάραντος quoniam non marcescat, Plinius appellat: nostra etas, Amarantum purpureum, ad differentiam Elicbrysi, quod similiter ἀμάραντος dicitur, de quo inferius suo loco: Germanicè Samatblumen / dausentschoon / floramoz: Nostrate dialecto, flouweelbloemen. Italicè Fior velluto. Gallicè Passe velours, Passiuclutum Ruellius reddit, quo nomine holosericum villosum coccineum Galli nuncupant, cum quo de coloris principatu certat.

EST verò & alia huius species, caule multo proceriore² & crassiore, quatuor aut quinque cubitorum vel altiore: folijs similiter maioribus; cui spicae sunt longiores, sed obsoleti admodum ruboris. Seritur utraq; Amarantus in hortis, sed prior frequentius. Alter enim Amarantus nullam vel omnino exiguan gratiam obtinet.

PROVENIUNT spica Augusto mense, durant in Autumnum. Insipidum vtrumq; olus est, & Bliti species, de quo in Olerum historia, ubi illi suae reddentur vires.

RECENTIORVM plerique Amaranto purpureo, & praecipuè primo, adstringendi cum frigiditate & siccitate potentiam, sanguinisq; omnem fluorem sistendi vires attribunt; quas tamen ei inesse nulla qualitas ostendit, praeter solum fortè colorem, quo spicae rubent. Nam rubra omnia sanguinem vndequaq; fluentem cohibere ac suppressere, quorundam est opinio; eo quòd quaedam sanguinem suppressimentia, talia colore sint. Sed haec opinio vi vana est, ita nullis probabilibus rationibus innititur. Ex coloribus etenim de viribus simplicium & medicamentorum, certi nihil col-
ligere

ligere licet: vt Galenus lib. de simpl. medica. faculta. primo & quarto dilucidè ostendit. Sunt siquidem pleraque rubra etiam calida & aperientia, vti Rubia rubicunda radix, qua & sanguinem per vrinas & menses ducit. Qua de causa & perperam ratiocinantur, qui Amarantum purpureum, sanguinem suppressere, cæliacos & dysentericos adiuvare, ex solo colore iudicant.

DE ROSIS. CAP. XXVIII.

ROSARVM stirps tanetsi fruticosa & spinosa sit, consentaneum tamen & decēs magis est, eam floribus iungere, quàm spinosis fruticibus sociare: principatum siquidem inter flores omnes Rosa facillè obinet, eiusq; in coronis omnibus vsus propè nimius est; & vt ex Anacreonte Teio, Poëta Græco vetustissimo, Henricus Stephanus perquàm eleganti carmine Latino reddidit:

Rosa, honor decusq; florum.

Rosa cura amorq; Veris.


Rosa, calitum est voluptas.

Roseis puer Cytheres

Caput implicat coronis,

Charitum choros frequentans.

SUNT autem Rosa genere quidem permultæ, aut stirpis ipsius magnitudine, asperitate, leuitateue; aut floris foliorum multitudine, paucitateue, vel colore odoreq; differentes. Nonnullæ siquidem procera & excelsa, aliæ breues & humiles: folia quibusdam quina, alijs duodena, vicensue aut plura. Theophrastus etiam ἐκατοντάφυλλαν, siue centifoliam quandam, circa Philippos exire refert: quam incolæ ex Pangæo transferentes serunt: & in Campania, Plinius. Colore item hæc quidem rubentes, illa verò candida: odorata etiam



etiam quàm plurima, absque odore nonnulla. Harum omnium quadam sativa & hortenses sunt; alia verò sylvestres,

RAMI aut potius virgæ omnibus dura, lignosa, merdacibus aculeis horrentes; & sylvestribus quidem spinosiores: folia aspera, per ambitum serrata, ex quinque aut septem ex vno nervo coherentibus: flores è cauliculis fastigijs exeunt, primum herbaceo inclusi calyci, qui tumescens in virides alabastris fastigiatur, quibus paulatim debiscentibus flos panditur, in calycis sui medio, stamina quadam capillacea, luteosq; complexus apices: semen in oblongis capitulis, quæ calycibus & floribus subsunt per maturitatem rubentibus, gignitur durum, lanugine involutum: radices dura, lignosa in diversa tendunt.

- 1 IN sativarum censu, una proceritate caulium siue ramorum, reliquas superat: crassis enim & lignosis suis virgis ad 10. vel 12. pedes, aut etiam altius conscendit: flores candidi, odorati & multorum foliorum, quorum interiora minora; exteriora verò maiora & ampliora.
- 2 PROXIMA magnitudine, virgas habet breviores, sed non minus asperas, Rosas odore suaves, sed dilute & pallide rubentes: Incarnatas Itali appellant.
- 3 TERTIA huic similis ramis & folijs est, sed subinde brevior, flore verò odoratissimo pulcherrimoque, saturato, & quodammodo puniceo rubore nitente; Rosarum omnium præstantissima, & ad medicamenta omnis ferè generis utilissima.
- 4 QUARTA brevior est, virgis bicubitalibus aut altioribus, flore eleganter quidem rubente, sed minus quàm tertiæ, & quandoque simplici, quinque tantummodo foliorum; aliàs plurium: aliquando etiam multiplici; odore grato & perquam incundo.



- 5 **QVINTA** Rosarum hortensis species, ramis & virgis sylvestrem Caninam Rosam quodammodo refert. Rosas profert parvas plures simul coherentes, ut plurimum simplices, aliquando sed raro multiplices: odore admodum fragranti suavisimas, & moschum proximè referentes: unde & Rosa Moschetta ab Hetruscis appellantur.
- 6 **SYLVESTRIVM** ea quidem quæ Canina Rosa vulgo dicitur, & Belgio familiarissima est, aculeatis virgù, & asperis folijs, sutiuis similis est; singulus tamen minoribus: flos simplex quinque folia non excedens, albicans, aut ex albido colore purpurascens. Adnascitur huius virgis aliquando pilula quadam hirsuta, ecbino Castanea quasi similis, at mollis, quam Spongiolam Rosa nuncupant.
- 7 **HVIC** similis est, & alia species, verumtamen aliquantulo minor, cuius virgæ subrubente cortice vestiuntur; flores pallidè rubent, non in totum absque odore: Cinamomina Rosa à quibusdam dicitur.
- 8 **INTER** sylvestres etiam quadam lutei coloris Rosas fert.
- 9 **EST** & parva quadam humillima, virgis spinosissimis: folijs minimis, Rosis perquam exiguis, candidis & suaviter odoratis.
- 10 **IAM** & sylvestris quadam folijs reperitur odoratis: hac proceritate sylvestres omnes sæpè superat. Virgas habet duras, crassas & lignosas: folia splendentia & pulchrè virentia, odore gratissima: Rosas verò parvulus quinquefolias, frequentissimè albicantes, raro purpurascences, exigui aut nullius odoris: fructum oblongum, colore subrubentem, nucleo parva Oliva, & Rosarum aliarum capitulis similem, sed minorem quàm hortensium, in quibus lanosi flocci atque inter eos semen conditum, paruum, & durum. Reperiuntur verò & circa huius tenues virgas, rotunda, molles & hir-

& hirsuta spongiolæ, tales omnino, quales circa Caninæ Rosæ spinas nascuntur. Et totidem quidem Rosarum genera, nostrâ ætate adinueniit.

SUNT verò & apud Plinium lib. 21. cap. 4. multa & plurima suis appellata cognominibus, sed non omnia in rubo, hoc est, spinoso frutice, nata: (nam & ex Maluis flores in Rosarum censu numerantur) quorum quadam cum nostris generibus conuenire, verissimile est; non tamen omnia. Genera eius, nostri, inquit, fecere celeberrima, Prænestinam & Campanam. Addidere alij MileSIam, cuius sit ardentissimus colos, non excedentis duodena folia: Proximam ei Trachiniam minus rubentem: mox Alabandicam vilio rem, albicantibus folijs. Vilissimam verò plurimis; sed minutissimis, spincolam. Deinde paulo infra. Est & quæ Græca appellatur à nostris, à Græcis Lychnis, non nisi in humidis locis proueniens, nec vnquam excedens quinque folia, Viola magnitudine, odore nullo. Est & alia Græcula appellata, conuolutis foliorum paniculis, nec debiscens nisi manu coacta, semperq; nascenti similis, latissimis folijs. Alia funditur è caule maluaceo, folia oleracea habens, Mosceuton vocant. Atque inter has media magnitudine, Autumnalis, quam Coroneolam vocant. Omnes sine odore, præter Coroneolam, & in rubo natam.

SERVNTUR & plantantur Rosæ quidem mitiores & satina apud Belgas, Germanos, Gallos, & alibi, in hortis. Sylvestres multis locis sponte exeunt: & inter has quidem prima, passim circa scrobes, fossas, ad margines agrorum & pratorum; locis humidis prouenit. Lutea in Africa & Aegypto, quam plerique in hortis nunc habent, vti & Cinamominam. Minima spinosissima & asperrima, locis gignitur maritimis, frequens in Morinorum finibus, iuxta Icium portum, in arenosis maris aggeribus. Sed odorata syl-

uestris Rosa hortensis est, nec vsquam in Gallia aut Belgio, quod sciamus, sponte exit.

SERI autem Rosa, uti Plinius ait, nec pinguibus vult, nec argillofis, nec riguis, contenta raris, proprièq; rudera- tum agrum amat: omnis, locis siccis quàm humidis odora- tior. Refert & cali temperies; quibusdam enim annis, mi- nus odorata provenit. Theophrastus odoris colorisq; præstan- tiam locorum etiam ratione contingere affirmat: & odora- tissimas Rosas, quæ apud Cyrenen nascuntur; & proinde vnguentum iucundissimum illic fieri.

NASCITUR verò Rosa ex semine: sed quoniam tar- de perficitur, conciso caule seritur. Omnis recisione & vstio- ne proficit, floremq; melius profert; relicta namq; excrescit & sylvescit. Sapius eam transferre utile est: sic enim pul- chriorem Rosam effundi affirmant: Theophrastus & Plinius auctores.

SERENDARVM autem Rosarum modum, Palla- dius ostendit. Si indigus plantarum, ait, volueris ex paucis virgulis habere copiosa rosaria, quaternorū digitorum sur- culos gemmantes cum geniculis suis debetis excidere, & in modum propaginis sternere, & stercore ac rigationibus ad- iuvare. ubi anni ætatem compleverint, pedis spacio inter se transferre disjunctos, atque ita solum, quod huic generi de- putabis, implere.

FLORENT Rosa; quadam citius, aliæ seriùs, omnes Maio aut initio Iunij mensis. Præcoces Cīnamomina, & aliæ quadam sylvestres: seriores satius sunt. Moschetta mense Augusto etiam secundo florent. Theophrastus, si au- tumnus prolixior fuerit, Rosas etiam denuo erumpere posse testatur.

ROSA Græcis ῥόδον appellatur. Stirps verò ipsa Ro- sarum ῥοδώρια, quæ apud Latinos idem cum flore nomen retinet.

retinet. Dicitur autem ῥόδον, ut Plutarchus ait, ὅτι ῥεύμα πολλὸν τῆς ὀσμῆς ἀφίησι, quod largū odoris effluviū emittat.

MEDIUM floris Rosarum, lutea videlicet stamina & apices, ἄνθος τῶν ῥόδων, & flos Rosa dicitur; officinis Anthera.

FOLIORVM ipsius floris partes candidæ, quibus calycibus inseruntur, ὀνυχες, & ungues appellantur.

CALYX vocatur, qui stamina & floris foliola complectitur ac continet.

ALABASTRI verò sunt calycis partes laciniosæ, communis floris priusquam panditur complectentes; quæ quinque sunt; duæ barbatulæ, duæ imberbes, & quinta partim barbata, partim minimè; cortices Rosarum à plerisque appellantur.

Κεφάλαια καὶ κεφάλια dicuntur capitula, in quibus semen gignitur, quæ scilicet floribus & calycibus subsunt.

VIRGAS stirpis Rosarum, Strabus Gallus in hortulo suo, Viburna nominat, sic scribens:

Viburnum

Iam nisi me fessum via longior indupediret,
Scrupeus atque noui tereretur carminis ordo;
Debueram Viburna Rosa pretiosa metallo
Pactoli, & niueis Arabum circumdare gemmis.

Vergilius tamen & Aurelius Nemesianus, viburnum fruticem aliquem sui generis innuunt, paruum, humilem, lentum & obsequiosum. Ille quidem ecloga prima urbem commendans Romam:

Verum hac tantum alias inter caput extulit vrbes,
Quantum lenta solent inter Viburna Cupressi.

Nemesianus verò ecloga secunda, his carminibus:

Nos quoque te propter Donace donabimur vrbi,
Si modo coniferas inter Viburna Cupressos,
Aut inter Pino's Corylum frondescere fas est:

IN satiuarum Rosarum numero primam, vulgo Rosam albam; Belgæ, witte Roosen: Germani weiß Rosen: Galli, blanche Rose appellant. Potest hac Plinij Spineola Rosa esse, si modo Campana Rosa non est.

2 ALTERA, quam incarnatam Rosam Italia nuncupat, Alabandica similis est: Germani, Liebfarbige Roosen.

3 TERTIA, Prœuincialis Gallis dicitur: hanc, Milesiam esse, non temerè suspicari licet.

4 QVARTAM, Rosas Franchas Gallia, Plinius Trachiniam fortè aut Prænestinam dixerit.

5 QVINTA, Moschata, ab odore, ut diximus, moschi dicta, Coroneola esse potest. Coroneola enim autumnalis est Plinio. Damascenam autem & hanc nonnulli appellant: Itali Rosam moschettam: Galli, Roses musquées ou muscadelles: Belgæ, Musket Roosen.

6 SYLVESTRIS Rosa, Germanis wilder Rosen/heckrosen: Brabantis, wilde Roosen: Gallis, Roses fauuaes: Plinio lib. 8. & 25. κυρόδος & κυρόδα est, id est, Rosa Canina: nonnullis etiam Canina sentis.

QVÆ verò circa ramulos & virgas huius Cynorhodi hirsuta pilula reperiuntur, spongiola sylvestris Rosæ aptissime & propriissime dicta sunt: Officina perperam Bedeguar appellarunt. Nam Bedeguar Arabibus Cardui species, qua Græcis ἀκανθα λευκή, hoc est, spina alba.

7 ALIÆ sylvestres Rosæ, Cynorhodi etiam species quædam sunt; cum ea, quam Cancel rooskens/ id est, Ci-

9 namominam Rosam Belgæ appellarūt; tum & lutea Africana; nec non minima, nostris Dupyrooskens/ hoc est, Duneusis Rosa dicta, ab arenosis sponte natis aggeribus mari oppositis, quos vulgo Dunen nominant.

10 EST verò & Cynorhodi siue Canina Rosa, sed odorata species,

*species, quam nostri Eglantier/aut Aglantier; Galli, Englenterium, Ruellio teste, nominant: qui & hanc sylvestrem Rosam, Cynosbaton, siue Canirubum esse suspicantur. De quo Dioscorides his verbis: κυνόσβατον, αἱ δὲ δξύα- Cynosba-
καυθα καλοῦσι. θάμνος ἐστὶ βάτου πολλῶν μέλινων, δένδρῳ-
δος, φύλλα φέρει πολλῶν πλατύτερα μυρσίνης. ἀκάνθας δὲ
περὶ ταῖς ῥάβδοις ἰσχυράς· ἄνθος λευκὸν· καρπὸν ἐπιμύκη,
πυρρῶν ἐλάσις εὐοικέτα, ἐν τῷ πεπείνεσθαι πυρρὸν· τὰ δὲ
ἐν τῷ ἐριώδῃ: Id est, Cynosbatus, siue Canirubus, quem ali-
qui Oxyacantham vocant, frutex est Rubo longè maior, ar-
borescens, folia fert latiora myrto: spinas circa ramos robu-
stas: florem candidum: fructum oblongum, nucleo Oliuæ
similem, per maturitatem fulvum, interius lanuginosum.*

EXTAT & Cynosbati apud Theophrastū huiuscemodi descriptio: τὸ δὲ κυνόσβατον, τὸν καρπὸν ὑπέστυρον ἔχει, καὶ παραπλήσιον τῷ τῆς ῥόας, ἐστὶ δὲ δένδρου καὶ θάμνου μεταξὺ καὶ παρόμοιον ταῖς ῥόαις, τὸ δὲ φύλλον ἀγλῶδες. (Exemplar vulgare ἀγλῶδες habet, sed Athenæus ex Theophrasto ἀγλῶδες rectius legit) hoc est; Cynosbaton fructum subrubentem habet, & malo Punico similem: est inter arborem & fruticem medium, veluti malus Punica: folium autem splendens.

Theophrasti locus rectus.

CUM harum descriptionum utraque, non malè Canina Rosa odorata conuenire videtur. Nam frutex est Rubo maior, caudices siue virgas habēs crassas lignosas, uti malus punica, vel alia lignosa & arborescens quedam stirps, aculeis & spinis duris munita: folium eius non quidē integrum, sed vnum aliquod singulare, totius folij pars, Myrti folijs latius est, superioreq; parte laue & splendens: fructus nucleo oliuæ similis, qui vbi maturus est, colore est rubente, lanosos floccos & semen intus habens. Quæ omnia huius sylvestris & odorata Rosæ, cum Cynosbato similitudinem ostendunt.

Plinij locus emendatus.

EST verò & alius *Cynosbatus*, quem Plinius lib. 24. cap. 14. describit, quem alij *Cynospaston*, (Cornarius ex veteri exemplari *Cynapauxin* legit) alij *Neuropaston* vocant: foliū habet vestigio hominis simile. Fert & vnam nigram, in cuius acino neruum habet; vnde *Neuropastos* dicitur. Sed huic *Cynosbato*, syluestris odorata (si modò legitima & non corrupta est descriptio) nequaquam similis est, veluti neque *Cappari*, nec *Smilaci aspera*, quarum vtraque etiam *Cynosbatos* à nonnullis appellatur.

SED ad Rosas reuertamur; quarum florum foliola, quia ex diuersis partibus constant, dissimiles etiam facultates obtinent. Insunt etenim eis terrestres quedam & adstringentes; alie humida & aquea: nonnulla spirituose & aërea partes, quae tamen in singulis non similiter se habent. In vno siquidem genere hae: in alio ille excellent. Prædominantem autem omnes frigidam habent temperiem, proximam tamen temperiei mediae, ex primo videlicet ordine refrigerantium.

SUPERANT humida, aërea & spirituose partes, in candidis, dilutè rubentibus, nec non in *Damascenis* siue *Moscbatis*: quas viribus præstantiores *Matthioli* tradit; utpote cuius etiam folia viginti, aluum subducant sumpta. Ex tribus his liquor, ea de causa, elicitur gratissimi ac suauissimi odoris, qui ferè ex alijs Rosis inodorus est.

UTILIS autem Rosarum hac stillatitia aqua, cum ad cordis roborationem & spirituum reparationem, tum etiam ad omnia quae clementer refrigerari postulant. tragematis, placentis, condimentis & alijs, quae voluptatis excitanda gratia conficiuntur multis, eadem admixta, saporis gratiam conciliat: oculorum calidos dolores mitigat: somnum conciliat: quem & ipsa virètes Rosa, odore suo suauiter prouocant.

SUCCVS Rosarum præsertim dilutè rubentium, &
ut non-

vt nonnulli etiam aiunt, saturata purpura nitētium, aluum lenit & subducit.

IDEM præstat earundem dilutum, & quod ex eo coquitur Drosatum siue Serapium; officina syrupum rosatum solutiuum nuncupant, quod ex infuso siue diluto apparari debet, in quo pluries Rosarum virentium folia multa macerata sunt. Ad leniendam autem siue subducendam aluum vtile, quando expurgatione alia potentiori, aut opus non est, aut vti non expedit. Nam præter ea quæ in intestinis herent excrementa, aut in proximis & primis venis cruda, pituitosa & subinde biliosa, alia non educit; si non alijs quibusdam potentioribus medicamentis permisceatur. Hu-mectat autem & refrigerat Serapium istud: ideo etiam februm ardentium calores nimios sedat, & viscerum inflammationes mitigat; sitim extinguit: debili autem & humido ventriculo parum vtile, nam eum laxiorem debilioremq; relinquit.

IN rubentibus Rosis, quæ passim sunt vulgates, & alijs saturata purpureæ, quas Prouinciales appellant, plus est terreæ substantiæ, & resiccantis adstringentisq; facultatis, non tamen absq; humido quodam permixto; quod quidem ipsis adhuc virentibus inest: in resiccatis verò deperditum est. Succus hac de causa, & dilutum earum, ad aluum subducendam quoque facit; minus tamen quàm aliarum prædictarum.

RESICCATÆ autem hæ Rosæ, humiditate iam absumpta, adstringunt & resiccant: refrigerant quoque, sed minus quàm virentes: robur cordi conciliant, ac tremori, & palpitatiōi eius succurrunt: hepar, renes, & alia viscera debilia confirmant: ventriculū flaccidum, debilem & humidum, siccant & corroborant: fluorem muliebrem & superfluam menstruorum purgationem compeſcunt: sanguinis

unde quaque eruptiones sistunt: sudores reprimunt: alium nimio fluore laxam, constringunt: antidotis omnibus vtiliter admiscuntur, & alijs quoque medicamentis, siue foris adhibendis, siue intra corpus assumendis, quibus adstringens ac corroborans aliquod vtiliter accedit.

QVOD ex ipsis sit Rhodomeli, vulneribus, vlceribus, eruptionibus, ac in vniuersum omnibus, quæ abstergi & resiccari postulant, longè vtilissimum est.

OLEVM calores omnes sedat, & inflammationes prohibet, aut iam incipientes mitigat.

FLORES Rosarum, lutea videlicet stamina & apices, resiccant similiter & adstringunt, & potentius quidem, quàm ipsarum Rosarum foliola. Idem possunt calyces & alabastris: sed cum his omnibus odor desit, minus vtilia sunt, humanæq; natura minus amica.

CAPITA Rosarum, Plinio auctore, sanguinem etiam & ventrem sistunt: vngues, epiphoris salubres sunt.

RADIX sylvestris Rosa ad morsum Canis rabidi vnicum remedium, oraculo repertum: vti idem lib. 8. cap. 41. scribit.

SPONGIOLÆ, quæ in medijs eius spinis nascitur, cinere cum melle, Alopecias capitis expleri, idem ait, lib. 25. cap. 2.

FUCHSIVS, spongiolas & capitula sylvestris Rose, contra calculum & vrinae difficultates valere affirmat; si in puluerem trita exhibeantur. Prodesse autem possunt non vt diuretica, aut calculum atterentia; sed veluti alia quadam adstringentia, debiles renes confirmantia: quæ calculosis non raro vtiliora sunt, quàm multa, præsertim potenter, diuretica. Nam talium diureticorum frequentiori aut nimio vsu, & renes multum debilitari & sæpe super calefieri contingit; & calculos non modo non comminui, atteri, aut expelli,

pellī, sed copiosiores & duriores frequenter generari. Quod etenim in sanguine tenue, aqueum & serosum est, segregant: quod verò crassius, cogunt, ac indurari diuretica fortiora faciunt: & similiter etiam alia, frequentiori usu.

DE CISTO, CAP. XXIX.

ROSARVM species & Cistus nonnullis videtur. Eius duo veteres genera fecere; marem & feminam, præter tertium Ledum dictum.

UTERQUE frutex est lignosus, multis alis ramosus; sed tamen humilis, nec admodum procerus, & virgis tenuibus: folia eis sunt lata, aliquantulum rugosa & lanuginosa, propemodum subalbicantia, hortensis aut alterius Salviae folijs modo quodam similia: flores in summo virgularum, veluti parvæ sylvestres Rosæ, fugaces tamen & cito pereuntes; colore mari quidem, in caruleo pene subrubentes, aut purpurei: femina verò candidi: capitula inde rotundiuscula, in quibus semen paruum: radices lignosæ, fissæ, in diuersa tendentes.

EXIT subinde sub ipso frutice ad radices, Limodori Hypocistis quoddam genus, crassum, pingue, carnosum, succo plenum, sine folijs, ex multis veluti Hyosciami vtriculis, aut mali Punica cytini totum constans: colore in vno genere πυρρόν siue ruffo: in altero candido, in quodam etiam χλωρόν, siue virenti, aut herbaceo: vt Dioscorides ait.

NASCITVR Cistus in Italia, Hispania, Narbonensi Gallia, ac in alijs multis calidioribus Europa prouincijs, aridis & saxosis locis: & in vna quidem regione crebrioribus folijs, in alijs rarioribus, alibi candidioribus mollioribusq;, in plarisque minus candidis, minusq; pilosis. Mu-



tationem enim aliquam , pro regionum diuersitate Cistus quoque recipit. Floret æstiuis mensibus.

Κίστον ἢ κίστον Græci appellant, nonnulli κίσσαρον, alij κίσσαρον. Latinis similiter Cistus, & Rosa syluatica dicitur, à quibusdam etiam Rosa Canina, vt Scribonius Largus refert. E radicibus exiens limodorum, ὑποκιστὶς vocatur; quoniam sub Cisto proueniat. A nonnullis ῥόζον, aut ῥοζόνιον. Ab alijs κόνις, inter quos Paulus est Aegineta; qui etiam non illud, quod Cisto subnascitur, sed huius succum hypochistida appellat: vnde manasse potest hypoquistidos vox, qua officina succum hunc barbarè nominant.

FACILITATE porro Cistus, vt Galenus ait, non instrennuè desiccatur, secundi propemodum ordinis resiccantium: adeò verò frigidus est, vt tepidi caloris sit particeps. Folia & prima germina trita tantum desiccant, adstringuntq; , vt vlcera glutinare valeant. Flores magis sunt efficares, adeò vt cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusq; ac humiditates sanent: cataplasmatibus modo illita, putredinosa ipsorum vlcerum iuuant. Dioscorides, ρομάς, id est, vlcera depascentia illitu cohibere, & cum cera ambustis, veteribusq; vlceribus mederi tradit.

HYPOCISTIS multo magis adstrictoria est, efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, vt sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, caliacos, dysentericosq; affectus. Quin si partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac firmitatem illi non segniter addit. Sic sanè stomachicis, hepaticisq; epithematis admiscetur; & ex viperis Theriaca inditur, nimirum quo corpora confirmet ac roboret: Galenus.

DE CISTO LEDO, ET LADANO.
CAP. XXX.

CISTVS Ledon, frutex est parvus Cisto affinis, sed folijs longioribus, nigrioribus, & glutinosis: flores parvi exiguis rosis persimiles, colore candidi. Contrahunt folia pingue quoddam resinosum & odoratum, & tempore quidem, ut Dioscorides ait, vernali; sed, ut Petrus Bellonius, αὐτόπῃς, in medijs æstatis & Canicularium dierum ardentissimis feruoribus: quod non absque singulari cura & diligentia, nec minori industria, ab ipsis stirpibus nostra ætate colligitur: non ex caprarum aut hircorum barbis vilisue depergitur, collectum colatur, & in massas formatum in medicina vsus reconditur. In Creta insula, eodem Bellonio teste, passim locus incultis Ledon exit: reperitur & in Cypro, Plinio auctore.

Λήδον κὶ λάδον ipse frutex dicitur, & Cisti species est. Pingue verò quod ex folijs colligitur λάδανον κὶ λήδανον: Latini Græcas voces seruant: officinæ corruptè Lapdanum enunciant. Maxime probatur Dioscoridi odoratum, ὑπόχλωρον, siue subuiride, facile mollescens, pingue, non arenosum, nec citò fragile, sed resinosum.

PRIMO excessu completo calidum est, Galenus inquit, habens etiam adstrictionis paululum: ad hæc substantia tenui, ac proinde emolliens, pariterq; moderatè digerens, ac videlicet etiam concoquens. Itaque mirandum non est, si peculiariter ad vteri vitia conueniat, quandoquidem ad dicta paulum quiddam adstrictionis obtinet: quocirca etiam defluentes capillos retinet. Nam quicquid ad radices eorum prauum humoris resederit, id omne absumit; tum meatus quibus infixi sunt, contrahit.

VIM habet, Dioscorides ait, adstringentem, calfacientem,

tem, mollientem, aperientem: defluos capillos continet, cum vino, myrrha, & oleo myrtino admixtum: cicatrices pulchriores efficit cum vino illitum. Medetur aurium doloribus cum hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secundas eijcit: duritias vteri pestis immixtum curat. Medicamentis dolorem sopientibus, aduersus tuſſim facientibus, & malagmatis vtiliter admiscetur. Alium sistit, cum vino vetere potum: & vrinam cit.

REPERITVR porro Ledo similis quadam, sed minor Flos Solis. stirps, subinde, nisi pedamentis quibusdam fulciatur, quasi repens: cauliculi ei sunt numerosi tenues & graciles: folia oblonga, Ledi minora, carnosâ, leniter hirsuta, quibus lentus inest succus: flores exigui, veluti paruula quadam Rosa, sed minores: pares forma & magnitudine Argentine, siue Potentillæ dictæ, floribus; colore lutei aut candidi: radices tenues, lignosæ, rufescentes. Nascitur asperis, siccis & apricis, tam campestribus quàm montanis locis. Aestiuus mensibus floret.

TRAGVS Germanicè Heyden ylop & feld ylop appellat: plerique Latine Gratiâ Dei. Est tamen & alia herba Gratiola à recentioribus dicta. Valerius Cordus Helianthemum & Solis florem nominat.

PLINIVS Helianthen tradit, in Temiscyra regione, Helianthe. & Ciliciæ montibus provenire mariimâ, folio Myrti. Hac cum adipe Leonino decocta, addito croco & Palmeo vino perungi Magos, & Persarum Reges, vt fiat corpus aspectu iucundum: ideo eandem Heliocalliden nominari. Quæ si eadem cum isto Solis flore sit, an diuersa, nemo facile in tanta Plinij breuitate explicauerit. Mattbiolus, Helianthemum siue Solis florem, à quibusdam Panaces Chiromum existimari refert, verùm cum eo similitudinis habet nihil.

VVLNERA autem, eodem auctore, glutinat: sanguinem

nem manantem sistit: ad cruenta sputa, dysenteriam, mensium redundantiam utilis: oris & pudendorum ulcera vinum decoctionis eius ablutione sanat. In summa, agglutinat, cohibet, & corroborat. Quæ satis ostendunt cum Cisto, & præsertim Ledo, non modo forma, sed & viribus ac facultatibus convenire. Proinde Cisti & Ledi, sylvestrem quandam speciem esse.

DE PÆONIA. CAP. XXXI.

- 1 PÆONIÆ tres sunt: mascula vna, femina duæ.

MASCULÆ Paonia caules, & foliorum pediculi rubent: folia lata ex pluribus commissa, nucis iuglandis folijs ferè similia, nisi quod iuglandis ex septem aut novem particularibus, simul ad vnum nervum aut $\rho\acute{\alpha}\chi\iota\nu$, coherentibus constent; Paonia verò, ex quinque solum, & subinde ex tribus tantum committantur: flores in summo caulium veluti magnæ Rosæ in purpura rubent; staminibus in medio purpureis, ex quibus lutei dependent apices: siliquæ foris lanuginosæ, quæ per maturitatem sponte dehiscunt; semen in his nigrum, rotundum, ocabri ferè magnitudine; & grana quadam coccineo colore splendentia: radices subsunt longæ, crassæ, altè descendentes, subinde bifidæ, aut trifidæ, intus candidæ & odoratæ.

- 2 PRIORIS femina caules parum aut nihil rubent: folia incondita, hypofelini, quod à Theophrasto Smyrnion appellatur, ferè modo laciniata, & singularia angustiora quàm maris, superna parte virentiora, inferiore albicantiora: flores ut mascula Paonia, colore aliàs pulchrè, aliàs dilutè rubetes: semen, in siliquis Amygdalis similibus, etiam simile: radices verò differentes & aliæ: non vna etenim huic est radix, sed ab vno capite multæ descendunt glandulosæ radices,



radices, veri *Asphodeli* radicibus similes, sed multo crassiores & longiores; à quibus sæpe alia duæ aut tres procedunt, eiusdem omnino formæ.

- 3 ALTERA femina caules habet & folia similia, folia tamen minus incondita, & in virore candidiora, auersaq; parte etiam albidiora: flores minores, dilutius rubentes: radices quoque glandulosas, sed singulas multo longiores ac tenuiores. Hanc *Plinius* pro mare habuisse videtur: nam radices ei plures, & singula palmo longiores ac candida, quales mari ipse tribuit. Femina, inquit, existimatur, cuius radicibus seu balani longiores, circa octo aut sex adherent: mas plures habet, quoniam non vna radice nixus est, palmi altitudine, candidaq;. Posset verò & hæc *Pæonia* femina species altera, *Dioscoridis* quoque mascula existimari, si non folium mari nuci iuglandis, & radicem vnicam esse scripsisset. Nam mari suo talem ferè radicem tribuit, qualis est tertiæ *Pæonia* vna aliqua, ab ipsis radicibus, quæ pluribus singularibus constant, auulsa. Sed tamen ex eo quod *Pæonia* mari, folia βασιλικῆ καρύα, id est nuci regia similia esse prodiderit, & radicem vnā numero singulari, non septem aut octo, vti feminam habere ait, ostendit se non hanc tertiam, sed primam, marem appellauisse: quæ nempe nuci Iuglandis sue Regiæ, habet folia, & radice est vnica. *Plinius* etiam, feminæ folia *Myrrham* redolere ait; sed suspicio euidentis est, ἀντὶ τοῦ σμυγνίου, σμύραν eum accepisse; aut pro σμυρρίσ, *Myrrham* parum rectè reddidisse.

Plinij oscitantia.

NASCITUR *Pæonia*, vt *Dioscorides* scriptum reliquit, in altis & præruptis montibus: *Plinius* verò, in opacis montibus, & alio loco in syluis, ait: in *Cretæ* & *Sicieliæ* montibus *Apuleius*: *Gesnerus* in *Generoso* dicto *Heluotia* monte reperiri, audiuerat: apud *Belgas* & alibi hac ætate in hortis habetur, & vulgatissima quidem, femina prior; altera deinde:



deinde : mascula rarissima est. Florent omnes mense Maio, semen Iulio ad maturitatem pervenit.

GRAECIS παιώνια καὶ γλυκυσιδὴν : & à nonnullis πεν-
τόβορον ; Latinis similiter, Paeonia & dulcisida dicitur. Offi-
cinis Pionia ; Germanis Paeonien blumen / Paeonien
rosen / Bichtwurtz / Kunigblum / Pfingstrosen ;
Belgis ferè, Paeonien : Flandris tamen, Wasbloemen,
Gallis, Pivoine : Hispanis, Rosa del monte . Habet verò
& alia multa nomina, inter nothas voces reiecta, quæ par-
tīm etiam apud Apuleium reperiuntur, ut sunt : ὀροβέλιον,
ὀροβ.άξ, αἰμάγωνον, παισαίδην, μιννογένειον, μάνιον, πανδι-
κέρατος, ἰδαῖος δάκτυλος, ἀγλαοφωτὶς, θεοδόνιον, σελήνιον,
σελινόγονον, διχομάνιον, Rosa fatuina, herba casta. Meno-
genion autem, Menion, Selcnion, Selenogonion, Dichome-
nion, ἀπὸ τῆς μάνης, καὶ σελήνης, nomina derivantur ; qua-
rum utraque vox Latinis Lunam significat . Lunaris verò
sive Lunaria Paeonia appellari potest : quod Comitiali mor-
bo laborantibus, quos Lunaticos plerique appellant, auxi-
lietur. Idæi dactyli appellatio, femine convenit, cuius glan-
dulse radices dactylos idæos referunt. Sunt autem idæi da-
ctyli, gemmae quaedam formæ humani pollicis, in Creta in-
sula nascentes. Aglaophotis, id est lucide splendens, Paeonia
dicitur, à granis cocci colore splendentibus.

Aglaopho-
tis.

AGLAOPHOTIDES autem duæ, apud Aelianum
lib. 14. descriptæ reperiuntur : una marina, cap. 24. altera
terrestis, cap. 27.

¹ MARINA, fuci species est, quæ in profundis nascitur
petris, magnitudine Myrica, fructu Papaveris, qui æstivo
solstitio dehiscens, noctu igneum quendam, & veluti scin-
tillantem splendorem emittit.

² TERRESTREM, quæ alio nomine Cynospastus di-
citur, per diem, ait, inter ceteras herbas delutescere, nec

vllō



ullo modo agnosci ; nocte verò stella instar lucentem , & igneo splendore coruscantem , facile in conspectum venire.

ET hæc quidem terrestris Aglaophotis siue Cynospastus, Pæonia est ; cuius etiam grana cocci colore rubentia , Apuleius ait , noctu lucere tanquam lucernam , & plurimum noctu à pastoribus inueniri & colligi.

APPELLATUR verò & hæc Aglaophotis à Iosepho belli Iudaici scriptore, lib.7. cap. 25. Baaras , à lo co in quo reperitur. Quod, conferenti ea quæ de Aglaophotide terrestris, siue Cynospasto, Aelianus scribit, cum ijs quæ de Baara Iosephus , sit manifestum . Cynospastum etenim Aelianus ait, non absque periculo euelli, & enim, qui primum eius natura imperitus eam attingit, famã esse perijisse : itaq³ signum ad eius radices noctu desigendum , canem verò ad alligandum famelicum, qui nidore obiectarum assatarum carminum motus, ad eas impetu factò, radicitus eam eruat. Ita etiam Iosephus, Baaram tradit circa vesperam, veluti iubare fulgere, accedentibus & euellere cupientibus facilem non esse ; sed vel vrinam muliebrem , aut menstruum sanguinem super eum fundendum, aut circumfodiendam, & ad eam canem religandum, atque ita denuum euelli posse.

VANISSIMA autem hæc sunt omnia: nullo etenim negotio & citra omne periculum, quavis diei & noctis hora Pæonia radix colligi & euelli potest. Qua de causa & similiter vana sunt, quæ Theophrastus & Plinius, de Pæonia tradi serunt : præcipi, videlicet , vt noctu colligatur. Nam si interdum quis fructum legat , à Pico martio visus oculis periclitaturum : si verò radicem secet, periculum esse ne sedes procidat.

MIRVM autem videri non debet huiuscemodi nugæ & vanissimas superstitiones , ac impiissimas ceremonias, subinde in antiquissimorum auctorum libris respersas reperiri:

riri : fuerunt enim multa, illorum seculis, magna vanitate, ad ostentationem , vt Plinius verè testatur , ab Aegyptijs & alijs præstigiatoribus efficta: quorum sectator olim quidam Andreas fuit medicus, quem Galenus ait , præstigiaturas ac mendacia in materiam medicam inuexisse: à cuius lectione, ea de causa, & aliorum similiter mendacium, abstinendum præcipit.

PORRO Paeonia radix leuiter cum dulcedine, vt Galenus ait , adstringit : acrimonia cuiusdam subamara quoque particeps : temperamentum haud insigniter calidum obtinet, pauxillo symmetro calidius : exiccatoria autem est & subtilium partium. Feminis à partu non purgatis, sicca, Dioscorides inquit , datur : menses cit Amygdala quantitate pota : in mulsa, Galenus addit. Prodest auriginosis, renes & vesicam dolentibus : obstructum hepar & renes expurgat : ventris dolores sedat , & fluxiones sistit , in vino decocta & bibita . Pueris ex collo suspensam , aduersus Comitialem morbum efficacem esse , à Galeno certo & euidenti exprimento compertum est . Estur etiam, inquit Plinius , contra malum mentis : sed in medendo quatuor drachmae satis sunt . Praefertur ad hac mascula Paeonia radix.


RUBRA grana, 10. aut 12. pota in vino austero, nigro, fluxum rubrum muliebrem sistunt : stomachicis qui rofiones sentiunt, esa profunt : à pueris comesta , aut in potu sumpta, calculi initia excutunt.

NIGRA grana, ipsa videlicet semina, 15. numero in potu sumpta , opitulantur suppressionibus nocturnis , quas ἐφιάλτας nominant , vterique strangulationibus & doloribus . Vtraque auxiliantur à serpente percussis , Plinio auctore.

CANDIDO siue albo Lilio, quod pulchritudine, nitore & vsu, reliquis præstat, folia sunt oblonga, lata, carnosâ, lanâ, in herbaceo & diluto virore splendentia: caules duobus cubitis altiores, multis folijs sensim attenuatis comosi, qui inter folia exeunt: flores ad summum caulis pulchri, candidi, odorati, magni, ab angustijs in latitudinem se laxantes, calathi forma, senis constantes foliolis, oblongis, extrinsecus striatis, staminibus è medio emicantibus, à quibus lutei dependent apices: radix bulbosa, nucleis constans, & ex multis simul vnitis composita, succo lento & glutinoso plena, quo & folia & caules redundant. Seruntur Lilia passim in hortis. In Syria autem & Pisidia Pamphilia, vnguentis efficacissima nasci, Dioscoridès inquit. Floret apud Germanos, Belgas, Gallos, Liliû, Iunio mense: Augusto folia exeunt, tota hyeme virentia: Vere, caulis erumpit.

STIRPS Liliorum à Græcis κρινώρεια dicitur: flos verò κρίνον & λείριον: est tamen & Narcissus λείριον: à nonnullis καλλείριον & κρινάνθεμον: A Latinis Liliû & Rosa Iunonis.

APPELLATUR autem Rosa Iunonis, quod ex lacte eius in terram delapso, natum feratur. Fingunt siquidem Poëta Herculem, quem ex Alcmena Iupiter sustulerat, admotum fuisse dormientis Iunonis vberibus, & post suctum, lac copiosum effluxisse, & vna eius parte calum persusum alia terræ glebas: atque hinc Lilia nata: inde verò lacteum apparere in calo circulum. Germani Liliû istud, vulgo weiß gilgen oder weiß lilgen appellât. Belgæ, witte Leilien, Galli, Lys blanc.



LILI autem flos temperaturam mistam, ut Galenus ait, obtinet; partim ex tenui, partim ex terrena essentia.

RADIX foliaq; per se trita, desiccant & abstergunt, ac moderatè digerunt.

FOLIA herba, Dioscorides ait, imposita, auxiliantur à serpentibus ic̃tis: eadem seruesacta, ambuslis proficiunt: aceto condita, vulneribus curandis apta sunt.

SUCCVS melle & aceto mixtus, in aneo vase coctus, medicamentum efficitur veteribus vlceribus, & recentibus vulneribus vtile.

RADIX tosta, & cum rosaceo trita, ambusta sanat; vterũ mollit, menses mouet: vlcera ad cicatricem perducit. Cum melle verò eadem trita, nervorum vulnerationes & luxationes sanat; vitilignes & lepras expurgat; furfures & manantia capitis vlcera abstergit; faciem purgat & erugat. Cum aceto autem & hyosciami folijs, ac farina triticea trita, testium inflammationes mitigat. Propter clanos pedum, in vino, Plinius ait, radices Lily decoquuntur, tri-duoq; non solvuntur: cum adipe aut oleo decoctæ, pilos adustis reddunt. E mulso potæ, inutilem sanguinem cum aluo trahunt: Lienĩ, & ruptis, & vulsis prosunt.

RECENTIORES, Lily radices coctas, cataplasmati summa cū vtilitate admiscēt, abscessus maturantibus & ad suppurationē perducētibz. Eadem etiã, in oris collutionibus ad idem faciētibz, vtiliter decoquuntur. Nam omnes abscessus maturant, & suppurari faciūt, & dolorem simul sedant.

SEMEN, Dioscorides ait, potum serpentium moribus aduersatur. Cataplasma ex semine & folijs, erysipelatis imponitur.

FIT ex floribus oleum aut vnguentum, quod Lirinum aut Susinum appellatur, molliendus neruis aptum, pruritĩq; ad vteri durities vtile.


DE LILIIS PURPUREIS, HYACINTHO
SCRIPTO, ET COMOSANDOLO.

CAP. XXXIII.

PURPUREORVM Liliorū duo genera sunt: maius unum; alterum minus. Maiori purpureo lilio, caules sunt proceri, longi, subinde altiores quàm lilij albi: folia tamen nigriora & angustiora, circa caulem multa, sed ante eius exortum nulla: flores summo caule copiosi, 10. 12. aut plures, ad vsque 18. & 20. ac vltra, suprā inuicem incerto ordine digesti, lilij alterius forma & magnitudine, colore verò rubro ad croceum inclinante; multis, exiguis, nigris quasi punctulis, literarum quarundam veluti rudimentis respersi: radices, bulbi magni sunt, ex multis quoque nucleis, vt lilij candidi; sed maiores.

IN Italia, in aruis inter segetes circa messem; in montibus etiam ac conuallibus, Liliū istud, Matthiolo teste, emicat. Belgæ in hortis serunt. Floret paulo ante candidum liliū, post purpureū minus, vnā cum Rosis.

MATTHIOLVS Liliū syluestre in Italia appellari, & Hemerocallida esse ait. Sed ἡμεροκάλδης, vt auctor Dioscorides, in singulis apophysibus, tres aut quatuor flores profert, colorem habentes ἰσχυρῶς ὠχρὰν, id est valde luteum. Ἀπόφυες autem siue ἀποφύαι, ramulares adnascenciae, siue appendices dicuntur. Ochra color, melino similis & citrino, à malo Citrio nomen habenti: Liliū autem istud, ramulares adnascenciae nullas habet; & flores in caule non modo tres aut quatuor, sed non rarò 18. aut 20. ac coloris non rei, sed purpurei crocei. Quibus de causis non quidem Hemerocallis, sed Liliū illud esse apparet, quod capite de Lilio, πύρρον, siue purpureum, reperiri, ex relatu, Dioscorides scribit; quodq; rubens Plinius, & Græci; eo auctore,



κρίνον vocant, florem verò Cynorhodon : & laudatissimum in Antiochia & Laodicea Syria, mox in Phaselide , quartum locum in Italia nascens. Nisi fortassis duæ Hemerocallides flores sint: vna quidem apophyses habens; alia non habens, & ea quidem purpurea : ita etenim & Lilium istud Hemerocallis fuerit, & præsertim πορφυρανθής: qua appellatione Hemerocallida etiam dictam, inter nothas voces reperitur. Sed verisimile est Hemerocallida non esse; est enim & Hemerocallis quedam, flore purpureo, cui πορφυρανθής nomen propriè conuenit.

ALTERVM & minus purpureum Lilium, caule est ² multo breuiori, cubitali videlicet tantum aut minori: folijs similiter nigricantibus & angustioribus ac minoribus. Flores è summo caulis pariter erumpunt, singuli tamen suis pediculis, modò breuioribus, modò longioribus infidentes; coloris quoque purpurei crocei, notulus similiter quibusdam nigris & perquam exiguis ornati; Lilijs etiam diuisura, sed paulo minores: pro radicibus & minores bulbi sunt, infra supraque, quos fibra adherent. Vnà cum alijs Lilijs apud Germanos, Belgas & alibi, colitur in hortis. Floret sub finem Maij, reliqua Lilia antecedens.

LILIVM etiam est purpureum, & κρίνον πορφυρον, quod ad differentiam præcedentis, minus cognominatur.

OVIDIVS lib. Metamor. 10. huius generis Lilium, Hyacinthum appellat, ab Hyacintho adolescente, ex cuius sanguine hunc florem natum fingit, quando cum Apolline ludens perisset, cui Apollinem gemitus sui notas & literas inscripsisse ait, sic scribens:

Ecce cruor, qui fusus humo signauerat herbas,
Desinit esse cruor, Tyrioque nitentior ostro
Flos oritur, formamque capit, quam lilia, si non
Purpureus color his, argenteus esset in illis.

Non



Non satis hoc Phæbo est, (is enim fuit auctor honoris)
 Ipse suos gemitus folijs inscribit, & ai ai
 Flos habet inscriptum, funestaq; litera ducta est.

Huius Hyacinthi meminit etiam Theocritus in Epi-
 taphio Bionis, eidyllio. 19.

Νύφ

Νῦν ὑάκινθε λάλει τὰ σὰ γράμματα καὶ πλέον αἰ αἰ
 Λάμβανε τοῖς πετάλοισι.

COGNOMINATUR autem hic, à Poëtis Latinis nonnunquam ferrugineus, ut à Vergilio Georg. 4.

Et pinguem tadam, & ferrugineos Hyacinthos.
 Similiter & à Columella, lib. x.

Syrpiculum ferrugineis cumulate Hyacinthis.

FERRUGINEVS verò hyacinthus dicitur, quòd ad similitudinem ferruginis rubeat. Est etenim ferrugo corruptela ferri, veluti aris arugo, quæ à colore subrubente rubigo appellatur. Vnde & ferrugineus color, instar ferruginis rubens. Sunt qui velint hyacinthum non ex eo ferrugineum cognominari, quòd ferruginis modo subrubeat, sed quia luctus notas folijs inscriptas habeat, ferrugineumq; eum quasi lugubrem & funestum appellari aiunt. Tradunt siquidem ferrugineum esse fuscum & subobscurum colorem; Vergiliūq; cum ferrugineum nominat hyacinthum, ad fabulam eius alludere, quæ hyacinthum ex sanguine hyacinthi adolescentis natū fingit: ferrugineam siquidem ab eo etiam dici, Charontis funestam & luctuosam cymbam. Sed his Vergilius ipse contradicit, Bucolicōn ecloga tertia, ubi hyacinthum suauiter, id est non intensè rubere scribit, his verbis:

Et me Phœbus amat, Phœbo sua semper apud me
 Munera sunt Lauri, & suaue rubens Hyacinthus.

OVIDIVS etiam loco superius adducto, eum purpureum esse manifestis verbis ostendit. Purpureus verò, omnis qui rubet color in floribus appellari consuevit.

RECENTIORVM plerique, hunc hyacinthum Poëticum appellant, ad differentiam nempe alterius, quem historicum Iodocus Vvillichius in commentarijs Georgicon Vergilij nominat. At nobis magis placet hunc scriptum hyacinthum

ciutbum dici : alterum verò , de quo inferius suo loco , non scriptum : in hoc etenim lugubres notæ inscriptæ reperiuntur : in illo verò nulla sunt.

PAUSANIAS Corinthiacon lib. secundo , scriptum hyacinthum , aut ei simillimum florem Comosandalon ab Hermionenſibus appellari , memoria prodidit , ritus referens , qui ab ipsis in honorem Chthoniæ deæ , statis festis aguntur diebus. *Pompæ agmen ducunt , inquit , sacrificuli , & qui annos magistratus gerunt : sequuntur femine ac viri : ipsis etiam pueris solenne est , deam cum pompa deducere. Incedunt autem cum albis vestimentis , capitibus coronas ferentes . sunt ea corollæ ex flore contextæ , quæ κομοσάνδαλον incolæ appellant . Hyacinthum ego illum existimo : est enim ei tum magnitudine , tum colore persimilis ; habet præterea easdem luctus indices literas.* Hæc Pausanias.


Comosan-
dalus.

PORRO purpureorum liliorum istorum , in medicina incognitus usus est , & facultas incomperta : inter flores autem gratiam inueniēte.

DE LILIO SYLVESTRI.

CAP. XXXIIII.

SYLVESTRE Liliū caules promit bicubitales aut altiores , rotundos : folia longa , lata , acuminata , non supra inuicem incerto ordine disposita , sed caulem quibusdam locis , stellæ modo radiata , circumdantia : flores è suis pediculis deorsum dependent , Liliū diuisura , sed minores , colore purpureo obsoleto , purpureisq; aliquot maculis splendentes , & staminibus eiusdem coloris in medio ; quorum foliola retrorsum reflexa in circulum aut orbem ferè recurvantur : radices bulbosæ veluti ex multis nucleis coniunctæ , aurei vel flauī coloris ; ex quibus fibræ dependent . Nasçitur liliū
istud



istud complurimis Germania locis, in sylvis & montibus, Fuchsis & Gesnero testibus. Belgæ cum alijs Lilijs in hortis habent. Floret sub finem Maij, aut Iunij initio, candida Lilia anteuertens.

GERMANI, Goldwurtz à flauo bulbi colore, & Heydnisch blumen appellant. Nostri Lelickens van Caluarien. Galli, Lys sauuage, hoc est, Liliū sylvestre. Est tamen & aliud sylvestre Liliū, alio nomine Hemerocallis, de qua sequenti capite. Matthiolus in Italia à Chymistis Martagon dici, ait.

- 2 AD hoc genus Lilij, referendum quoque videtur, quod Hemerocallidem alteram, Matthiolus nominat, & in Iapidia montibus reperiri refert. Pingitur istud ab eo, caule comofo, & folijs multis, incondito ordine circa ipsum digestis: flore foliola sua recuruante, Lilio sylvestri simili: radicibus ex multis, veluti paruis bulbis conglomeratis.


VSVM autem vtrumq; hoc Lilij genus, in medicina nullum habet.

DE LILIO NON BVLBOSO.

CAP. XXXV.

NON bulbosi Lilij duo reperiuntur genera, florum colore discreta. Vni flos luteus: alteri, in rubro obsoletiori purpureus. In lutei genere flos vnius minor; alterius, paulo maior est: vterque tamen purpureo minor, qui maximus est & Lilio candido magnitudine ferè similis.

SUNT autem non bulboso Lilio, folia oblonga & angusta, Porri aut Asphodeli folijs similia: caulis cubito altior, rotundus, lauis, absque folijs, superius in apophyses, id est, ramulares eminentias, siue propagines, duas aut quatuor diuisus: in quarum singulis flores tres aut quatuor, Liliū forma



forma & diuifura refcrentes : colore in vno quidem genere Ochra, vt diximus, luteo ; in alio rubro purpureo, cuius tamen medium floris, luteum eft: poft flores, craffa, triangulares gignuntur filiquæ ; in quibus fermen nigrum & fplendens, Peonia femini fimile, fed minus. radices fubfunt non bulbofæ, fed veluti Affhodeli lutei, multæ, oblongæ, coherentes ; & vni quidem , cui videlicet flores maiores aut purpurei , craffiores , nodofioresq; ; alteri verò minoris floris , tenuiores & longiores ; è quarum annexu fibra quedam craffiores ferpunt, quibus non fecus ac Affhodelus luteus, in plures plantas facile multiplicatur. Peregrinum Belgio iftud Lilium eft, & aliunde inuectum. Floret vnà cum Lilio purpureo maiori, vel paulo ante, Lilia candida precedens.

LILIVM luteum nonnulli appellant ; fed rectius non bulbofum Lilium nuncupatur: alij Liliaginem, plerique Liliastrum : veteres autem Hemerocallida dixerunt . Reperiuntur autem apud ipfos Hemerocallides duæ ; vna frutex, alia flos eft.

Hemerocallis frutex.

HEMEROCALLIS frutex ex genere eft coronariorum & lignosorum , quæ minutis, tenuibusq; conftant folijs: femine exit; radiceq; eft lignofa: vt auctor Theophrastus lib. 6. de hiftoria ftirpium. Plinius lib. 21. cap. 10. hanc Hemerocallidem inter eas ftirpes numerat , quæ folijs folijs coronant.

Hemerocallis flos.

ALIA Hemerocallis, flos eft, qui nocte tabefcit, oriente verò Sole pullulat, Athenæo teftè: quale iftud non bulbosum Lilium ; præfertim quod purpureum & fugaciſſimum eft, & vno tantum die viget; matutino ſiquidem tempore exortum, vefperi flacceſcit.

DIOSCORIDES Hemerocallida apophyſes ſue ramulares adnaſcentias habere ſcribit , & in ſingulis flores tres aut quatuor , ochra colore : caules non bulbofi Lilij , in propa-

propagines, siue ramulos distribuuntur; singulique flores tres aut quatuor promunt, & eos quidem, ochrea colore in vno genere. Iam & Porphyræthes, Hemerocallis nuncupata reperitur: hæc autem appellatio purpurei floris non bulboso Lilio conuenit. Quæ omnia non bulbosum Liliū, Hemerocallidem veram & legitimam esse, manifestè ostendunt. Tribuit Dioscorides Hemerocallidi, præterea radicem bulbosam: innuit istud, apud Dioscoridem Hemerocallidis descriptionem deprauatam: vel enim superfluum scilicet, & veritati repugnantium adiectione, ampliata, vel duorum Liliorum descriptiones, in vnā contractas; Hemerocallidis videlicet, & alicuius alterius Lilij. nisi fortassis & bulbosum aliquod sit Liliū, apophyses faciens, & vnus tantum diei florem luteum habens; quale tamen nondum constat alicubi repertum esse.

Dioscoridis descriptio suspecta.

HEMEROCALLIDIS autem descriptio, his verbis apud Dioscoridem traditur. ἡμεροκαλλὶς φύλλα ἔχει καὶ καυλὸν ὅμοια κρίνω. χλωρὰ δὲ ὥσπερ πράσα. ἀνθὴ δὲ ἐν αὐτῷ καθ' ἐκάστην ἀπόφυσιν γ' ἢ δ' τὴν σχίσιν τῷ κρίνῳ ὁμοίως ὅταν ἀρξῇται χρίναι. τὴν δὲ χροὴν ἰσχυρῶς ὠχρεάν. ῥιζὰν ὁμοίαν βολβῶ ἐυμεγέθει. Id est, Hemerocallis folia habet & caulem Lilio similia, viridia vt Porrum: flores in ipso, iuxta singulas apophyses tres aut quatuor, diuisura Lilio similes, cum primum hiare ceperint: colore valde ochrea, radicem similem bulbo magno.

DICITUR verò Hemerocallis & ἡμεροκατάλαχτον, κρίνον ἄγριον, κρίνανθεμον, πορφυρανθές, βόλβος ὁ αἰματικός, ἀντικάρθαρον, Liliū agreste & Liliū marinum. Et omnibus his nominibus Liliū non bulbosum nuncupari potest, excepta tantum bulbi hamatici appellatione, quæ Lilio alicui bulboso magis conuenit.

CÆTERVM facultates Lilij non bulbosi incomper-

ta sunt, cum nullius, hac aetate, in medicina aut cibatu sit usus.

DIOSCORIDES autem Hemerocallidis radicem tritam ait, & potam; aut cum melle & lana in pessa appositam, aquam & sanguinem ducere: folia trita imposita, mammarum ex partu, & oculorum inflammationes mitigare: sed & radicem & folia, ambustis vtiliter imponi.

DE LILIO CONVALLIVM.

CAP. XXXVI.

QUOD Liliu convallium recentior nuncupat aetate, folia duo aut tria promit, virentia, laevia, latiuscula, Lili folijs similia, sed minora: caulem tenuem, palmarem; circa quem à medio sursum versus, flores parvi, rotundi, hiantes, per oras denticulati ac reflexi, albidii & odorati, & fructus inde rotundi, rubentibus Asparagi baccis haud multum absimiles, verum minores; semen in his durum & amaricans: radices tenues sunt, longae, aliquantulum geniculatae, serpentes.

IN sylvis & locis umbrosis sponte exit. Floret circa Calendae Maij mensis.

GERMANI, *Weyenblumlin* & *Weyenrysz* inde nominant: Belgae, *Weyenbloemkens*: Galli etiam *Muguet*: est tamen & alia ab ipsis *Muguet* dicta, *Lappaginis* videlicet species, à Plinio *Asperugo* nuncupata. *Gesnerus* florem istum *Callionymum* appellari posse existimat, nostra aetas *Lilium convallium* vocat.

CALIDÆ & sicca qualitatis flores & fructus participes sunt. Feruntur flores aduersus apoplexiam, nervorum resolutiones, vertiginem, morbum comitalem, ac alios cum cerebri frigida humidaq; intemperie morbos, auxilia-

res



res esse. Sunt etiam qui velint flores istos cor roborare, ac cardiacis quoquo modo assumptos prodesse: oculorum item caligines decocto aut succo eorum discutit.

EIVSDEM cum lilio isto generis esse putatur, quod ² Vnifolium dicitur: folium huic ut plurimum in tenui pediculo singulare & vnicum est, latum, nervosum & acuminatum, magnitudine serè foliorum hederæ; circa caulicu-



lum autem breuem tenuemq^{ue}, bina, eiusdem forma sed minora, supra qua flores candiduli Lilij conuallij similes, at minores, & nullius aut exigui odoris: bacca sequuntur exigua, per maturitatem rubentes: radices tenues, oblique, serpentesq^{ue}, fibra sunt.

EXIT ijfdem & similibus, quibus Lilium conuallium locis: floretq^{ue}, eodem tempore aut paulo post.

VVLGO Einblatt nuncupant, id est Vnifolium siue μονόφυλλον.

TRA-

TRADITUR à quibusdam resiccatarum radicula-
rum pulvis, aduersus pestilentem bubonem efficax esse, si
statim initio ipsius mali, drachma pondo cum aceto, & vi-
no, aut aqua permixtis detur.


DE ASPHODELO. CAP. XXXVII.

ASPHODELI genus vnicum Dioscorides; Plinius
verò duo fieri genera, & Dionysium feminam ac marem
esse dixisse, refert. Posterior atas duo triaue Asphodeli ge-
nera obseruauit; & præter bulbosum quidem, cuius Gale-
nus meminit.

PRIMUM genus, album quis dixerit: alterum verò, 1
luteum.

FOLIA autem primus habet complura, oblonga, an-
gusta, Porri folijs similia, acuminata, caulem rotundum,
leuem, cubito longiorem; quem à medio sursum versus
multi quinque foliolorum flores patentes exornant, colore
candidi, aut ex valde diluto rubro modicè purpurascens,
staminibus in medio; post quos capitula sequuntur orbicu-
lata: semen in his durum triangulum nigricantis obsoleti
coloris. radices ab vno capite complures exeunt, oblongæ,
inferiore sede crassiores, magnis glandibus quodammodo
similes, succosæ, cum amaritudine leni, sapore adstringenti.
In Gallia Provincia, Italia, Hispania, & alijs locis, sponte
exit: apud Germanos & Belgas, non nisi satus prouenit.
Floret hic Maio & Iunio, ac particulatim quidem, ab imis
incipiens, aliquot postquam satus est annis.

HVIC similis floribus, folijs, & semine, alius quidem 2
Asphodelus est minor, cui non glandulosa, sed fibrosa sunt
radices. Floret protinus & primo anno, deinde intermori-
tur: Pseudo Asphodelus quidam non abs re esse videtur.



ASPHODELVS autem Græcis quidem ἀσφοδελος, Latinis Albucum siue Albucus, & hastula regia dicitur. Caulis cum floribus ἀνθερίκός. Plinius caulem floriferum Anthericon, radicem verò, id est bulbos, Asphodelum nominari refert.

MEMINIT huius Asphodeli Hesiodus in Operibus & diebus, ubi stultos ait ignorare quàm magnum bonum sit in Malua & Asphodelo. Nam huius præcipuè Asphodeli radices edules sunt. Galenus tamen non de hoc Asphodelo, sed de bulboso eum scripsisse opinatur; cuius tamen bulbos non nisi compluribus elixationibus esculentos reddi, ipsemet testatur; quales, non est verisimile Hesiodum commendasse; qui cibum aliquem paratu facilem per Maluam & Asphodelum insinuasse videtur. Verba eius sunt:

Νήπιοι οὐδ' ἴσασιν ὅσῳ πλεὸν ἡμῖσιν παντὸς,

Οὐδ' ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μεγ' ὄνειαρ. Id est, Stulti neque sciunt, quæ tanto plus dimidium sit toto,

Neque quàm magnum in Malua & Asphodelo bonum.

CÆTERVM Asphodeli, ut Dioscorides tradit, radices pota, vrinam & menses ciunt; sanant etiam lateris dolores, & tusses & rupta conuulsaq; drachma pondo pota ex vino: facit ad vomitiones magis idoneos, tali magnitudine in cibo sumpta: datur vtiliter à serpente demorsis trium drachmarum pondo; sed imponere moribus oportet, & folia, & radices & flores in vino cōtrita: sordida item & depascentia vlcerà; mammarum etiam ac testium inflammationes, phymataq; & furunculos in fece vini radix decocta curat: sed recentibus inflammationibus cum polenta auxiliatur.

SVCVS radice addito vetere vino dulci, myrrha & croco; illinendis per quàm utile oculis sit medicamentum, si simul decoquantur. Ad purulentas aures idem per se & cum

thure, melle, vino & myrrha tritus, prodest. In contrariam aurem infusus, dentium dolores sopit.

VSTÆ radicis cinis Alopecias impositus ad pilum reducit.

O L E V M in excanatis radicibus ad ignem decoctum, exulceratis pernionibus & ambustis illitu prodest: & in aures infusum earum doloribus auxiliatur: Vitiliginem albam, linteo antea in sole perfrictam, illita radix exerit.

S E M E N & flores præcipuè, aduersus Scolopendras & Scorpiones excellens sunt remedium, in vino pota.

DE ASPHODELO LVTEO.

CAP. XXXVIII.

P R Æ T E R Asphodelum superiori capite descriptum, & aliud est luteus cognomento; folia cui sunt oblonga, angusta, striata, in virore quasi carulea, longiora & angustiora quàm primi: caulis rotundus, cubitalis: flores in eo, à medio sursum versus, plurimi; alterius satis similes, ceterum colore lutei, staminibus in medio: capitula succedunt rotunda, in quibus semen: radices similiter complures, sed singule oblonga & tenues, multo quàm primi & tenuiores & longiores, colore luteola, supra quas fibra quedam laterales exeunt, per quas in plures alias stirps ipsa faciliè multiplicatur. Peregrinus & hic Asphodelus Belgio est, nec alibi quàm in hortis reperitur. Floret similiter Maio aut Iunio mense; folia eius pleraque hyeme, si non admodum rigida fuerit, virent; Vere noua exeunt.

R E C E N T I O R E S Asphodelum luteum à florum colore luteo appellant; à Dionysio femina dictus esse videri potest, & Plinij alter.


P O R R O quis huius Asphodeli vel in cibatu, vel in medicamentis vsus sit, exploratum nondum est.



BVLBOSVS *Asphodelus* folia habet porracea, sed tamen angustiora & breuiora quàm primi *Asphodeli*; caulem rectum, rotundum, floribus similiter multis circum vestitum, rarioribus tamen, primi *Asphodeli* floribus haud multum dissimiles, ex sex paruis acuminatis foliolis, & aliquot in medio staminibus compositi: capitula quoque triangularia, sed oblongiora, in quibus semen: radix subest bulbosa magnitudine esculenti bulbi, aut maior. Apud Belgas non nisi hortensis est. Floret eodem, quo primus, tempore, aut serius paulo.

ASPHODELI speciem esse caulis *Antherico* similis ostendit; qua de causa & eum *Asphodelum* esse apparet, cuius Galenus lib. de alimentorum facultatibus secundo, meminit his verbis.

RADIX *Asphodeli*, & magnitudine, & figura, & amarore *Scille* radici quodammodo est similis: si tamen ut *Lupini* paretur, maximam partem sui amaroris deponit; inq; eo à *Scilla* discrepat. Nam *Scilla* qualitas difficillimè eluitur. *Hesiodus* certè *Asphodelum* laudat cùm sic ait: Nec quanta in *Malua* & *Albuco* sint bona, norunt. Equidem noui quosdam rusticos, qui grassante fame, vix tandem compluribus elixationibus, macerationibus in aqua dulci, esculentam ipsam reddiderunt. Porro hæc quoque radix, quemadmodum & *Dracontij* facultatem habet tenuandi atque aperiendi. Proinde quidam pro summo remedio ipsius *Asparagum* ictero laborantibus exhibet. De eodem verò *Asphodelo*, & lib. de simplicium medicamentorum facultatibus idem scribit. Radices etenim *Asphodeli* viribus *Aro*, *Arifarro*, & *Dracontio* similes esse ait; quales certè huius, non
primi




primi illius sunt. Verba Galeni, hoc loco, de *Asphodelo*, hæc sunt: Et huius radix utilis est, sicut *Ari*, *Arisari*, & *Dracontij*, nempe extergentis facultatis. Vstæ autem cinis calidior, & exiccantior, subtiliorq^{ue}, ac digerere potentior efficitur, ac proinde & *Alopecias* sanat.

DE IRIDE. CAP. XI.

IRIDIS species floris colore differentes, complures esse Dioscorides innuit. Flores siquidem, ait, varij aut candidi, aut lutei, aut nigri, aut purpurei, aut cyanei. Quam coloris diuersitatem, non in vno flore, vti *Andreas Lacuna* existimauit, sed in diuersis reperiri αὐτόπτης testis est *Antonius Musa*; qui à se conspectos in *Illyrico*, *Iridis* flores plerosque candidos, alios pallidos, nonnullos luteos, quosdam purpureos, plurimos ceruleos, in examine simplicium scribit.

FOLIA omnibus oblonga, ensis aut gladij similitudine: caules rotundi, laues, cubitales, nonnullis altiores; in quorum summo flores παρὰλληλοι siue alterno ordine positi, terni quaterniue, odorati. Constant flores senis potissimum foliolis, quorum tria deorsum repanda arcus modo reflectuntur, alia tria sursum & contra se mutuo curuantur. Color candidæ per totum quidẽ florem candidus est; luteæ, luteus; ceruleæ siue nigre in saturata cerulea purpura nitet, μελαίνου siue *Viola nigra* colorem referens; purpureæ verò in ceruleo-purpureus, sed eius tamẽ quæ *Belgio* vulgaris est, non in omnibus foliolis neque ab omni parte similis; sursum etenim reflexa, pallidiora sunt & colore dilutior, præsertim vnius, cuius hæc pallidissima & ad aquæ κυάρεος colorem accedunt; deorsum curuata inferiore parte pallent; superiore verò pulcherrimũ purpureæ siue nigre *Viola* dilutũ colorem proximè exprimiunt; intermixtis interim lineis candidis, quæ



quæ ab ipso folij exortu ac veluti base, tum & ab ipsa flava fimbria exorientia, gratani coloris mixturam & varietatem efficiunt. Oritur fimbria ab ipsa inferiorum foliolorum in singulis floribus parte, qua calyci inhaerent, & inde sursum ad medium producitur, multis, tenuibus, breuibus, luteolis veluti pilis concreta, humani ferè supercilij, aut *Erucae hirsutæ* similitudine. Præter sex autem hæc, quæ propriè folia, sunt & tria alia oblonga, angusta foliola; extrema summaq; parte bifida, quæ fimbriam illam quodammodo contegunt: sub his singula stamina. Radices Iridi subiacent longæ, solidæ, nodosæ, ac veluti geniculatæ, digitali ayt ampliori crassitudine, subinde in plures propagines, ipsis ex lateribus adnascentes distributæ, & summa terra hærentes, intus candidæ: quibus adhuc recentibus & nondum resiccatis, nonnihil inest feruentioris saporis, qui tamen non statim, sed paulò post quàm mansa sunt, deprehenditur: tunc etenim fauces & lingua radicem impetens, ignea qualitatis vestigium, ac *πυράτερον τὶ*, quod non facile eluitur, ipsis imprimi: sicca verò gratiori sunt odore, & qualitate gustabili minus acri.

NASCITUR Iris in Illyrico, Macedonia, Africa, & in complurimis Europæ prouincijs. In Belgio, purpurea familiarissima est, & non modò in hortis, sed & quibusdam palustribus locis sponte exit, præsertim cuius flores dilutiorẽ purpuram, & aquæ cyaneum colorem referunt: Candida, hortensis tantum est; Lutea in paucorum hortis colitur à paucis annis primùm in cognitionem deducta: Certeant odoratissimi floris in Hispania plerisque locis sponte exire accepimus.

OPTIMA Iris apud Illyricos prouenit, & melior quàm in Macedonia, non tamen parte maritima, sed mediterranea, magisq; ad Septentrionem sita; vt Theophrastus ait.

ait. Plinius Illyricam reliquis quoque præfert, & quidem non in maritimis, sed in palustribus (exemplaria, ferè syluestribus, minus rectè habent) Drylonis; & Narona natam: quam etiam Nicander in Theriacis commendat, sic scribens:

Plinij locus restitutus.

Ἰρις δ' ὡς ἐθρῆ Δρύλων καὶ Νάρονος ὄχθῃ. Id est,

Iridem quam aluit Drylon & Naronis ripa.

SUNT autem hi fluij Ptolomæo in Dalmatia provincia Illyrico vicina. Nicandri verò scholiastes, Drylonem fluuium esse ait Illyriorum & Narorum, qui Illyricos & Liburnos segregat; vbi Cadmus & Harmonia habitauerunt, in serpentes transformati.

DIOSCORIDES inter Illyricas & Macedonicas præstantissimam esse ait, quæ radice est densa, minuta, frangi contumace, subruffo colore, multum odorata, gustu feruido, odore integro, non situm redolens, & sternutamentum dum tunditur mouens.

PROXIMA bonitate, Plinio auctore, Macedonica est, quæ apud Galenum lib. 7. κατὰ γῆν in acopo quodam Asclepiadis recipitur, cum tamen in alijs compositionibus Illyrica ferè admisceatur.

TERTIO loco Africana est, quam Galenus lib. primo de antidotis, multo inferiorem Illyrica testatur. Nam si, inquit, conferas eam quæ ex magna Libya Romam copiosissima adfertur, tantum ab Illyrica abest, quantum mortuum corpus à viuo.

QUÆ in frigidioribus reperiuntur regionibus, deteriores ac viribus infirmiores sunt. Theophrastus has omnino absque odore esse existimauit. In Trachia, inquit, caterisq; frigidioribus locis, ac minus coctura idoneis, odore penitus caret: quod tamen non absolutè verum est. Nam & Belgica Iris resiccata, non omnino absque odore est, licet tamen

K

odore,

odore, quàm Italica inferior; quæ hac ætate in Germania & alibi, reliquis præfertur, & Florentina cognominatur.

IRIDIS flores mense Maio prodeunt: folia ferè semper virent: radices diuturnæ, vix vlla hyemis iniuria offenduntur; nisi fortè candidæ, cuius nimio hyemis rigore, subinde radices intermoriuntur.

IRIS Græcis ἱρίς appellatur: Athenæus & Theophrastus ἱερίς legunt, quasi consecratrix, quo nomine etiam Latinis dicitur: nonnullus radix Marica, vel potius radix Naronica, à Narone fluvio, circa quem optima & copiosissima, ut diximus, nascitur. Item ὀυρανία, celestis, ab arcu celesti, & ab eadem occasione θαυμασὸς, admirabilis; θαυμάσιαν enim arcum celestem Poëta aliquando vocant: Nominatur & θαλπίδην aut θαλπίδην, καθαίρων purgans, ὀπρεπτότος. Philonius Iridis flores λύκος, id est, Lupos vocari tradit, quod deorsum arcus modo curuata, labiorum Lupi speciem quandam reddant. Germanis, *Bilgen/Schwertel*/ Nostri, *Lisch ouer Jce*. Gallis, *Flambe*. Italis, *Giglio* & *Iride*, Iris nominatur.

- 1 IRIDIS species flore candido olim in officinis gignendi casu Græco ἱερίος nuncupabatur: Germani, *Violwurtz/weiß Violwurtz*: Nostri, *wit Lisch*: Galli, *Flambe blanche* appellant. Hanc multi reliquis præferunt, & odoratiorem eius radicem affirmant.

- 2 ALIA Iridis species flore in cæruleo purpureo, Iridis nomenclaturam retinet: pleriq; tamen Liliæ, & in Apulia *Spatula*, ut Franciscanæ familiæ fratres *Angelus Palea* & *Barptolomæus* ab vrbe veterum scribunt: Itali, *Giglio azurro*, & *Giglio celeste*. Germani, *blauw Bilgen/blauw Schwertel/himmel Schwertel*: Brabantii, *blauw Lisch ouer Jce*. Huius speciem, quæ flore est dilutiore, plerique *syluestrem Iridem* nominant; ad differenti-

tiam

tiam candida, cum alterius hortensis. Sunt tamen & aliæ apud veteres sylvestres Irides, Xyris videlicet, & Ephemeron non lethale. Aloisius Anguillara Iridem hanc à Palladio Hyacinthum vocari existimat: alius Hyacintho, Iridis ac Gladioli nomen tributū dixerit. Verba Palladij sunt, lib. 1. de Apum castris, titulo 37. Herbas nutriat, Origanū, Thymum, Serpyllum, Satureiam, Melissophyllum, Violas agrestes, Asphodillum, Citraginem, Amaracum, Hyacinthum, qui Iris vel gladiolus dicitur, similitudine foliorum, &c.

PORRO Iridis radices recentes, & adhuc succo plena, impensè calida sunt, ad quartum ferè caliditatis gradum peruenientes. Succus earum non modò bilem, sed potissimum aquosos humores potenter educit, & hydropicos insigniter purgat, cum lactis sero, aut alio liquore, qui caliditatem eius nonnihil contemperet, epotus.

ARIDÆ in secundo sunt ordine intenso calefacientium & resiccantium: crassos & lentos humores, qui agrè ac difficulter educuntur, attenuant: respirationis difficultati, tussì veteri, & omnibus thoracis vitij, quæ hinc oriuntur, multum in eclegmate prosunt. Auxiliantur etiam lienosis, conuulsis, à serpentibus demorsis, perfrictionibus, rigoribus, & his quibus genitura profluit, cum aceto, inquit Dioscorides, pota: cum vino menses ducunt. Decoctum ad infessus muliebres vitale est, emollit etenim & locos aperit: ad coxendicū verò dolores, infusum: fistulas ac sinus carne implet; instar collyrij cum melle subdita, fœtus extrahunt: strumas & veteres duritias molliunt, cocta & imposita: arida vlcera replent: cum melle repurgant, & nudata ossa carne operiunt. Prosunt capitis doloribus cum aceto & rosaceo imposita: lentes & ephelidus abstergunt, cum Veratro albo & duplo melle superposita. Admiscuntur pesis & mlagmatis: in vniuersum multi vsu.

PRÆTER Irides superiore capite descriptas, reperiuntur & alia quadam Irides, de quibus deinceps agendum. harum vna minor, & tenuifolia non temerè appellatur.

EST hæc alijs similis, sed minor ac tenuior: folia habet breviora, angustiora, nigrioraq³, aut casti quasi coloris, quæ confricata, grandifolium reldunt odorem, Spatula fœtida propemodum persimilem, sed tamen minus graueolentem: caules similiter breviores, sæpe vix cubitales; in quo flores bini, terni, alteri, colore caruleo saturato, forma aliarum Iridum propemodum similes, nisi quòd ipsius foliola singula angustiora sint, & superiora contra se mutuo non adeo recurvantur, sed ferè erecta consistant: inferiora verò ac deorsum reflexa sinubria non habeant, sed solam lineam luteam; quæ tamen parte calyci proxima, nonnihil hirsuta est: radices quoque oblique, nodosæ, & sibi inuicem implicatæ, & quandoque quam aliarum densiores, longas, multasq³ fibras inferius demittentes, foris ruffæ, intus subcandidæ aut subluteæ, gustu feruido, vti aliarum.

NASCITVR in Germania in apricis planisq³ pratis, frutetosis ac humentibus campis, teste Valerio Cordo, & non procul, vt Gesnerus ait, Tiguro. Apud Belgas non nisi in hortis prouenit. Floret eodem quo alia ferè tempore.

IRIDEM minorem & tenuifoliam, vt diximus, appellant. Videtur nonnullis Plinij Rhizotomos, quòd radice videlicet sit sabruffa, breui, densaq³. Sed Rhizotomos Illyrica est species, & quidem præstantior, Plinio auctore; hæc verò contra, alijs odore & potentia inferior, nec in Illyride, sed in Germania reperitur. Proinde non Illyrica aut Rhizotomos,

rotomos, sed sui generis *Germanica* & tenuifolia quadam *Iris*, quæ *Spatula* sætida species haberi posset, si semen quod in suisquis gignitur, non uti aliarum *Iridum* planum, sed veluti *Spatula* sætida rotundum esset. *Plinij* autem de *Rhizotomo* hæc sunt verba: *Illyrica* duorum generum est: *Raphanitis* à similitudine; & quæ melior *Rhizotomos* sub-ruffa.


CÆTERVM potentia huius radix vehementer calida feruensq; est; facultate & viribus alijs *Iridibus* non inferior: ad eadem, ad quæ illæ, ea propter, præsertim recentes, utiles.

DE CHAMÆIRIDE. CAP. XLII.

CHAMÆIRIS inter *Irides* minima est, folia habet *Gladiolo* minora, angustiora, pinguiora: caulem palmi altitudine, folijs breviorum: in quo flores non alterno ordine ac situ, ut in alijs, sed è summo cauliculi simul, singuli suis insidentes pediculis, erumpunt, odorati, & maturi pruni odore & aliquatenus colore, tenuifolia *Iridis* floribus minores, forma alioqui similes: foliola siquidem & huius floris angustiora sunt, & deorsum reflexa, fimbriam illam humani supercilij non habent. radices parvæ & obliquæ sunt, foris ruffa, intus candidæ, duræ, gustuq; feruētes. Peregrina hæc *Iris* non modò *Belgio* aut *Germaniæ*, sed & *Italiæ*, ut fertur, est: & non nisi in hortis reperitur.

FLORET Maio mense: folia hyeme percunt, Vere erumpunt noua.

IRIDEM esse *Illyricam* *Hermolaus* existimauit *Barbarus*, cum eam olim in horto *Felicis Sophiæ Patavij* conspiceret; sed ab *Illyrica* & legitima *Iride* eam differre, *Antonius Musa* in examine simplicium, satis ostendit. Nos



Chamæiridem nuncupauimus, antiqua destitutam appellatione; nisi fortè Iris sit Astragalites dicta, cui aliquatenus similis est. Nam veluti astragali siue tali, parua, nodosa, duraq, huius Iridis radícula sunt. Astragalatidis Iridis meminît Soranus apud Galenum κατὰ τόπου lib. 7. & Aetium

Aëtius sermone 13. cap. 3. in emplastro venatorum.

FACULTATE autem & viribus, hæc quoque Iris acris & impensè calida est, alijsq; Iridibus similis.

DE SPATVLA FOETIDA.

CAP. XLIII.

SPATVLA foetida, caule, folijsq; iridi similis; folia tamen nigriora, grauem foetumq; odorem spirant, praesertim si confricentur atque digitis atterantur: flores quoque similes sed minores, purpurei sed sordidi & obsoleti coloris: Cordus tamen cuiusdam saturata purpura arridere refert: succedunt siliquæ magnæ triangulares, quæ in tres dehiscen-tes finduntur: semen in his rotundum ochri suæ Eruiiæ magnitudine, rubens, splendens, quod resiccatum contrahitur & nigrescit. Radices nouellis plantis rotundæ, & veluti bulbi aut cepæ alicuius caput, ex qua crassiores fibræ dependent: veteribus verò & multorum annorum plantis, multæ sibi inuicem implicitæ, magnum veluti cespitem constituentes, gustu feruida, vt & ipsum est semen. In Hetruria & alijs Italiae locis sponte exit; apud Belgas vix alijs locis quàm in hortis reperitur. Florem edit Iulio & Augusto: semen Autumno maturatur.

PASSIM Spatulam foetidam appellant, pleriq; etiam Iridem syluestrem: Germani, Wandtleuszkraut à potentia qua cimices enecat. Galli, Glayeul puant. Belgæ, wantluyseuyt/stinckende lisch. Ruellius Sparganiū existimat, sed nos pro Sparganio aliam exhibuimus herbam, Sparganiū apud Dioscoridem descriptioni melius respondentem: alijs Xyris esse videtur; quæ Fuchsii & Matthioli aliorumq; constans est opinio, olimq; nobis placuit, sed modò probari non potest. Si etenim diligenter Xyridis

descriptio expendatur, parum cum ea Spatula foetida convenire deprehendetur. Nam folia Spatula foetida non latiora, sed quàm vulgaris Iridis angustiora sunt: flos non è siliqua aliqua, multò minus triangulari, erumpit; sed nudus & nullo integumento prius quàm dehiscat contectus, idem aliquando purpureus, sed in medio nequaquam phœniceus: radices etiam non longæ & ruffæ, sed candidæ, & plurima parte breves. Quæ omnia Spatulam foetidam à Xyrīde differre ostendunt. Xyrīdis siquidem folia latiora sunt quàm Iridis; flos è siliqua erumpit, colore in medio phœniceus, & radices subruffæ, longæ, geniculatæ.

FACULTATE porro ac viribus Spatula foetida radices & semina calida sunt, ad tertium caliditatis gradum ac siccitatis perringentes. Foliorum succus cinices enecat, parietibus ac lecticis illitus.

DE XYRIDE EX DIOSCORIDE.

CAP. XLIII.

XYRIS Iridi similia habet folia, latiora verò & in summo acuminata; caulem è medio eorum cubitalem satiq; crassum, in quo siliquæ triangulares, & ex ipsis flores purpurei medio eorum phœniceo: fructus in folliculis fabis, aut, ut Oribasii exemplar habet, Eruo similis, rotundus, rubens, acris: Radix geniculata, longæ, *ρυππὰ* siue ruffa.

Ξυρίς Gracè & Latine dicitur, à nonnullis Xeris & Xyrīda, Galeno teste. Item *ἰρίς ἄγρια* siue sylvestris Iris, *κακὴ* siue *κακίλος*. Vulgo autem incognita stirps est.

TENVIVM partium, inquit Galenus, attractoria, digerendi, ac nimirum etiam desiccandi, est facultatis cum radix, tum multo etiam amplius fructus; qui quidem & urinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

DIOS-

DIOSCORIDES ait radicem contra capitis vulnera & fracturas facere, aculeos educere, & telum omne citra dolorem extrahere, admixta floris aris tertia parte, & Centaurij radice quinta, & melle: sanare & œdemata ac inflammationes cum aceto inpositam: bibi ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, stillicidia vrinae, & diarrhœas cum passo tritam: fructum per vrinam potenter mouere trioboli pondere ex vino bibitum: Lienem verò minuere cum aceto potum.

XYRIDIS radix, Plinio auctore, strumas vel panos vel inguina discutit. Præcipitur, addit, vt sinistra manu lecta, ad hos vsus seruetur, colligentesq; dicant cuius hominis vitijq; causa eximant.

DE PSEUDO IRIDE, SIVE SYLVE-
STRI IRIDE LVTEA.


CAP. XLV.

PSEUDO Iris folia quoque Iridis gerit, sed longiora & angustiora, dorso aliquantulum vtrinque extante: caules glabros, Iridis haud dissimiles, subinde bicubitales; atque in ijs flores complures, vti aliarum Iridum; nisi quod horum superiora foliola omnino paruula sint, & eorum quæ in veris Iridibus visuntur, quadam veluti tantum rudimenta, ac prima lineamenta: siliquæ crassæ succedunt triangulares, in quibus semina multa simul compressa, ordine digesta, plana, cartilaginea, lentibus maiora: radices obliquæ, longæ, geniculatæ, cirrosæ, in propagines diuisæ, colore pallidè rubentes, gustu adstringentes. Nascitur palustribus locis, humidis & riguis tractibus, Italia, Germaniæ, Galliæ, Belgioq; familiaris. Floret Maio & Iunio.

VVLGO, Germani, gel Schwertel & Drachen-

K 5

wurtz:



Wurtz: Nostri, geel Lisch: Galli, Glayeul ou Flambe bastarde. *Officina perperam olim Acoron appellauere: & maiori cum errore radicibus eius pro legitimo Acoro vsa sunt. Nam non forma modo, quæ fortasse in aliquo conuenire potest, sed viribus potissimum, ab Acoro plurimum dissidet. Plerique hac occasione Pseudo Acoron nominant: nos Iridem luteam syluestrem, aut potius pseudo Iridem nuncupare maluimus, utpote Iridi quàm Acoro similiorem.*

FACULTATEM habet radix huius adstringentem, frigida & sicca secundo excessu; dysentericas & alias ventris fluxiones cohibet: menses sistit, & sanguinem vndeque manantem suppressit, in potu, aut aliter sumpta. Sunt etiam qui solum gestantem eam, ab omni sanguinis fluore tutum affirmant.

DE ACORO EX DIOSCORIDE, THEOPHRASTO, ET ALIIS.
CAP. XLVI.

ACORO cognatio & similitudo cum Iride est; solia, ut Dioscorides ait, habet Iridis, sed angustiora, radices haud dissimiles, sibi inuicem implicitas, non in rectum descendentes, verum obliquas, & secundum terræ superficiem, geniculis interceptas, subalbidas, gustu acres, (& modicè amara, addit Galenus) odoris non iniucundi. Theophrastus Acoron inter eas stirpes refert, quæ cum semmibus flores edunt. Inuentu rarum Apuleius scribit, & non nisi cùm flosculum produxerit, agnosci posse. Plinij de Acoro historia, lib. 25. cap. 13. cum Dioscoride conueniret, nisi radices nigras traderet, & minus venosas eas esse ac ruptu faciles superadderet. Matthiolus Acoron folio depingit Iridis, radice longa, obliqua, & in superficie geniculis distincta, quod pro legi-

legitimo sibi ab Augerio à Bousbeeck Ferdinandi Imperatoris, apud Turcorum Imp. Oratoris missum memoria prodidit.

PROVENIT Acorum in Colchide, Galatia, & Creta insula. Optima, inquit Plinius, Acori radices Pontica; deinde Galatica, mox Cretica: sed prima in Colchide, iuxta Phasim amnem, & ubicunque in aquosis: Matthioli ad se missas, è Nicomedia quodam magnæ vastitudinis lacu collectas, refert. Est autem Nicomedia ciuitas Galatia, Colchidi vicina. Colchis verò Ponto Euxino vicina provincia.

PRÆSTAT, inquit Dioscorides, Acoron densum, candidum, non cariosum, plenum, odoratum. Plinius tamen Creticas candidiores Ponticis ait. Sunt autem ipso auctore, Cretica Ponticis minus probata.

Αcoros ἢ Αcorov, Græcis: Latinis Acorum dicitur. Nonnullis, teste Apuleio, Αποδιόσις, Venerea, radix nautica, singentiana, vnguentaria: Officina Europæ, magno cum errore, Calamum odoratum siue aromaticum appellarunt, pro Acoro pseudo Iridis radices, vt superiori capite ostendimus, perperam substituentes. Est verò & Acoros quibusdam Oxymirsinæ radix: ideoq̃, quidam hanc Αcorov ἄριον vocare malunt, vt Plinius ait.

ACORI radix, auctore Galeno, in calfaciendo & resiccando tertij est ordinis. Decoctum eius, Dioscorides inquit, vrinas mouet: auxiliatur ad lateris, thoracis & hepatis dolores; item ad tormina, rupta & conuulsa: Lienem absorbet: prodest stillicidio vrinae affectis, & à serpentibus demorsis: succus radices, quæ oculorum claritati efficiunt, exterit. Miscetur etiam antidotis vtiliter hæc radix.


DE GLADIOLO. CAP. XLVII.

GLADIOLO folia sunt oblonga, angusta, striata, gladij modo mucronata, Iridis minora & angustiora: caulis lauis, teres, cubito longior; circa cuius summum flores sex aut septem distantes, in ordinem supra inuicem, ad vnam caulis partem digesti, ex sex foliolis commissi, colore purpureo rubente splendentes: succedunt inde folliculi in rotunditate oblongi: semina in his tenuia, paleacea; radix gemini bulbi vno super alterum insidente, quorum superior Veris initio minor ac vegetior: inferior maior, sed flaccidior, qui paulo post perit, in plures subinde multiplicatus. Exit Gladiolus in pratis, in aruis inter segetes agro fecundo Italiae pluribus locis. Cordus in frutetosis herbosisq; etiam nasci scribit. Et quibusdam locis maior ac procerior; alijs vero minor ac breuior reperitur. Floret Maio mense.

GRÆCIS ξίφιον, Latinis Gladiolus, & nonnullis ensis appellatur. Sunt qui φάσγανον, μαχαίρώνιον, μαχαίροφυλλον, ἀνακτόριον, λιμνικὸν, ἄριον, Gladiolum segetalem, & linguam Ceruinam nominent. Plinius etiam Cypirum appellat, vt lib. 21. cap. 17. Bulborum generi, ait, quidam annumerant & Cypiri, hoc est, Gladioli radicem: dulcis ea est, & quæ decocta panem etiam gratiorem faciat, ponderosiorēq; simul subacta. Item cap. 18. Cypirus est Gladiolus, vt diximus. Sunt autem ea, quæ cap. 17. reperiuntur, ex Theophrasto de phasgano ad verbum translata. Phasganon autem idem cum Xyphio est: vnde Plinium perperam Gladiolo Cypiri nomen dedisse, eumq; hoc modo cum Cypiro confudisse euident est & manifestum.

Plinij error.

VALERIVS Cordus, Gladiolum Victorialem feminam nuncupat: alij Victorialem rotundam, & Germanicè, runde Seigwurtz / ad differentiam cuiusdam generis Allij




Allij, longa radice, quod in altissimis Alpium iugis reperitur, & à Germanis Scigwurtz/ Victoria radix, & Victoralis longa dicitur. Flores Gladioli Monacuccie ab Italis, ut testis Matthiolus, nominantur.

CÆTERVM radix Gladioli superior; attrahentem, digerentem, desiccantem etiam, ut Galenus ait, facultatem possidet. Dioscorides hanc cum vino, ait, & thure impostam spicula & aculeos extrahere, cum Lolij farina & hydromelite phigethla discutere, eamq; ob causam eiuscmodi emplastris addi: menses etiam appositam ducere. Ferunt, eodem auctore, superiorem cum vino sumptam, Venerem excitare: inferiorem verò steriles facere: quin & superiorem pueris enteroceliciis utiliter ex aqua propinari. Plinius infantibus vrinam ciere, & vesica vitij illiniri addit. Theophrastus Phasgani, id est, Gladioli, radicem decoctam dulcem esse tradit, & tritam farina admixtam panem dulcem & innoxium reddere.

DE SISYNRICHIO.

CAP. XLVIII.

SISYNRICHIO folia sunt graminis bina aut ter-
na, oblonga & angusta: caulis rotundus, dodrantalis, in quo
flosculi tres aut quatuor, pulchri, colore caerulei, verum su-
gaces, & paucis admodum horis vigentes, alternatim pro-
deuntes, forma quodammodo florum Iridis; ex nouem vi-
delicet foliolis compositi: quorum tria deorsum reflexa, pro
fimbria maculam habent plurima parte luteam; alia tria
sursum versus aliquantulum eriguntur; tria verò reliqua
respondentia ijs, quæ Iridis florum fimbriam contegunt,
proportione huic flosculo maiora & tenuiora sunt. sursumq;
arrecta medium floris tenent, summa, extremæque parte
diuisa:



diuisa: capitula inde succedunt oblonga, in quibus semen rotundum, paruum uti Rapi. radix bulbosa gemina, vno bulbo alteri superposito; sicuti Gladioli, sapore dulcis ac edulis, qua inuolucro quodam integitur reticulato: quod quidem maioribus spissius est; minoribus verò minus crassum: duo etenim huius genera esse videntur magnitudine sola differentia. In Lusitania & alibi apud Hispanos nascitur. Floruit Mechlinia Maio mense, in horto amplissimo & instructissimo D. Ioannis Brancionis viri generosissimi.

HISPANI Nozelhas, quasi nuculas, siue paruas nuces appellant. Nobis Bulbi esculenti genus illud esse videtur, quod Græcè σισυρίχιον ἢ σισυρίχιον, & Latine à Plinio Sisynrichium appellatur. Scribit etenim Theophrastus lib. 7. Sisynrichij proprium esse, radicis quidem, quod infra est, augeri primum; Vere autem apparente hoc tabescere: quod verò supra est edule incrementum sumere. Quibus verbis geminam Sisynrichio radicem & edulem esse ostendit: ut hinc bulbum hunc, quem Hispani Nozelhas nominant, verum Sisynrichium esse colligendum videatur. Nam gemina, ut scripsimus, est; & in Hispanijs passim editur.

DE LIRIO. CAP. XLIX.

LIRII vox polysemos est, pluribus floribus communis: Lirium enim lilium est; & Narcissus lirium est, de quibus suis locis. Præter hæc verò & alia duo propriè dicta sunt Liria. vnum maius, Vere exiens: alterum minus, Autumnale; de quibus hoc capite agendum.

MAIUS Lirium folia habet Porro aut Asphodelo similia: caulem cubitalem: florem in summo Iridis aut Sisynrichij flori forma satis similem, sed maiorem quam Si-



hyacinthij: colore aut totum luteum, aut caruleum purpureum cum lineis luteis, quæ in inferioribus foliis sumbræ loco sunt: Radicem bulbosam, oblongam, cepæ similem. Plerisque Hispaniæ Beticæ & Lusitaniæ locis sponte gignitur. Floruit Antuerpiæ in horto Petri Coldenbergij fidißimi ac diligentissimi Pharmacopœi, mense Iunio.

LVSITANOS Lirio nuncupare accepimus. Et certè λειριον illud esse omnino videtur, quod à Theophrasto lib. 6. Vere post Lilium exire traditur; & aliud à Lilio & Narcisso est.

EST autem fortasse & idem hic bulbus, Apulei Hierobulbus; cuius meminit cap. 21. Nam cum Iris apud veteres hieris nuncupetur, hic verò bulbus Iridis sit flore; non improprie Hierobulbus, quasi dicas Iris bulbosa nuncupari poterit: nisi quis velit ιεροκόλλων, veluti magnum & grandem bulbum dictum. Magna siquidem & grandia, ιερα & sacra, ab antiquis cognominata fuisse, haud in ambiguo est: Nonnullis placet Hierobulbum Colchicum esse, quorum sententiam modò libentiùs referimus, quàm resellimus: sed ad Lirium reuertamur.

Hierobul-
bus Apulei:

ALTERVM Lirium folia promit angustà & splendētia, Leucoij bulbosi hexaphylli folijs perquàm similia, inter quæ caulis exit triuncialis aut quadrantalıs, in quo flores vt Colchici Germanici, colore melini siue lutei; dies 10. aut 12. perdurantes, sed qui sub vesp̄am, vt Calendula & aliorum quorundam recludantur. radix subest bulbosa. Reperitur & in plerisque Hispaniæ locis. Autumno vnà cum Colchico florem facit.

LVSITANIS, Cibollina Alborañã dicitur, nomine diminutiuo, ad differentiam Scilla, quæ ab ipsis Cibolla alborañã nuncupatur. λειριον ἑτερον, id est, Lirium alterum Theophrasti esse videtur, quod lib. 6. vnà cum Cro-

co florem facere incipere: atque statim primis imbribus florere, scriptum reliquit.

DE viribus horum Liriorum nihil compertum habemus, aut ab alijs traditum accepimus.

DE CROCO. CAP. L.

INTER flores & Croci flos est: sunt huic folia oblonga perquam angustâ: flores pulchri, colore carulei, Colchici floribus similes, sed magis saturata purpura nitentes, & in singulis stamina oblonga terna quaternaria, colore flammeo subrubentia, odore cum inaruerint forti, & caput implente; quæ cæteris partibus præferuntur, colliguntur, & croci nomine vel sola veniunt: radix subest bulbosa, carnosa, copiosa, & viuax.

SERITUR Crocus in pluribus regnis & provincijs, ubi in agris segetis modo latè viret: vt in Cilicia Cyrenis, in Sicilia, Italia, Pannonia, Germania, Gallia, Britannia. Gaudet, inquit Theophrastus, calcari pedibus: ideoq; iuxta semitas & fontes pulcherrimus exit. Seritur depositis radicum bulbis.

OPTIMVS, inquit Dioscorides, Coryceus: secundum locum tenet, qui iuxta Corycum versus Lyciam, & in Lyciæ Olympo: deinde ex Aegibus Aetholiæ. Cyrenaicus & Centuripinus omnium in Sicilia viribus minus pollent. Qui ab Aquila Vestinorum vrbe adfertur, primum sibi locum in Italia vendicare, Matthiolus ait: sed Aquilino tamen præstantior, qui circa Viennam Pannoniæ, siue, vt vulgo, Austriæ, nascitur. In Gallia nusquam vegetior quàm in Agenensi agrò, & Narbonensi, Ruellio teste. Probatum etiam, in Britannia insulæ meridionali parte, quam Angliam vocant, natus: ex altera verò & Septentrionali, quam Picti & Scoti tenent, reprobus est.

OPTIMVS autem vbicunque natus, qui pinguiſſimus, recens, fragranti odore, colore rutilo. Peſſimus ſqualidus & ſitum redolens.

CROCVS Autumno florere incipit, ſtatim, vt Theophraſtus ait, primis imbribus, Vergiliarum occaſu. Florem edit ante folia, quæ mox ſubſequentur, & hyenne tota vi-
rent, æſtate nullibi conſpicua.

GRÆCIS ſimiliter κρόκος, Latinis etiam Crocum dicitur: Mauritanis Zaffaran; atque inde in Italia, Zaffarano: Germanis, Saffran/ Gallis, Safran.


CÆTERVM Crocus paululum quid adſtringens obtinet, ſed ſuperat in eo calefaciens qualitas, vt tota eius eſſentia ſecundæ ſit ordinis excaſfacientium, primi exſiccantium: proinde & concoquendi vim quandam obtinet, adiuuante in hoc paucula illi adſtriptione, vt Galenus ait. Sodam, id eſt, Cephalalgiam, inquit Auicenna, facit, & capiti nocet: id quod non exiguo, ſed nimio ſuo uſu efficere poteſt. Vigiliæ ſiquidem copioſus inducit, quæ modum excedentes capiti & ſenſibus obſunt. Moderatus autem Croci uſus cerebro prodeſt, ſenſus vegetiores reddit, ſonnum & torporem excutit, latitiam gignit. Corroborat quoque Crocus cor, thoracis crudos humores ad concoctionem perducit, pulmones aperit, & ab obſtructione expedit; & ad hæc tam efficax remedium, vt ſubinde phthiſicis in ſummo vitæ discrimine, & propemodum animam agentibus, ſpiritus reducat, & vitam ad aliquot dies proroget, ſcriptuli dimidij, aut ad ſummum integri pondo, cum paſſo aut vinò Præmnio, vel alio dulci exhibitus: quo modo etiam datus, grauiffimas ſubiò irruentes, citra febrim dyſpnœas, ſtatim & momento temporis tollere, non ſemel à nobis comperit eſt. Crapulam etiam arcere, hoc modo ſumptum, Dioſcorides refert. Laudatur ad hepatis & fellis obſtructiones, nec

non ad Regium morbum; atque hinc bonum colorem Crocum efficere, Dioscorides scribit. Additur eodem auctore ad omnes, quæ interaneorum causa temperantur potiones: sed nostra ætate ad eas potissimum, quæ menses, fœtus & secundas educunt. Vrinam cit: Venerem excitat: ad vulva & sedis cataplasmata additur, nec non ad emplastra & cerata, veteres tumores & dolores discutientia: inflammationes herisipelatodes mitigat: compositionibus auricularibus vtiliter admiscetur. Oculos ab ectymatis & exanthematis cum lacte, aut fœniculi, Rosarumque stillatio liquore preseruat illitus, & humorum in eos influxiones reprimat.

DE HYACINTHO NON SCRIPTO. CAP. LI.

HVIC Hyacintho folia sunt oblonga, angusta, lævia & splendentia, Porri folijs angustiora & minora: caulis folijs viduus, glaber, teres, cuius coma florum pondere & mole, cum primum dehiscere incipiunt, grauata, deorsum recuruatur: flores oblongi, teretes, concaui, in latius se pandunt, per oras reflexi, colore vt plurimum carulei, subinde albicantes, aut candidi siue niuei, aliquando etiam Viola nigre dilutæ purpuram referentes: semen in siliquis triangularibus paruum, rotundum: radix bulbosa, candida, perennis, lento succo, vti & tota herba, plena.

REPERITVR Hyacinthus iste in pluribus regionibus, & in nonnullis maior ac præcocior: in alijs minor & magis serotinus. Is etenim quem Italia & Belgium, orientalem nominat, folia habet pinguiora & latiora, caules crassiores, flores patentiores maioresque, ac citius prodentes. Germanicus & Belgicus singulis minor, flores tamen plures gignit, sed serius exit. Reperitur in Germania, vt
Cordus



Cordus ait , in apricis quibusdam tumulis : in Belgio verò etiam in aruis, & iuxta agrorum margines, fruticibus aut arboribus consitos : & præcipuè quidem prope Mechliniam urbem, ubi copiosus nascitur.

FLORET Aprili & Maio mense , orientalis etiam Martio.

Τάξις Græci, Latini similiter Hyacinthum, ut Dioscorides auctor, Vaccinium quoque appellant. Vaccinium autem etiam Viola dicitur nigra, ut superius scripsimus. Cognominatur autem hic Hyacinthus non scriptus, ad differentiam nempe alterius superius descripti, qui luctus notas inscriptas habet.

DIOSCORIDES hunc Hyacinthum citra adiectionem nominat : nam alterum Hyacinthum Lilij purpurei nomine complexus videtur. Meminit huius Columella lib. 10. diversitatem coloris, quæ in floribus, vno versiculo complexus:

Nec non vel niveos vel cæruleos Hyacinthos.

Belgæ Hyacinthum istum Græcam appellationem retinentes *Hyacinthen* appellant. Ruellius, Gallis, Vaciet dici, auctor est. Sunt verò & alia multa huiusmodi Hyacinthorum species, ut recentiores iudicant, de quibus capite sequenti.

HUIUS porro Hyacinthi radix ordinis est primi in desiccando : secundi verò completi, aut tertij incipientis in refrigerando.

SEMEN leuiter extergit & adstringit ordine quidem tertio quadantenus exsiccans, caterum in medio consistens caliditatis & frigiditatis, auctore Galeno.

RADIX, inquit Dioscorides, cum vino albo pueris imposita, diu impuberes seruare creditur : aluum sistit : potamurinam ducit, & à Phalangio commorsis opitulatur.

SEMEN

SEME*N* contra serpentes auxiliatur: cum vino potum
Regium morbum expurgat.

DE ALIIS RECENTIORVM SPVRIIS
HYACINTHIS, CAP. LII.

DVOS Hyacinthos superioribus capitibus descripsimus,
vnum Liliij effigie scriptum: alterum paruum non scriptum.
Præter verò hos & alij multi, recentiorũ iudicio sunt Hy-
acinthi. Nam omnes ferè anonyms flores è bulbis exeuntes,
aut Hyacinthos aut Narcissos indicant; maiores siquidem
Narcissos, minores verò Hyacinthos.

INTER Hyacinthos itaque neotericos, primus folia
habet angusta quasi rotunda, bene virentia, per terram plu-
rima parte strata: cauliculos inter ea rotundos, glabros,
palmo longiores, in quorum summo flosculi parvi, rotundi,
caui, hiantes, colore ceruleo, aliàs diluto, aliàs saturato:
post quos siliquæ membranose triangulares, in quibus se-
men paruum nigrum: radix subest bulbosa. Peregrinus no-
bis hic bulbus est, neque vsquam in Belgio sua sponte exit: in
hortis satus faciliè comprehendit, & in plures bulbos citò
multiplicatur. Folia ante Hyemem exeunt: cauliculi primo
Vere: flores Martio.

HYACINTHVM Fuchsius appellat, & alteram eius
speciem facit. Nobis bulbus quidam esculentus esse videtur.
Sunt autem esculenti bulbi complura genera, vt Plinius &
Theophrastus tradunt.


ET genera quidem, inquit Plinius, Græci hæc fecêre:
Bulbinen, Setanion, Pythion, Acrocorion (nonnulli Acrosc-
corodon legunt) Aegilopa, Sisynrichion. Quæ & Theophra-
stus, sed tamen non omnia lib. 7. cap. 13. refert. Sunt au-
tem quorum ipse meminit, λευκίδιον, & βολβίτην, & ὁ πιτιών



καὶ κίχξ, καὶ τρέπον τίνα τὸ σισυρίχιον. *Leucoion inferius describetur. Bulbinen, Plinius ait, Gracos appellare herbam Bulbine. porraceis folijs, rubicundo bulbo. Setanium, cepa quoddam genus est, ut Theophrastus & Plinius testantur. De Sisynrichio iam antè scripsimus. Pytion, Cyix, Acroscorodon, Aegilops, cuiusmodi bulbi sint, nondum certò reperire licuit: suspicandū videtur Κόικα & Acroscorodon idem esse. Apud Theophrastum enim κίχξ πυτιώνα: apud Plinium eundem Acroscorodon ordine succedit. Ex horum autem bulborum numero aliquem esse, hoc Hyacinthi vulgo dicti genus verisimile videtur; sed quis tamen sit, propter nimiam veterum breuitatem explicari nequit. Si coniectura vti licet, bulbus iste Acroscorodon est: si non, Acroscorodon allij genus sylvestre est. Nam folia, allij quandam similitudinem habent: nomen autem Acroscorodon similitudinem aliquam cum Allio indicat.*

H V I C autem similis est & alter quidam spurius Hya-² cinthus, folijs similiter per terram stratis, sed latioribus & porri folijs similioribus, caule crassiore, floribus candicantibus, maioribus quàm alterius. Reperitur in hortis. Floret eodem quo prior tempore. Matthiolus hunc pro bulbo vomitorio depingere videtur, nullis interim notis eum describens; nullis testimonijs aut rationibus sententiam suam adstruēs; sed nudam qualemcunque imaginem cum nominis inscriptione exhibens. Nos bulbum vomitorium ab isto planè diuersum infra descripsimus: & hunc ex esculentorum numero esse censuimus.

Q V I tertius est inter neotericos Hyacinthos, folia ha-³ bet longa, pingua, aliquantulum lata; caules longos, subinde dodrante altiores: flores à medio sursum versus, vndeque circa caulem multos, paruos, cauos, primum purpurei; vbi verò flaccescunt, obsoleti coloris, (reperiuntur & candidi)




didi) cacumine comofo: radicem, vti aliorum; bulbosam, sub-
ruffam, ac subpurpurei coloris. Reperitur, Fuchfio teste, in
Germania nemoribus: vt autem Matthiolus, inter fegetes
& in fyluis. Aprili aut Maio floret.

HYACINTHI speciem, & quidem primam, Fuch-
fius, Tragus & Matthiolus faciunt: nonnulli Hyacinthum
fylueftrem nuncupant. Germani alicubi *Brenling* ap-
pellat, alibi *Honds knoblauch*/id est, Allium Caninum.
Non est tamen Allij aliqua species, fed bulbi efculenti genus
quoddam, veluti Bulbina; cui certè fimillimus est. Bulbo
enim Bulbina rubet, & Porri folia Plinio auctore habet.
Videtur autem hac ex Africa bulbus efle, quem Afrum co-
gnominant. Huic fi quidem Dioscoridis $\pi\upsilon\phi\phi\omicron\nu$, id est, ruf-
fum bulbum efle ait. Sunt autem qui velint hunc tertium
spurium Hyacinthum Scilla aut Pancratij speciem efle:
quorum iudicium ea propter à nobis non probatur, quòd
Scilla & Pancratij bulbi grandes fint, huius autem paruus,
& illorum comparatione exiguus.

SUCCEDIT huic quartus ex spurjis Hyacinthus à 4
Matthiolo depictus, folijs oblongis ac lais: caule longiuscu-
lo, ab imo ferè vfque ad summum flosculis circumueftito:
radice bulbosa: quantum quidem ex eius icone colligere li-
cet. Neque enim qualis & huiusmodi ab ipfo nuncupatus
fit, affcripfit, fed folam imaginem exhibuit: quafi illa fatis
ad cognitionem eius efle poffet.


NUNCUPAT autem eum Orientalem alterum; &
ab Orientali ac legitimo Hyacintho, cuius antecedente ca-
pite meminimus, fecundum facit.

QVINTVS appellatus Hyacinthus, qui ferotinus est, 5
folijs est anguftis, paruulis, & minoribus, quàm primi: cau-
liculis breuibus, tres aut quatuor digitos altis; flosculis in
summo raris, caruleis; ftaminibus in medio exiguis: femine
in filu-



in filiquis triangularibus exiguo : radice parua & bulbosa.
Nascitur Gallie quibusdam provincijs, vt iuxta Parisiorum
Lutetiam. Floret exitu aestatis Augusto aut Septembri.

AUTVMNALEM Hyacinthum ea de causa & se-



rotinum nominant : neque aliud eius nomen cognitum habemus.


- 6 PRÆTER hos & aliū quendam pro Hyacintho bulbum Leonhartus describit Fuchsius, folijs modò binis, modò ternis, latinisculis, Porri minoribus : floribus circa cauliculi summum sparsis, multum & radiantis stellæ ferè similitudine patentibus, colore carneis aut candidis : quos succedunt capitula rotunda, ochri magnitudine, in quibus semen milio simile : radice bulbosa, rotunda. Reperitur plerisque Germania locis, lato, pingui, sed inculto solo. Martio, quandoque etiam Februario flos exit.

GERMANI blo Mertzzenblumen / & blo Honnungs blumen appellant. Fuchsius pro Hyacinthi specie depinxit. Plerique Hyacinthum stellatum ab ipsa floris effigie vocant. Existimauimus aliquando Satyrium esse, verum hæc modò opinio displicet. Satyrio enim caulis est caubitalis ; folia Liliij, bulbus mali magnitudine : bulbo verò isti, folia paruula, angusta, bulbus exiguus, & cauliculus breuis.

CÆTERVM quod ad vsum attinet horum spuriorum Hyacinthorum, nostris quidem aut in cibatu, aut in medicamentis nullus est ; proinde & vires ac facultates eorundem inexploratae : soli flosculi in hortis gratiam inueniēre.

DE BULBO LEVCANTHEMO, SIVE ORNITHOGALO. CAP. LIII.

LEVCANTHEMO bulbo folia multa sunt & angusta, graminis minora : caulis inter hæc exit dodrante minor, rotundus, glaber, absque folijs : flores in summò dispersi emicant sex aut septem, foris herbacei viroris, intus candidi, ex sex foliolis commissi, exiguis lilijs, præsertim prius quàm adaperiuntur similes ; qui Sole quidem splendente patent,



M

tent, noctu verò & cum aër nubilus etiam interdiu reclusi permanent: capitula succedunt triangularia, Cachryos semini similia, in quibus semen exiguum: radix bulbosa, leno succo plena, sapore ut plurimum insipida & aquea, cum obscura tamen quadam acredine. Reperitur in agris frumentarijs, apud Erabantos locis compluribus. Maio mense flores edit.

Ornithogalon
Matthioli.

IN Belgio, *Welt ayeuy* appellatur, à Græcis *δερβιλλαν*, quod à Plinio Ornithogale dicitur. Matthiolus alium omnino bulbum pro Ornithogalo depingit, caule videlicet foliosum, à nostro hoc Ornithogalo, quod Dioscoridis legimum est, ea de causa differentem.

Ornithogalon
Ruellij.

DESCRIBIT porro & aliud Ornithogalon Ruellius lib. 2. cap. 77. quod à rusticis in Sueſſionum agris eruitur: radice, inquit, bulbaceam speciem præ se ferente; è cuius medio cauliculus exit, tribus aut quatuor adnatis in cacumine: folijs, in capillamenta quadam extenuatis: floribus exiguis, foris herbaceis, intus lacteo candore candicantibus, qui simul coaceruati, veluti panicula quadam compactis callo squamatim coherentes, in pilulam extuberant, nucamentum pineæ nucis representantem: radix in orbem ferè collecta est, cortice pullo, candidissima intus carne, pulpaque perquam odorata. Vere vel æstate cum fronde viret: hyeme vel autumno cum exarantur agri, radicibus velluntur: diu seruari potest: & ubi annonæ premit inopia, plebis rustica famem & ieiunia Castanearum more satiat, nec aliud humo genitum promptius in cibos cedit, cum frugum penuria gliscit. Mirè suisbus expetitur: rura ex agris sponte natum gratiorem cibum non norunt: lautiores etiam mensas ditiorum non reformidat. Pueris non incognita radices, qui propter astantes cum aratro terra proſcinditur, aut in latiores porcas sulcatur, erutos vomere, colligunt, multo Castaneis suauio-

fuauiores: quibus & crudis, & in cineribus incoctis vescuntur. Snesioneusis ager, Churlos vocare consuevit: Hactenus Churli. Ruellius.

AT nobis huiuscemodi radix, non Ornithogalon, sed Bulbocastanon quoddam esse videtur. Radix enim est bulbi forma, sapore Castanea; quale Bulbocastanon esse, nomen ipsum satis indicat.

DESCRIPSIMVS tamen nos in historijs stirpium vulgari lingua editis, aliud & huic dissimile Bolbocastanon; solijs videlicet Apij tenuioribus ac minoribus, ad Anthi accedentibus: caule tenui, dodrantali: floribus in umbellis candidis: semine paruo, odorato: radice rotunda, & quando inaruit rugosa, foris nigra, intus candida, sapore inter Pastinacam & Castaneam medio; quod in Zelandia, Hollandia, ac etiam Britannia agris frumentarijs reperitur, & Alexandri Tralliani Βολβοκασάνη seu ἀγριονκασάνη simillimum est. Sed ad Ornithogalon excurrens reuertatur sermo.

DIOSCORIDES Ornithogalis fructum, ait, una cum pane coqui, ut Melanthium: radicem vero bulbosam, & crudam, & coctam edi.

DE BULBO SYLVESTRI.

CAP. LIIII.

BULBO superiori capite descripto, non multum absimilis videtur, quem Leonhartus Fuchsius, & Hieronymus Tragus, sylvestrem agnominant: sunt tamen huic folia pauciora, & vnicum aut duo tantum, angusta & porracea: caulis brevis, tener, rotundus, dodrantalis, aliquot in summo adnatis, in quibus flosculi stellatim radiati, bulbi Leucanthemi minores, colore ex herbaceo in luteum elanguescentes;

tes; staminibus in medio capillaceis; capitula semen serenitria triangularia; radix bulbosa, lenti succi, nullius odoris, sapore aliquantulum, sed perobscurè Cepam referens. In Germania locis umbrasis ad margines pratorum exire fertur. Martio ac Aprili floret, fructumq; perficit.

GERMANI *ffeldzwibel*, *ackerzwibel* appellant; quasi dicas Cepam agrariam. Ex sylvestrium & sponte nascentium bulborum est numero. Quo nomine à veteribus nuncupatum fuerit non constat.


FACULTATES autem huius incognitæ sunt. Hieronymus tamen Tragus, ex bulbo sub cineribus cocto, cum melle cataplasma, vlceribus depascentibus vtiliter imponi refert.

DE NARCISSO. CAP. LV.

NARCISSI genera, Dioscoride auctore, duo sunt. Vtriusque flos albus est: sed vnus medio purpureus; alterius luteus.

1. MEDIO purpureus, folia habet virentia oblonga, Porri folijs similia: caulem angulosum, absque folijs, dodrante aut pede altiore, & in summo florem è membrana erumpentem, vt plurimum vnicum, subinde geminum, mediocriter amplum, odoratum, ex sex candidis foliolis congestum, in quorum medio brevis calyx est circinatæ rotunditatis, purpurei per oras coloris, intra quem stamina brevia, cum apicibus subluteolis: capitula inde angulosa: semen in his nigrum: radix bulbosa Cepæ similis, qua nucleos ex se demittens in multos facîle bulbos multiplicatur. Reperiuntur autem huius generis tres, forma, colore, aut odore nequaquam; sed florendi tempore differentes; magnitudine etiam nonnihil, sed parum, dissidentes. Maiores medi; præcoces & serius prodeuntes minores sunt.


ALTER



- 2 ALTER Narcissus medio luteus, folia habet longiora, latiora, & aliquantulum minus virentia : caules proceriores, crassiores, & in singulis flores tres aut quatuor, prioribus similes, sed medio luteo ; semen & radicem bulbosam similia.
- 3 HUIUS generis & alius quidam tertius Narcissus est, folijs non modo quàm primus, verùm etiam quàm Asphodelus, latioribus longioribusq̃; floribus in singulis caulibus quatuor aut pluribus, candidis, minoribus, medio eorum luteo, calyce eminentiore, multo tamen quàm Narcissi lutei fluestris brevior: radix similis est & bulbosa.
- 4 IAM & quartus quidam est Narcissus antedictis forma similis, sed per totum florem & medio quoque candidus.
- 5 SUNT & Narcissi multiplicibus floribus, cum primis, tum alterius generis, folijs & bulbis alijs haud dissimiles. Ita varia semper natura, & ad stirpium herbarumq̃; genera multiplicanda secunda; tum ad ea permutanda prona; praesertim si cultus mangonio adiuuetur, vel in alium locum stirpes transferantur. Hæc etenim plurimum posse ad stirpium mutationem, & alibi scripsimus.

EXEUNT qui medio purpurei sunt plerisque Gallie locis, & apud Heduos ac Sequanos, in pratis. Dioscorides in montibus potissimum nasci tradit. Theocritus in pratis Narcissum gigni testis est, Eidylio 20. ubi Europam cum suis prata ingressam, bene spirantem Narcissum carpisse, canit his versibus:

Αἱ δ' ἐπεὶ δὴν λειμῶνας ἐσθλὰς ἀνθεμέντας,
 Ἀλλὰ ἐπ' ἀλλήλαισι τότ' ἀνθεσι θυμὸν ἕτερον,
 Τῶν ἢ μὲν νάρκισσον εὐπνοον, ἢ δὲ ὑάκινθον: Id est,
 Florida sed postquàm venêre in prata puella,
 His illa: hæc alijs se floribus oblectabant ;
 Narcisso illa quidem bene olente, atq̃ illa Hyacintho.



FLORENT in Belgij hortis , prioris generis præcoces Narcissi , initio Aprilis : medijs sub finem , seriores Maio mense : medio lutei eodem ferè quo primi generis medijs , tempore.

GRÆCI huiusmodi flores *Ναρκισσους* , Latini similiter *Narcissos* nuncupant. Belgæ, *Narcissen* & *Spaensche Heuetten*. Germani, *Narcissen roszlin*. Dictum autem *Narcissum* Plutarchus in *Sympostijs* , quasi nervos hebetantem , & torpidas facientem grauitates , refert. Quapropter & Sophocles magnorum subterraneorum deorum coronamentum eum vocat , quod scilicet defuncti & morte torpidi , torpido flore merito coronarentur . Appellatur autem *Narcissus* etiam *λείριον* , & Apuleio teste , *ἀνδρῶς* , *βολῶς ἐματρὸς* , *αὐτογενὲς*. *Lirium* autem Theophrastus etiam appellat , cui latius est herba folium , & flos melinus longior , qualis utique tertius est ; quem & ait sponte germinare : qua de causa *αὐτογενὲς* , id est , à seipso genitus , vel per se nascens , dici potest. Sunt verò & alia *Liria* sui generis , de quibus supra scripsimus : & *Lilium* quoq; *Lirium* est. *Iulius Pollux* , *Homerum* *Lirij* appellatione , complecti omne florum genus , auctor est . *Ανδρῶς* autem *Narcissus* propriè montanus est , eo quòd ab aquis remotus proueniat. *Βολῶν ἐματρὸν* nomen ab effectu habet : *Dioscoride* siquidem auctore *Narcissus* etiam vomitum concitat . Est tamen & alius bulbus vomitorius propriè dictus , de quo capite subsequente.

DE priore horum *Narcissorum* videtur scripsisse Theophrastus lib. 7. vbi *Narcissum* ter florere , uti *Scillam* refert ; & tria quoque arandi tempora , uti illam demonstrare . nam *Scilla* quidem caulem florum ternos exortus ostendere ait : *Narcissum* autem caulem non habere alterum , iuxta eum qui floris est . fieri autem non potest , ut ex eodem caule

ter floreat. proinde tres differentes bulbos esse consequitur, qui tribus temporibus florent, uti Narcissum medio purpureum facere iam scripsimus. Hunc etenim ter florentem existimare possunt, qui omnes tres vno eodemque loco reperiunt, & differentes bulbos esse non animaduertunt. Idem verò & hic Narcissus medio purpureus ille est, quem Plinius lib. 21. cap. 19. purpurei floris esse scribit. Narcissi duo genera, inquit, medici in usum recipiunt: vnum purpureo flore, alterum herbaceum. Nam purpurei floris Narcissum nuncupat, cui medium purpureum, ut eiusdem lib. cap. 5. seipsum explicans ostendit. Huius alterum, ait, genus flore candido, calyce purpureo. Calycem autem dicit, quod in medio flore, circuli instar, & stamina ac apices continet. De hoc etiam Narcisso Vergilius in Bucolicis ecloga quinta:

Pro molli Viola, pro purpureo Narcisso,
Carduus & spinis surgit Palinurus acutis.

SECUNDI verò & potissimum tertij Narcissi, Ovidius tertio Metamorphoseon lib. meminit: ubi Narcissi formosi adolescentis mutationem in florem sui nominis describit, hoc carmine:

Nusquam corpus erat, croceum pro corpore florem
Inueniunt, folijs medium cingentibus albis.

DE tertio etiam scripsit Theophrastus lib. 6. De alio siquidem hoc loco, quàm lib. 7. agit. Libro siquidem 7. folium ei tribuit angustum, quale vtrique primus habet: sexto verò latius quàm Asphodeli, uti tertij est: quod diuersis locis, de differentibus Narcissis eum scripsisse, conuincit. Scribit autem Theophrastus lib. 6. Narcissi florem esse luteum, siue melini coloris, quod de medio floris calyce accipiendum esse, Onidij testimonio iam ostendimus. Exemplaria penè omnia μέλανα τῇ χροιᾷ habent, quod Hermolao & Marcello occasionem dedit, ut Narcissi florem nigrum esse exi-

Theophrasti
locus
emendatus

stimauerint. Sed pro μέλανα reponendum est μάλινα. Est autem Melinus color, idem qui ochreae siue luteus.

PVTATVR autē & hic Narcissus serotinus à Theophrasto haberi, & Autumno demum florere, propterea quod in ijs quæ extant exemplaribus, huius descriptionem mox subsequantur hæc verba: μετὰ γὰρ ἀρκτοῦρον ἢ ἀρθροσις, καὶ περὶ ἰσημερινόν, id est, post Arcturum productio floris est, & circa æquinoctium. Verum ad Narcissi historiam hæc non faciunt: inter Narcissi siquidem descriptionem & verba ista, defectus ac hiatus est. Nec spectant etiam ad Croci, uti Conradus Gesnerus in appendice scribit, quam Germania suis hortis subiecit: sed ad Lirij alterius historiam pertinent, quod eodem libro, paulo inferius Theophrastus vñd cum Croco τοῖς πρώτοις ὕδασι, hoc est, primis imbribus, siue Autumno, florere ait; ut diligenter vtrumque locum expendentibus manifestum statim fiet.

Ac totidem quidem, quos propriè Narcissos dici opinamur, obseruare nobis contigit. Sunt tamen & alij quidam lutei appellati Narcissi, de quibus in mox sequentibus capitibus.

MVLTORVM etiam Matthiolus icones exhibet; quos tamen excepto primo, non Narcissos, sed omnino alterius generis flores esse indicamus. Nam quos secundo, tertio, & octauo locis depingit, Scillarum aut bulborum litoralium species videntur; quales, & alibi & in Narbonensi Gallia, plerisque locis sponte exeunt. Quartus similis illi bulbo, quem Marcellus Vergilius cap. de Narcisso in commentarijs suis his verbis describit:

Narcissus
Marcelli
Vergilij.

Nos in Apenninis montibus his nostris, frequentem vidimus florem Augusto & Septembri mensibus florentem, figura Lirij, dodrantali altitudine, folijs qualia in Narcisso describuntur, singulari caule, iisdemq; alijs omnibus, excepto


cepto colore, qui nec candidus, nec purpureus, ut Plinius docet sit, sed inter candidum & luteum colorem, nullius aut exigui odoris; vidimus & in mitioribus collibus enatum, sed non tam speciosum & magis albicantem. Quintum Gesnerus & passim omnes Tulipam vocant. Sextus & septimus Leucoia sunt bulbosa, flores à Narcissis multum differentes, de quibus infra.

CÆTERVM Narcissi radix, ut Galenus ait, usque aded exiccandi facultate pollet, ut & maxima vulnera glutinet, vel ad incisiones usque, quæ circa tendones accidunt: habet verò quiddam absterforium & attractorium. Eadem, auctore Dioscoride, siue estur, siue bibitur, vomitus mouet: prodest ambustis ab igne cum melle trita: præcisos quoque nervos agglutinat imposita: luxatis item malleolis diuturnisq; articulorum doloribus trita cum melle, & imposita subuenit: expurgat ephelin & album cum vrtica semine & aceto, at cum eruo & melle vlcerum sordes expurgat, & abscessus qui agrè maturantur rumpit: educit & aculeos infixos cum Lolij farina & melle.

DE NARCISSEO LVTEO IUNCIFOLIO,
SIVE BULBO VOMITORIO.

CAP. LVI,

HVIC Narcisso folia sunt oblonga, angusta, crassa interim propemodum rotunda, admodum lauia & flexibilia, iuncis cum lauiore, tum colore, & quodammodo flexibilitate, nec non rotunditate similia; inter quæ medius exit caulis; in summo cuius, flosculi tres aut quatuor, vel plures, odorati, Narcissis forma similes, verum minores & colore per totum florem lutei: radix bulbosa, candida, tenui nigra



membrana integitur. Nascitur plerisque Hispania locis sua sponte. In Belgio Aprili mense florem promit.

HISPANIA a similitudine, quam folia cum iuncis habent, Ionquillias nuncupant: nos Narcissum Iuncifolium dicere possemus. Dioscoridis est Βολβός ἐμετικὸς, sine bulbus vomitorius. Id quod ex ipsa bulbi vomitorij descriptione colligi potest; quæ sic habet: Βολβός ὁ καλούμενος ἐμετικὸς ἔχει τὰ φύλλα ἰμαντωδέστερα, καὶ πολλὰ μακρότερα τοῦ ἐδωδίκου ρίζαν ἰοικῶσαν βολβῶ, περὶ ὃν φλοιὸς μέλας. Id est, Bulbus nuncupatus vomitorius folia habet flexibilia & multo longiora quàm esculentus; radicem bulbo similem, circa quam membrana est nigra. Quæ descriptio huic Narcisso Iuncifolio simillima est: folia ei siquidem sunt multo quàm alicuius bulbi ἰμαντωδέστερα sine flexibilia, utpote iuncæ propemodum lentoris; & perquàm longa, longioraq, multo quàm esculenti bulbi; & radix in tenui nigra membranula reconditur.


QUIBUS autem facultatibus Narcissus Iuncifolius præditus sit, nullo recentiorum experimento aut testimonio constat. Dioscorides verò bulbi vomitorij radicem si edatur, aut si decoctum eius bibatur, vesicæ malis auxiliari, & vomitum facere, memoria prodidit.

DE NARCISSEO LUTEO SYLVESTRI,

SIVE PSEVDONARCISSEO.

CAP. LVII.

LUTEVS Narcissus sylvestris, folia Porri aut Narcissi familia promit, sed breviora ac minora: caules dodrantales, atque in singulis flores singulos Narcissi similes, sed medio eorum calyce longiore, oblongioris calathii similitudine, colore per totum luteo, absque odore: capitula rotunda, oblonga, in



ga, in quibus semen: radix bulbosa, vt aliorum Narcissorum. Reperitur non paucis Belgij locis, circa margines agrorum & veruactorum, humido praesertim solo, & in syluis locisq; arboribus consitis: & similibus quoque cum in
 Germa-

Germania, tum in Hispania: transfertur etiam in hortos. Floret Februario mense: Germani ea de causa *Geel Hornungs blumen* / id est, nostrate dialecto, *geel Sporkelbloemen* / nuncupant. Februarius enim Germanis *Hornungs mont* / Belgis, *Sporkelle*.

APPELLANT verò & hunc *Narcissum* Belgæ, *geel Tydeloosen*: Latine autem vulgo *Narcissus luteus* & *Pseudo-Narcissus* dicitur.


CÆTERVM quod ad vires attinet, recentiorum quorundam experimento exploratum est, *Narcissi* huius lutei sylvestris radicem decoctum per alium lentos & pituitosos humores, nec non serosos expurgare; & his prodesse, qui crudorum copia grauantur humorum; semine anisi & Zingiberis nonnihil additis, quæ ut minus noceat, minusq; molestum sit ventriculo, adijciuntur.

DE LEVCOIO BVLBOSO.

CAP. LVIII.

LEVCOII bulbosi tria nobis obseruare genera contigit: vnum trifolium, alterum hexaphyllum, tertium polyanthemum cognominari potest.

PRIMUM folia ex singulis bulbis bina promit, oblonga, angusta, in virore albicantia, folijs *Pseudo-Narcissi* lutei colore proxima, inter quæ medius exit cauliculus palmaris, in cuius summo flos è vaginula oblonga erumpit, à tenui pediculo deorsum dependens, foliolis tribus constans maioribus candidis, intra quæ alia tria breuiora ac minora, pallidè virentia, & aliquantulum striata; in medio floris stamina cum apicibus luteis: radix bulbosa est, foris obscuri & eius cuius *Castaneæ* nucleus coloris, quæ facile in plures bulbos multiplicatur. Peregrinus Belgio flos, sed Italiae & alijs



alijs regionibus familiaris. Exit prematurè Februario mense, reliquos omnes ferè flores antecedens:


LEVCOION videtur bulbosum Theophrasti, cuius meminit lib. 7. ubi bulbos recenset; & quod lib. 6. primum sese ostendere ait, & emicare ubi calum clementius est, statim etiam nondum hyeme exacta; ubi verò immitius postea. Nos ad differentiam sequentium, non inconcinne Trifolium bulbosum Triphyllon, & Violam bulbosam trifoliam, nunc pari posse existimauimus, à tribus nempe floris foliolis.

PROXIMO generi folia similiter sunt angusta, Porri 2 & Pseudo-Narcissi similia, sed breuiora, virentiora, lauiora & magis resplendentia, versus terram aliquatenus reflexa: cauliculi tenues, palmares, flores in singulis singuli, rarissimè gemini, deorsum quoque penduli, colore candidi, ex sex foliolis aliquantulum striatis commixti, staminibus in medio cum luteolis apicibus: semen in rotundis capitulis paruum, rotundum, laue, & colore flauum: radix candida & bulbosa in plures faciliè propagatur. Plerisque Germaniæ superioris locis in vmbrosis & humidis syluis reperitur: apud Belgas hortorum areas exornat. Floret eodem quo superius tempore, aut non multo post.

GERMANI, weiß Hornungs blumen: Nostri witte Tydeloosen appellant.


LEVCOII bulbosi genus esse manifestum est; quod exaphyllum, non abs re, à sex floris foliolis cognominatur. Matthiolus cum istud; tum superius Narcissi speciem facit, vt cap. de Narcisso scriptum est.

TERTIVM Leucoion bulbosum caule & folijs se- 3 cundo simile est, maius tamen ac procerius: florem in singulis cauliculis non vnicum, sed quinq; aut sex & particulatim quidem florentes, profert, alterius floribus forma &



*magnitudine per omnia similes. Est & hoc nobis hortense
tantum. Non primo Vere, cum alijs duobus, sed multo post,
Aprili videlicet demum mense, vna cum Narcissis floret.*

VIOLÆ



N 2

VIOLÆ siue *Leucoij bulbosi* species haud dubiò quædam est; sed serotina.

AT de facultatibus horum *Leucoiorum* nihil quod adferamus habemus, cum à veteribus de ijs nihil reperiat^{ur} proditum, & à recentioribus nihil quoque obseruatum.


DE TVLIPA. CAP. LIX.


EX bulbosorum florum numero & *Tulipa* est flos peregrinus; cuius differentes sunt species: quædam maiores sunt, aliæ minores.

- 1 **MAIORIBVS** forma eadem satis omnibus est; folia eis bina aut terna, crassa, oblonga, lata, per oras subinde modicè reflexa, quæ cum primum erumpunt, modicè rubere videntur, adulta verò albicant: caulis inter ea exit pedalis aut paulo altior, cui vnicus flos insidet sursum spectans, è senis foliolis, patenti profundiori & aliquantulum angustioris oris cyatho, aut inuerso huius forma pileo quodammodo similis; staminibus in medio croceis: color flori subinde luteus est, aliquando dilutè quasi purpureus, non rarò rubet, medio tamen luteo, & quandoque etiam extremis foliorum; odor nullus; semen cartilagosum, planum, in capitulis nascitur, quæ maturato semine in tres dehiscunt partes. radix bulbosa est, *Narcissi* bulbus haud dissimilis. Differunt inter se magnitudine nonnihil flores; maior serè luteus, minor rubeus; medius qui purpureus.

- 2 **MINORES** *Tulipæ* folijs sunt angustioribus, & serè porraceis; cauliculis tenuioribus ac brevioribus: floribus minoribus & minus in latitudinem sese pandentibus: bulbis minoribus.

IN *Trachia* & *Cappadocia* *Tulipæ* exit: *Italia* & *Belgio* peregrinus est flos. Minores alicubi in *Gallia Narbonensi*





nensi nasci feruntur . Aprilis mense Tulipa florem Belgium videt.

TVRCICO & peregrino nomine Tulipam recentiores nuncupant , à Dalmatico pileo Tulipa dicto, cuius formam referre patens slos videtur . Quo nomine à veteribus hic slos dictus fuerit, non constat . Suspiciari quis posset, πωτιώνα esse , si edulis bulbus esset , & cogendo lacte efficax . Nam πωτιών quidem à Theophrasto inter edules bulbos re- πωτιών, fertur ; & herba est , qua lac cogitur , ut ait Hesychius . Conradus Gesnerus Tulipam Satyrium esse existimavit, & quidem Erythronium , quod videlicet flore vna species rubeat ; aut omnino Satyrj aliquam speciem . Cum quibus an conveniat , & quantum, ex subscriptis Satyrionum descriptionibus relinquimus diligentius considerandum .

DE viribus autem & facultatibus Tulipæ nihil compertum habemus, aut à quoquam scriptum reperimus.

DE SATYRIIS EX DIOSCORIDE ET
ALIIS. CAP. LX.

PRÆTER Orchies dictos, quos etiam Satyria Plinius & Apuleius appellant , duo Satyrj genera Dioscorides esse tradit : vnum τεῖφυλλον siue trifolium , alterum cognomento ἐρυθρόνιον .

TRIFOLIUM folia fert tria deorsum reflexa, Lapathio aut Lilio similia , verum minora & rubentia : caulem ἄλκον, id est, tenuem siue nudum, cubitum longum ; florem Lilij specie, album : radicem bulbosam, uti malum, πωππᾶν siue fuluam, intus ut ouum candidam, gustu dulcem, & origratam . Idem Satyrium Plinius lib. 26. cap. 10. etiam, sed paulo aliter describit : Folia ei siquidem non Lapathi aut alterius Lilij, sed rubri Lilij esse ait , quæ multo angustiora

Plinij locus animaduvertitur.

& minora sunt quàm candidi Lily: & radices ei genuinas, contrà planè quàm Dioscorides, facit. Verba Plinij sunt: Graci Satyrion solijs Lily rubri minoribus, & tribus non amplius è terra exeuntibus tradunt: caule lani cubitali, nudo: radice gemina, cuius inferior pars & maior mares gignat; inferior ac minor feminas. Pertinent autem quod de gemina radice additur, ad Orchion, non verò Satyrj historiam. Radicem autè huius Satyrj Dioscorides ait oportere ex vino austero coctam ad opisthotonon bibi: & ei qui velit cum muliere concumbere hac utendum fore; fertur enim ipsam ad Venerem potentiam excitare.

- 2 *ERYTHRONIVM Satyrium siue Erythraicum, semen habet lini femini simile, sed maius, robustum, splendens & laeve, quod & ipsum narratur Venerem excitare, ut Scincus: est radici cortex subtenuis & suluus, interna verò pars candida, gustu ori grata & dulcis. Nasceitur in soli expositis & montanis locis. Fertur ad Venerem incitare radix, etiam si manu teneatur: cum vino verò sumpta multo magis. Eadem ferè de Erythronio Plinius; nisi quod semen ei non lini, sed viticis maius ac lauius tribuat, & vires ei plures ex aliorum tamen relatu adscribat: arietibus scilicet quoque & hircis segnioribus in potu dari; & à Sarmatis, equis ob assiduum laborem pigrioribus in coitu: quod vitium profedamum vocant.*

SED postea quàm tam magnas Erythronio Satyrio, ad venereas libidines incitandas, vires & Dioscorides & Plinius tradi scribant, suspicandum non temere videtur, Satyrium istud, herbam esse eam, quam Indum quendam attulisse Theophrastus lib. 9. ait; ad rem Veneream efficacissimam: potissimum cum nec huius, nec alterius Satyrj, Theophrastus vspiciam meminerit. Si etenim Erythronio tam efficax vis est, ut etiam in manu sumptum libidinem excitare queat;

queat; non multum ab Indi illius herba (si non eadem est) facultate differens esse oportet. Ad rem siquidem Veneream mirum in modum herba pollebat, quam Indus attulerat: nec enim solum edentibus, sed etiam tangentibus tantum, genitalibus vini dixere adeò vehementem fieri, ut quotiens vellet coire valerent; uti refert Theophrastus. Verùm hanc ea de causa cum Erythronio eandem esse affirmari certò non potest, cum non raro dissimiles eiusdem aut similis facultatis stirpes reperiuntur. Coniecturam nostram indicauimus, iudicium exactius studiosis permittimus.

DE ORCHIIS. CAP. LXI.

ORCHIΩN multæ & differentes reperiuntur species, quas veteres paucioribus quidem, nos quinque generibus comprehendendas putauimus. Primum genus Cynosorchin, siue canis testiculum: proximum testiculum Morionis: Tragorchin tertium: quartum Orchin Serapian: quintum testiculum odoratum, siue testiculuni pumilionem cum Cordo appellauimus.

CYNOSORCHIOS complures reperiuntur species. Cynosor-

PRIMA folia habet lata, pingua, lilij folijs propemodum similia; caulem pedalem aut altiore, angulosum; & in eo flores copiosos, spicatum digestos, colore rubentis dilutæ purpuræ, cucullo aut galeæ patenti similes, ex quibus parte inferiore lacinosum quiddam, canis aut alterius animalis quadrupedis exuuiò simile dependet, dilutè & ipsum purpurascens, punctulis magis purpureis respersum: pro radicibus, præter fibras supra adherentes, gemini sunt bulbi veluti testiculi, forma aliquantulum oblongi; quorum vnus plenior ac vegetior, alter rugosior.

ALTERA species folijs similiter lauibus oblongis & 2



latis est, sed quàm antecedentis minoribus & angustioribus, quinque aut sex, nonnullis caulem amplectentibus, qui dodrantalis est: spica densa, breui, in qua flores multi; colore ex candore purpurascens, multis purpureis punctis & interiore parte obscurioribus copiosis exiguis lineis ornati; forma galeam aut hiantem cucullum quoque referentes, dependente ex singulis veluti animalculi quadrupedis, aut homunculi extensis brachijs & diuaticis cruribus absque capite corpusculo, eodem ferè modo quo ex Saturni ore depingi solent dependentes pueruli: radices subsunt duæ globosæ, nuclei nucis myristica magnitudine; adhaerentibus ad amplexum fibris aliquot crassius.

TERTIA Cynosorchios species, folia edit angustà, 3 striata, plantaginis angustifolia folijs modo quodam similia: caulem dodrantalem: flores in breui densaq; spica copiosus; colore foris puniceo & obscuriorem purpuram referente, intus verò albicante; eiusdem cum superioris forma, sed tamen minores; dependente quoque ex ipsis rudi ac informi exiguo quadrupedis veluti animantis rudimento: radices subsunt aliorum Orchion similes.

HVIC & alius floribus per omnia similis quidam Cynosorchis est, folijs tamen latioribus, & secundum referentes, quem Cynosorchios speciem quartam non ineptè quis fecerit.

IAM & quinta quadam species reperitur, folijs vti secundus canis testiculus: caule pedali, spica longa, floribus colore herbaceo subuirentibus, ex quibus quod lacinia simile dependet, oblongum est, & quasi quadrangulum. Ex horum numero primus vel secundus, vel vterque, Cynosorchis est à Dioscoride descriptus. Vterque enim horum folia habet lauiæ, Scilla mollioris siue Epimænidia folijs similia, quadamq; horum erecta caulem amplectentia: alia verò versus terram incli-

Cynofor-
chis Diof-
coridis.

inclinata: caulem non raro altiore dodrante: flores purpurascentes: bulbos radicum oblongis oliuis similes; praesertim qui primus est. Talem etenim Dioscorides Cynoforchin esse scribit. Ορχις, ait, οἱ δὲ κυνὸς ὄρχιν καλοῦσι, φύλλα ἔχει κατὰ γῆς ἐσθωμένα, περὶ τὸν καυλὸν καὶ τὸν πυθμένα, σκίαλη μαλακῇ ὁμοίᾳ, στενωτέρα δὲ καὶ λεῖα μακρότερα. καυλὸν σπιθαμῆς τὸ μήκος, ἐφ' οὗ ἄνθη πορφυροεῖδῃ ἔλξαν βολβοειδῆ, ἐπιμήκη, διπλῆν στενὴν ὡς ἐλάϊας, τὴν μὲν ἄνω, τὴν δὲ κατωτέρω: καὶ τὴν μὲν πλήρη, τὴν δὲ μαλακὴν καὶ ῥυσσάν: hoc est; Orchis quem Cynos orchin appellant, folia habet & per terrā strata, & circum caulem ac spicam, Scilla mollis similia, angustiora, mollia & minora: caulem dodrantis altitudine: in quo flores purpurascens: radicem bulbosam, oblongam, geminam, angustam ut oliua; unam superiorem, alteram inferiorem, & unam quidem plenam, alteram mollem & rugosam.

Dioscori-
dis locus
restitutus.

IN qua descriptione deprauatè in Gracis exemplaribus legitur ἐλάϊα μαλακῇ, pro σκίαλη μαλακῇ; nulla siquidem appellata est mollis olea, & olea folia multo & minora & angustiora sunt, quàm Orchios. Inter Scillas autem quaedam est mollior & minus aspera. Nam species quidem Scillae, auctore Plinio, lib. 19. cap. 5. tres sunt: Vna mascula folijs candidioribus, altera femina nigrioribus, utraque asperioribus, & tertia Epimuenidia dicta, folijs minus asperis & angustioribus. Hanc Dioscorides mollem Scillam appellat, eiusq; folijs Cynoforchios mollia ac leuia folia, similia & angustiora esse ait.

Scilla.

CONFIRMAT hanc lectionem Theophrastus de historia stirpium lib. 9. ubi de Orchi scribens ait: ἔχει δὲ φύλλον σκυλλῶδες, λειότερον δὲ καὶ ἑλαττον, hoc est, folium habet Scylla simile, sed leuius ac minus. Et similiter Plinius lib. 26. cap. 10. Quidam folio, ait, Scilla esse dicunt, leuiori
et mi-

Theophrasti & Plinij
loca corrupta.

ac minori. Est tamen in utroque auctore huius Orchios descriptio deprauata. Pro σκυλλῶδες siquidem, ut Marcellus legit, in nonnullis Theophrasti exemplaribus, quæ Gaza mala conuersionis occasionem dedere, perperam legitur σκυλλῶδες. Sequitur deinde: τὸν δὲ καυλὸν ὁμοιότατον ἀπίῳ, ἤτοι ἀπύρῳ, ἤτοι ἀκάνθῳ, quod penitus corruptum videtur. Apud Plinium legitur, caule spinoso, & similiter deprauate: Orchios siquidem caulis spinas non habet. Cornarius tamen hac Plinij lectione fretus, Theophrasti locum hoc modo putauit restituendum: τὸν δὲ καυλὸν ἀκανθώδη, ὅρχιν δὲ ὁμοιότατον ἀπίῳ. Quomodo autem hac Theophrasti & Plinij corrupta loca restitui debeant, ac emendari, diligentius expendendum relinquimus.


TESTICVLVS Morionis duplex est: mas videlicet & femina. Mari folia sunt quinque aut sex, longa, lata, lenia, lilij folijs similia quidem, sed minora, superius maculis aliquot subnigricantibus signata; quorum vnum & subinde alterum caulem quoque circumplectitur: caulis dodrantalis; flores in spica purpurei, circa umbilicum albidiores, odorati, & aspectu grati, posterius corniculum habent propendens, simile ferè corniculo Regij floris; antèius verò cucullum auriculatum & cristatum Morionis referunt: Nam cuculli quidam & patentis galeæ modo flosculus hiat, & angusta foliola quæ à lateribus surgunt auriculas; quod verò è medio attollitur, cristam refert: radices gemini sunt globuli, nucleo nucis myristicæ similes, supra quos fibræ exeunt.

Testiculus
Morionis
mas.

FEMINA folia habet similiter lenia, sed angustiora & aliquantulum venosa siue striata, Plantaginis angustifolia quodammodo similia: flores hiantes quoque, & veluti patentes cuculli, à tergo dependente singulis corniculo, sed foliolis, quæ cristæ aut auricularum modo adnascuntur non erectis,

Testiculus
Morionis
femina.





erectis, sed ipsi floris cucullo ita incumbētibus, ut non faciliè obseruentur: gemini & his testiculis similes globuli, exeunt & supra annexum aliquot fibræ.

1 *ET VNI quidem huius generis flores sunt purpurei Viola ferè nigra colore, in medio candidiores, punctis aliquot variegati, pluresq; densiori in spica; caulisq; quàm reliquorum longior.*

2 *ALTERI flores dilutè rubent; cauliculus breuior est, & folia aliquantulum minora.*

3 *TERTII, flores purpuram referunt exquisitè rubentem, & vermiculum colorem: densa huic brevisq; spica; flores minores: folia nonnihil striata, pleraque erecta & caulem circum amplectentia. Hunc testiculum sunt qui velint Satyrion esse Erythronion, sed parum isti attenderunt, Orchies à Satyrijs differre.*

4 *SUNT verò & huius generis minores testiculi, quibus cauliculus brevis est: folia parvula quina aut sena, uno aut altero circum cauliculum erecto; flores in spica brevis, rari; colore nunc in ceruleo purpureo diluti, nunc candidi, quandoque rubentes, sed coloris obsoleti & odoris ingrati.*

Tragorchis.

TRAGORCHIS folia similiter leuia, lata & longa fert, liliaceis proxima, maiora quàm aliorum Orchion: caulem cubitalem saepe solijs nonnullis inferius implicitum: flores secundum caulem in longa veluti spica multos, fætidus & hircum olentes, quorum forma patenti quoque galea similis est, ex quibus tamen non exiitq; simile, sed longa aliquantulum retorta veluti lacertæ cum medio corpusculo cauda propendet, coloris eius cuius est caulis, purpureis aliquot punctulis circa annexum insignita: semen in valvulis oblongis & striatis gignitur perexiguum: testiculi subsunt grandes; fibræ aliquot supra adherent. Testiculum leporis plerique appellant: nos ab odore, quo hircum dum in flore



in flore est, refert, τεγάρχη & Hirci testiculum dicere maluimus.

Testiculus Serapias. **TESTICVLI** Serapiadis à nobis cognominati, tria obseruauimus genera; flos vnus papilionem, alterius fucum, tertij muscam refert.

1 **PRIMUM** itaque genus folia profert duo aut tria, leuia, latiuscula, at lili folijs multo minora: caulem dodrantalem aut altiore; flores in eo raros, candidos, papilionibus expansis alis quodammodo similes; è foliolis scilicet tribus, vno superiore, duobus lateralibus alas referentibus; & longiori, tenui, veluti papilionis corpore, cauda propendente, melleum & dulcem liquorem continente, commissi; qui contorto aliquantulum pediculo, cauli adhaerent: globuli sub sunt gemini candidi & rotundi, & supra eorum annexum fibrae aliquot pro radicibus.

2 **ALTERVM** & secundum genus quinis senisue constat folijs, venosis, aliquantulum latis, Plantaginis angustifolia quadantenus similibus, sed minoribus, quibusdam terram versus reflexis, alijs circum caulem; qui palmaris aut dodrantalis est: floribus in summo quinque aut sex ex aliquot foliolis compositis, quorum inferius forma, & colore subnigro sordido fucum proximè referre videtur: testiculi sub sunt vt alijs gemini. Reperiuntur huius species duae: vnus flos superiora foliola maiora, candidiora, & aliquantulum purpurascencia habet: alterius omnino minora & subuirentia. Huius caulis breuior: illius altior.

3 **TERTIVS** testiculus Serapias folijs est minoribus, & paucioribus, cauleq; breuiori ac tenuiori quam secundus, cui alioqui satis similis apparet: flores huic tres aut quatuor, ex tribus exiguis superioribus foliolis, & quarto inferiore oblongiore, colore in purpura tristi subnigro, nonnihil variegato, forma muscae cuiusdam corpori similem: testiculi





Testiculus
Serapias
Dioscoridis.

sticuli veluti gemina parva pilula sunt.

TRIA autem hac genera Serapiades nūcupauimus, propterea quòd eorum flores infecta quadam referis secunda & lasciuia, tanquam à Serapide nomen habentia Alexandrinorum olim Deo, cuius excellens Canopi templū erat, vbi lasciuus & cantibus & saltationibus colebatur: vt videre est apud Strabonem lib. 17. Fuchsius etiam ante nos, genus illud, quod flore fucum refert, Serapiada feminā fecit. Dioscorides item Orchim Serapiada describens, vnum istorum satis manifestè exprimit. Verba eius sunt: Ὀρχη ἑτέρος, ὃν σεραπιάδα ἑτέραν καλοῦσιν, φύλλα ἔχει ὅμοια πρασίῳ ἐπιμόλῃ πλατότερα καὶ λιπαρά, ἐπιμακρὴ ἐν ταῖς μασχάλαις· καυλὸς σπιθαμιαῖα· ἄνθη δὲ ὑπὸ πόρφυρα· ῥίζα δὲ ὕψωστι

ὄρχιδος ὁμοία, id est, Orchis alter, quē Serapiada alij nominant, folia habet Marrubio similia, oblonga, sed latiora & pinguiora, per extrema recuruata; cauliculus dochantalem; flores subpurpureos: radix subest paruis testiculis similis.



lis. Cum qua descriptione si secundus no-
ster Serapias, praesertim qui maior est,
conferatur; convenire omnino reperie-
tur. Foliū etenim ei Marrubij folio lon-
gius latiusq; & laeve, quod reflectitur:
cauliculus dodrantalis: florum superiora
foliola, dilute in candore rubentem pur-
puram referunt: testiculi exigui sunt.
Meminit huius eiusdem & Plinius, sed
folia ei non Marrubij sed Porri tribuit,
quod & Dioscoridis interpretibus occa-
sionem praebeat, ut pro *ἰοχόρα πραστός*,
reddiderint, porro similia. Inter panca,
inquit Plinius, mirabilis est Orchis her-
ba, siue Serapias, folijs Porri, caule pal-
meo, flore purpureo, gemina radice testi-
culis simili. Paulus Aegineta, Serapiada
etiam Triorchin nuncupari scribit, ve-
luti tres testes habentem. Vnde Fuchsius
Serapiadi tres affinxit bulbos. Plinius
tamen huic non nisi geminos bulbos tri-
buit: neq; nobis plures quàm duos esse,
vel huic, vel illi quem Fuchsius depin-
git, vel alijs Orchijs, obseruare contigit.

QVINTVS testiculus odoratus siue Testiculus
pumilio nuncupatus, omnium folijs mi- odoratus.
nimus est; ei siquidem foliola omnino
paruula sunt, eaq; venosa & Plantagi-
nis aliquatenus similia, sed minutis ac
paruulis eius folijs minora, virētia; cau-

lis tenuis est palmi altitudine, circa quem flosculi paruuli
candidi, suauiter odorati, ordine digesti, ac spiræ modo cau-



lem ambientes : bulbi subsunt gemini, parui, oblongi.

EXEUNT Orchies locis ut plurimum palustribus ac humentibus, in sylvis ac pratis : quidam pingui & argilloso solo, veluti *Tragorchis* dictus, qui solo pinguisimo gignitur : alij etiam macriori nascuntur. Odoratus, edulis, incultis & aridis locis plurima parte reperitur.

MAYO & Junio mensibus omnes florent, excepto odorato pumilione, qui Augusto demum aut Septembri flores promit.

OMNES à Græcis *Ορχις*, & à Latinis testiculi nuncupantur. Germani *Knabenkraut* & *Standelkraut*: Belgæ, *Standelcruyt*: Galli, du *Satyrion* appellant, officinarum nomen retinentes. Officina siquidem *Orchies* *Satyrion* nominant, & eorum bulbos, pro *Satyrionum* medicamentis ac compositionibus admiscunt. Præbuisse his occasionem videtur *Apuleius*, qui nullam inter *Orchies* & *Satyrion* differentiationem facit, sed utrumque *Satyrionum*, cum utroque *Orchi*, canis videlicet dicto, &

Serapiade cognominato confundit. Græcis, inquit, dicitur *Satyrion*, alijs *Cynosorchis*, alijs *Eutaticos*, *Panion*, *Serapion*; alijs *Orchis*. Galli, *Vram*: Itali, *Priapiskon*: alijs *Orminalem*: alijs *testiculum leporinum* nominant.

VIS autem *Cynosorchios* radicibus calida est & humida:

humida : caterum maior quidem multam videtur habere humiditatem excrementitiam , ac flatuosam , & ea propter epota Venerem excitat . Altera verò minor , e contra , vt sit eius temperamentum ad calidius & siccius vergens : itaque hac radix , tantum abest vt ad coitum stimulet , vt etiam planè contrà cobibeat ac reprimat : auctor Galenus . Et de radice , inquit , Dioscorides , narratur , maiorem si viri edant , mares generare ; minorem si feminae , feminas . Addunt in Thessalia mulieres teneram cum lacte caprino bibendam dare , vt Venerem excitent : aridam verò ad inhibendum .

SERAPIADEM , Galenus ait , siccio rem facultatem obtinere , nec perinde ad Venerem accommodam esse .

NOSTRA ætas omnium Orchium bulbis , ad Venerem excitandam vtitur : & pharmacopæi compositionibus eo facientibus indifferenter quosuis admiscunt : præstantiores tamen sunt Tragorchios bulbi . Assumendi autem non sunt ambo bulbi , sed durior , plenior , ac succi plus habens : flaccidior ac rugosior minus aut non idoneus est .

EST autem plenior , non semper qui maior , sed non raro minor : si videlicet bulbi colligantur priusquam stirps defloruerit , aut cum primùm caulis erumpit . Nec etenim succulentior , alterum magnitudine superat , prius quàm semen maturari cæperit . Nam cum alternis annis vnus bulbus intumescat , alter verò resideat ac pereat , fieri non potest vt durior ac succo plenior semper maior sit . Quando siquidem folia erumpunt , tunc demum vel non multo antè plenior crescere incipit , quo paulatim incrementum sumente alter flaccescit , rugasq; contrahit , donec maturato semine vna cum folijs & cauliculis subinde totus subsideat ac pereat ; eo qui interea creuit vegeto ac succi pleno .

QVOD recentior atas Satyrium basilicon nominat, non vnius est generis. Est etenim maius vnum; alterum minus: quoddam folio non maculato; aliud maculato.

- 1 MAIVS Satyrium basilicon, quod plerique marem appellant, folia habet oblonga, lata & leuia, litijs folijs minora, nullis aut omnino vix apparentibus maculis respersa: caules pedales vel altiores, non absque adnatis folijs: flores in summo spicatos, colore dilute purpureos, exiguis punctis saturata purpura respersos, forma testiculi Morionis maris, nisi quod ipsis crista desit: sub quibus singula acuminata nascuntur foliola: radices geminae veluti palmae sunt, singulae in quatuor digitos distributa; quarum vna flaccidior & quasi fungosa: altera vegeta ac solida, paucis ab annexu exeuntibus fibris.


- 2 ALTERVM maius genus, quod seminam vocant, priori tamen minus, folia eiusdem forma promit, sed minora & multis nigris maculis conspersa: flores cucullis similes, cristatos & hiantes, vti testiculi Morionis maris; colore nunc candidos, alias in purpura vel rubentes, vel dilute ad caeruleum inclinantes, semper magis purpureis punctulis ornatos ac variegatos: radices alterius similes.

- 3 MINVS genus, folijs est angustis, & vt Matthiolus inquit, croci, caule dodrantali iunceo, lauijs, in cuius cacumine flos emicat purpureus, Amaranti æmulus, qui recens odorem quàm suauissimum reddit: radicibus aliorum similibus, sed quæ magnitudine ipsis cedant.

NASCUNTUR Satyria hæc, locis vt plurimum humentibus, palustribus, in pratis & in syluis. Florent Maio ac Iunio.

NOSTRA





NOSTRA ætas Satyria nuncupat Basilica siue regia: item & Palmas Christi. Est tamen & alia huius appellatio- nis herba, Ricinus videlicet; hunc etenim & Palmam Chri- sti vulgo plerique nuncupant. Germani Satyrion Basilicen, Trulzblum nominant : Belgæ, Handekens cruyt: Galli, Satyrion royal.

SUNT qui velint Buzeiden siue Buzidan Arabum esse. Sed Auicenna Buzeiden ait esse medicinam ligneam Indam. Et Serapio Buzeiden ait radices esse duras, albas, similes Behen albo, & medicinam esse Indiæ. Satyrj autem huius basilici radices nihil minus quàm ligneæ sunt, & non ex India petuntur, sed in omnibus Europæ provincijs passim reperiuntur: tantum à Buzeiden absunt.

MATTHIOLVS Satyrium basilicum Digitos citri- nos Auicenna esse vult, & Monachos qui in compositiones Mesues commentaria edidere, dubitantes & penes lectorem iudicium relinquentes, ea de causa reprehendit. Nobis ta- men magis placet Monachorum hesitatio, quàm Matthioli assertio. Neque enim Satyrj huius radices duræ sunt, sed recentes quidem vegetæ ac succulentæ; & arefactæ omnino flaccidæ: nulla etiam omnino citrina aut puluerulenta est. Digni autem citrini, auctore Auicenna, duri sunt, & quidam Digni ci-
trini. citrini cum puluerulentia. Verba eius sunt: *Asabasa* siue *digitus citrini* quid est? Eius figura est sicut vola manus, com- mista ex citrinitate & albedine, & est dura, in qua est parum dulcedinis; & ex ea est citrina cum puluerulentiâ absq; albe- dine. Iam & Rhasis libro continentis ultimo, digitos hos cro- ceos, ut exemplaria habet, appellat; & esse gummi seu venam tinctorum ait. At basilici Satyrj radices nihil minus quàm crocæ sunt, & ad tingendum nequaquam vtiliter habentur. Quæ omnia Satyrium basilicum vulgo nuncupatum, à Digitis citrinis Auicennæ & Rhasis differre, manifestè ostendunt.


AT *Satyrj basilici radices*, *Orchion* sapore & gustu referunt, proinde & facultatibus similes existimantur. *Nicolaus* autem *Nicolus* cap. de curatione quartana, vinu habere ait, & per superiorem, & per inferiorem ventrem purgandi; & aduersus quartanas febres inueteratas post purgationes, radices pollicis longitudine tusam, cum vino ante accessionem vtiliter exhiberi; hocq; remedio ter sumpto, *Biliotum* quendam post 44. aut 45. accessionem, à quartana fuisse liberatum.

DE PSEUDOORCHI, SIVE BIFOLIO. CAP. LXIII.

AD *Orchies* recentior etas etiam refert, quod *Bisfolium* nominant, *Orchion* notitum & adulterinum quoddam genus. Folia habet non plura quàm duo, eaq; ad caulem sibi mutuo opposita, lata, neruosa, *Plantaginis latifolia* folijs funilia, sed minora: caulem dodrantalem; flores secundum ipsum ordine digestos, testiculi *Serapiae* tertij quodammodo similes; sed subuirides aut in viridi albicantes & angustiores, culicum formam proximè referentes: radices fibrosas in diuersa tendentes. Exit locis humidis ac palustribus. Floret vnà cum *Orchijs* Maio ac Iunio.

NOSTRA etas *Bisfolium* appellat: *Germani*, *Zuep=blat*; *Nostri*, *Tweeblat*. Putatur esse à *Plinio* appellata *Ophris*, quam ait herbam esse denticulato oleri similem, folijs duobus. Sed veram esse *Ophrim* asseri non potest, quàm diu quale sit illud olus denticulatum, cui *Ophris* similis, ignoratur. Alijs videtur esse *Alisma*, sed & quàm parum cum *Alismate* conueniat, ex his quæ superius cap. 22. scripta sunt, cuius promptum est colligere, ubi quale sit *Alisma* ostensum

Ophris.



ostensum est. Nobis noua aliqua stirps esse videtur, veteribus præterita.

Vtilem autem hanc herbam recentiores ferunt, ad rupta & vulnera glutinanda.

DE TRAGOPOGONE ET SCORZONERA. CAP. LXIIII.

TRAGOPOGON folia habet oblonga, angusta, acuminata, croci folijs latiora & maiora. caulem rotundum, in plures diuisum; in summo calyces magnos, à quibus flores exeunt magni, multiplices, multorumq; foliorum, Dentis Leonis nuncupata vulgo herbæ, floribus & magnitudine similes; colore vel lutei, vel in purpureo punicantes, qui oriente Sole panduntur, meridie verò recluduntur; & peruenientes in canescentes pappos abeunt; quibus semen subest, longum, subnigrum, acuminatum: radix candida est & longa. Tota herba vnà cum radice succum habet lacteum, qui vulnerata effluit. Nascitur sua sponte compluribus vtriusque Germaniæ locis incultis & humidis, & præcipuè qua lutei est floris. Exit & in hortis procerior, amplior, floribusq; maioribus ac speciosioribus, præsertim purpurea. Floret Iunio & Iulio.

GRÆCIS τραγοπώγων, & κομὴ nuncupatur. Latini, Hirci barba, Coma. Germanis, Wocks bart. Belgis, Wocxbaert / Josephs bloemen. Gallis, Barbe de bouc. Italis, Matthiolo teste, Sassefrica.

HERBA, vt Dioscorides ait, esui apta est, nostrà atate radix hybernis mensibus à plerisque, vnà cum acetarijs permixta editur.

Scorzoner-
ra.

HVIVS generis est quam Hispania Scorzoneram aut Scorzoneram appellat, folijs oblongis, subcandidis, carnosis, acumi-





acuminatis, latioribus & per ambitus subinde parum sinuatis: caule rotundo, pedali vel altiori; flore luteo multiplici omnino simili, qui etiam in pappos resolvitur: semine oblongo, subcandido, & minore: Radice longa, singulari, candida, qua cortice obtegitur tenui & nigricante.

NASCITVR Scurzonera in Hispania plerisque montibus, locis humentibus obscuris & viginosis: reperitur & in Germania Thuringia ac Bohemia in sylvis ac montibus locis similibus. Apud Hispanos flos Maio mense prodit: in Germania verò seriùs, Iunio videlicet & Iulio.

HISPANI Scorzoneram appellant, quod Latine Viperinam siue Viperariam aut Serpentariam sonat, sic dicta, quòd contra venena viperarum ac serpentum efficax habeatur. Nam Hispani Viperam Scurzo appellant. Apud Germanos & alias nationes nomen non inuenit.

FERVNT autem hanc pestis contagia arcere, & omnibus venenis resistere venenatorum, & præcipuè viperarum moribus niederi, epoto vel radicis, vel herbe succo: prodesse item cardiacis, & syncope molestatis, nec non comitiali morbo obnoxijis & vertiginosis: radicem commanducant hilaritatem facere, tristitiamq; omnem discutere: lacteum radicis succum oculis inditum, visum exacuere.

DE CHAMÆMELO VULGARI.

CAP. LXV.

CHAMÆMELI flos tametsi coronarius non sit, propter frequentem tamen quem in medicina usum habet, inter flores locum vendicavit.

SUNT autem Chamamelorum complura genera. Vnum legitimum medicina aptissimum, vulgaris usus, quod ea de causa vulgare Chamamelum nuncupatur: alia deinde syl-



uestria nullius aut exigui vsus: tertium hortense odoratum. De eo autem quod familiarissimum est, primum agemus.

SUNT huic cauliculi tenues in alas multas diuisi, cubitales: folia tenuia, dissecta, numerosa: flores in summo, medio lutei, forinsecus verò candidi; ambientibus videlicet luteum ipsius floris, multis exiguis candidis foliolis, quorum singula angusta sunt & forma oblonga: radices tenues & fibrosæ. Exit passim in aruis vnà cum segete; & vniuersa Europa familiaris est. Colliguntur flores Iunio potissimum mense.

CAMOMILLAM officina nuncupant: vulgo Kamille & Camomille bloemen, Germani, Chamill. Galli, Camomille. Veterum est χαμαίμηλον siue Chamamelum, & Anthemidis genus, quod ab ipsis candidis, floris medium circumdantibus orbem, foliolis, λευκάνθεμον dicitur. Sunt etenim Anthemidis, Dioscoride auctore, generatim, & quidem floribus in medio luteis omnia, per ambitum autem & circumferentiam, vnum candidis, alterum luteis, tertium purpureis. Quod luteis per ambitum foliolis constat, χρυσάνθεμον nominatur: tertium autem purpureis, ἡγάνθεμον, quod scilicet vere floreat.

CHAMÆMELVM verò dicitur, quoniam flores μικλῶ, siue mali odorem habeant, quem in vulgaris vsus Chamamelo euident & manifestum est sentire; ita vt vel hinc vulgaris vsus Chamamelum, verum & legitimum esse coniungere liceat; quod & ipsa etiam facultates euidentius ostendunt. Tales siquidem vulgaris Chamameli facultates omnino sunt, quales Chamamelo Galenus tribuit.


CHAMÆMELVM, Galenus ait, calfacit & desiccatur in primo ordine, & tenuium est partium; digerendi, laxandi, & rarefaciendi vim habet. Item & alio loco: tenuitate Rosa persimile est, calore ad olei vires magis accedens ho-

mini familiares & temperatas. Quapropter lassitudini, si quid aliud, cum primis confert, doloresq; sedat & mitigat: præterea tensa remittit & laxat: quæq; mediocriter dura sunt, emollit; quæq; constipata, rarefacit. Omnes autem has facultates nostro vulgari Chamamelo inesse, ipsa quotidiana commōstrat experientia. Nam moderatè quidem ipsum excalescit, parum resiccat, valde tenuium est partium, digerendi, relaxandiq; singulari, ac mirifica potentia præditum est, multi breuiter ad omnia vsus, quæ clementer calefieri, resolui, discuti ac leniri desiderant. Calculi & colicos dolores lenit: vrinam moderatè pronocat: tormina & rofiones ventris sedat: laterum dolores mulcet: duros tumores emollit, & crudos humores discutit. Idem præstat oleum ex floribus compositum, quod aduersus lassitudines omnes remedio est, & omnibus vtiliter admiscetur, quæ sopiendi alii cuius doloris causa adhibentur.

DE SYLVESTRIBVS CHAMÆMELIS, SIVE COTVLIS.
CAP. LXVI.

SYLVESTRIVM Chamamelorum, Cotulas quas passim nominant, tria sunt genera: vnum fœtidum, duo alia non fœtuita: quorum vni flos per circumferentiam candidus, alteri verò totus luteus.

CHAMÆMELVM syluestre fœtidum, siue Cotula fœtida, caules promit rotundos, virentes, fragiles & succulentos, in alus multas diuisos, crassiores & sæpenumero altiores quàm Chamameli: folia similiter ampliora, in virore nigricantia: flores forma & colore similes. Fœtet herba tota, grauemq; odorem spirat: vnde illi fœtida cognomen datum.



datum. Nascitur in arvis, iuxta semitas, & agrorum margines. Floret eodem quo Chamamelum tempore.

OFFICINÆ & Herbarij passim Cotulam fœtidam nuncupant; plerique Camomillam fœtidam. Germani, *Krottehdill/Hunfhdill/Hunfzblum*. Belgæ, *Idaë debloemen Rinckende Camille*. Galli, *Elpargoutte*: à nonnullis *κροτταρις*, ab alijs *κροτοταρις*. Leonhartus Fuchsius Partbenium esse voluit. Sed Partbenium verum & legitimum est vulgo dicta Matricaria, quæ odore longè est gravior, & sapore admodum amaro; folijs tenuibus & Coriandri similibus. Cotula autem fœtida minus graniter olet, & folijs Coriandrum non emulatur.

- 2 ALTERA Cotula alba non fœtida, quæ à plerisque etiam Oculi bouis dicitur, cauliculos edit complures, tenuiores, duriores, flexibilioresq; quàm Cotulæ fœtidæ; & circa eos folia tenuia, Chamameli folijs paulo longiora & candidiora: flores in medio luteos, per circumferentiam candidos, Chamameli & Cotulæ fœtidæ floribus similes, sed maiores, exigui aut nullius odoris: radices duras & lignosas non absque adnatis fibris, quæ aliquot annis permanentes vere regerminant. In arvis & agris frumentarijs rariùm Chamamelum reperitur. Aestiuus mensibus floret.

NOSTRA atas Cotulam non fœtidam appellat, & Cotulam albam, plerique Oculum bouis & Buphtabnum. Germani, *Kudil/kundlang/kuaug*: Belgæ, *Coedille/Coedoghe*. Et verum quidem esse Buphtabnum Leonharti Fuchsi sententia fuit. At nobis verum & legitimum solum esse videtur, quod infra sub Buphtabni nomine describitur. Nam Buphtabno quidem, ut Dioscorides auctor est, folia sunt *μαγαδωσιδῆν*; id est, fœniculi foliorum similitudinem habentia, & flos melinus. Huic verò folia non sunt fœniculi similia, neq; flos totus luteus siue melinus, sed plu-

rima parte , per circumferentiam videlicet candidus ; qui etiam vel solus Matthiolum mouit , vt Cotulam hanc albam, siue vulgare Buphtbalmum, verum & legitimum esse Buphtbalmum negauerit . Proinde non Buphtbalmum, quod hoc nomine à plerisque appellatur, sed Cotula & Chamameli sylvestris species quadam est. Plinius lib. 26. cap. 7. Melandrii herba meminit, in segete ac pratis nascentis, flore Melandriū albo & odorato : an Melandrium autem istud Cotula non foetida sit , diligentius inquirendum ; propter etenim Plinii breuitatem , nemo facile qualis herba Melandrium sit, asseruerit.

TERTIA Cotula lutea cauliculis exit non paucis ; folijs, Cotula alba maioribus , crassioribus , candidioribusque : flores & medio & orbiculato ambitu, melini siue lutei sunt : radix dura , lignosa , diuturna . Nasitur in Germania & Galia , iisdem ac similibus quibus Cotula alba locis : apud Belgas, hortensis est. Iunio ac Iulio florem promit.

GERMANI Streichblumen & Steinblumen appellunt. Belgæ, Strijckbloemen. Fuchsius Anthemidis speciem, & Chamamelum Chrysanthemum facit : folio tamen partim, odore nullatenus Anthemidem siue Chamamelum Leucanthemum refert. Matthiolum pro legitimo Buphtbalmo depinxisse videtur : desideratur tamen in eo folium Marathroëides , quod Buphtbalmo esse Dioscorides testatur . Nos his de causis inter Cotulas & sylvestria Chamamela potius reponendum duximus , quam alterutrum temerè asserere.

VSSUM autem hæ Cotula in medicamentis aut cibatu nullum habent , proinde earum facultates incognita. Videntur tamen omnes calida aliquantulum & sicca , Chamamelo vulgaris vsus viribus quodammodo similes, sed longè tamen inferiores , imbecillioresque . Quæ foetida dicitur,

ad vteri morbos commendatur ; sed ab ijs præsertim , qui Parthenium esse existimant , & Parthenij vires ad hanc transfulerunt . Est tamen non omnino Cotula hæc inutilis ; quando foetida omnia ex vtero strangulationibus profunt.

DE CHAMÆMELO ODORATO.

CAP. LXVII.


ODORATVM Chamamelum duorum est generum : vnum Leucanthemum , alterum Chrysanthemum cognominari potest.

- 1 LEUCANTHEMO odorato Chamamelo , caule exeunt multi , non erecti , sed procumbentes & quasi per terram repentes : folia tenuia dissecta , vti Chamameli vulgaris , sed maiora virentioraq³ : flos quoque similis , medio videlicet luteus , & per circumferentiam candidis foliolis cinctus : radix fibrosa , durabilis natura . Referunt folia & flores pergratum ac iucundum cum grauitate quadam odorem , aromatatum odoribus persimilem , qui etiam in arida diutius permanet.

EST & huius generis quoddam , foliola medium floribus ambientia densissime multiplicans , luteo in angustam orbem coactis ; quod odore & forma præcedenti per omnia simile est.

- 2 CHRYSANTHEMV M odoratum Chamamelum , cauliculos similiter profert tenues inualidos , & in terra prostratos : folia quoque tenuia , vti prioris , sed candidiora & paululum minora : pro flore , qui alijs omnibus Chamameli ac Cotularum generibus medius , luteus est orbiculus , nudus & nullis circumambientibus foliolis cinctus ; radix similis . Et huius herba odorata quoque est , odore & facultate priori similis.

VTRVM.



VTRVMQVE in Belgio hortense est: floret Iulio & Augusto mensibus.


CHAMAMELVN odoratum propriè appellatur: Tragus Chamamelum nobile nominat: Vulgus nostrum, Römische Kamille, id est, Chamamelum Romanum. Quod flore caudet, Leucanthemum; alterum Chrysanthemum dici potest. Sed tamen ea esse quæ à Dioscoride, Galeno, aut alijs veteribus in usu recepta fuere, non omnino videtur asserendum: verisimilius est ab ipsis fuisse præterita aut incognita.

NAM facultas eorum multo intensior, quàm Chamamelo à Galeno tribuitur. Caliditate siquidem & siccitate qualitatem illam viventi familiarem ac temperatam, quæ Chamamelo à Galeno tribuitur, quàmq; ipsum habere quotidianæ ostendit experientia, multum excedunt: utpote secundo ordine calida & sicca. Cum autem & ipsa substantiæ tenuitatem habeant coniunctam, digerendi ac rarefaciendi potentiam habent ampliores: molliendi verò, doloresq; sedandi, aut mitigandi remissiores. Proinde ubi magis quàm vulgaris usus Chamamelum potest, incalfacere aut rarefacere opus est, utiliter adhiberi possunt: uti in balneis, quæ sudoris euocandi & rarefacienda cutis causa præstantur, in quibus horum Chamamelorum usus haud est negligendus. Nam & cutim nimis adstrictam variorem faciunt, sudorem euocant, bonumque corpori odorem conciliant.

DE ERANTHEMO VULGARI.

CAP. LXVIII.

FLOS quem Eranthemum nuncupamus, cauliculos proferit à radice complures, in alas subinde diuisos, striatos, virentes; folia tenuia Chamameli, aut potius Cotula satida simi-



de similia : flores non magnos , forma Ranunculi florum, pulchros minij colore rubentes ; quos capitulum sequitur oblongum, ex multis collectum seminibus, rotundis, acuminatis, colore in virore subnigricantibus : radices fibrosas. Odorem herba herbaceum habet , aliquantulum grauem, sed minus quàm Cotula foetida, Chamameli verò odori nequaquam similem . Nascitur compluribus Europæ prouincijs , in arvis vnà cum Zea , Tritico , aut alijs frumentis: Belgæ in hortis scrunt. Aestiuis mensibus floret, Maio, Iunio & Iulio.

NOSTRI sua lingua , Bruynettekens appellant: Germanorum nonnulli , Feldroslin : multi hac atate ἀνθέμων. Esse tamen tertium Anthemidis genus, quod propriè Eranthemum dicitur , nemo facillè affirmauerit. Nam Eranthemo , si fides Dioscoridi , flos est forma Chamameli, in medio atreus vel luteus , orbiculato vero ambitu purpureus. Istud autem florem quidem habet purpureum, sed medium eius non est luteum: quod ipsum non esse Anthemidis speciem ostendit.

HIERONYMVS Tragus Asters Atticum, cuius flos medio luteus , & per circumferentiam caeruleus est , Eranthemum facit: Fuchsius verò Consolidam regalem, siue florem Regium, de quo superius egimus.

IN Astore Attico autem, quem Vergilius Amellum florem nominat, desideratur herba folium Chamamelo simile, & floris color: in flore Regio verò & color, & forma florum. Triusque huius flos caeruleus est : Eranthemi autem, roseo colore rubet, vt testis est Plinius, lib. 26. cap. 8. qua de causa & neutrum horum Eranthemum esse potest.

MATTHIOLVS Eranthemum istud praefens, Adonidis florem nuncupat , sed Adonidis flos Anemone esse creditur . Adonidis siquidem florem vento excuti Ouidius scribit,

bit, *Metamorph. lib. 10. in fine. Venti autem flos Anemone est. Nam Anemone ἀπὸ τοῦ ἀνέμου, id est, a vento nomen habet, ut Plinius auctor est, lib. 21. cap. 23. Flos, inquit, nunquam se aperit, nisi vento spirante: unde & nomen accepit. Cum Anemone autem Eranthemum quod descripsimus non convenire manifestum est.*

CAETERVM Eranthemi istius nullus in medicina usus; quantum autem gustabilis qualitas eius ostendit, aliquius caliditatis particeps est, sed tamen non magna.


DE BUPHTHALMO. CAP. LXIX.

STIRPI cui Bupthalmi nomen dedimus, cauliculi à radicibus exeunt tenues, tres, quatuor, aut plures, pedales vel altiores, circa quos folia, virentia tenuiter dissecta similitudine foliorum fœniculi, sed multo quàm illius minora: flores in summo cauliculorum magni, Calendulæ satis similes, colore luteo magis diluto, staminibus in medio luteis, post quos capitulum succedit, veluti suprâ descripti Eranthemi, ex multis seminibus simul congestis commissum: radices tenues sunt & fibrosæ, veratri nigri radicibus similes. Nascitur sua sponte plerisque Germaniæ & Bohemiæ provincijs, locis incultis; apud Belgas hortensis est. Maio aut Iunio floret.

DE huius autem stirpis nomenclatura, recentiorum variant sententiæ. Sunt qui velint Veratri nigri speciem esse; nonnulli Consiliginem; quidam Sesamoides: Elleborastrum alius.

VERATRI autem nigri, duo apud veteres reperiuntur genera: vnum folio Laurino, fructu Sesamaceo: alterum folio Platani, semine Cnici. Veratrum nigrum.

PRIORIS meminit Theophrastus lib. 9. & ad hoc genus referenda sunt, quæ passim Veratra nigra appellantur,



tur, quorumq³ folia ex pluribus oblongis collecta sunt: praefertim quod caulem non facit, floresq² ex ipsis prouit radicibus breuibus insidentes pediculis, initio candidos, tandem herbacei coloris. Huius etenim folia ex pluribus constant, quorum singularia dura, glabra & forma quodammodo Laurinis similia: semen in folliculis oblongis gignitur, quinque aut sex simul coniunctis Seseami modo: radices multae instar fibratum, & nigrae sunt, quae eximiam purgandi vim obtinent. Sunt tamen & huius generis, reliqua etiam Veratrum nigra, quae caules proferunt, ac flores habent herbacei coloris; solius siquidem eorum singularia, etiam oblonga & aliquatenus prioris similia: fructus similes: radices ad purgandum efficaces, nigrae & uti aliterius.

POSTERIUS Veratrum nigrum Dioscorides describit lib. 4, folia istud habet Platani, nigra; caulem filicis; flores in umbella: semen candicans, oblongum: radices tennes nigrae & fibrosae. Cum neutro autem horum Buphtthalmum istud, à nobis hoc loco descriptum, conuenire, notissimum est.

CONSILIGINIS herba qualis forma sit, apud veteres non reperitur. Plinius ait, sua aetate in Marfisi inuentam, & pulmonum vitio, suum & omnis pecoris remedium praesens esse, vel traiecta tantum auricula: lib. 26. cap. 7. Columella lib. 6. cap. 5. In Marfisi montibus plurimam nasci, etiam ait, omniq³ pecori maximè esse salutarem, & qua ratione ac modo auricula inferi debeat, docet. Feruntur & Buphtthalmi nostri radices pecorum morbos quosdam curare, si per auriculam perforatam inferantur: sed ea de causa Consiliginem esse consequi non debet. Diuersas siquidem stirpes similis vel eiusdem facultatis reperiri non est alienum. Nam & nigri Veratri radices idem posse testatur Plinius lib. 25. cap. 5. Pecorum, inquit, & iumentorum pi-
tuitas

uitas sanat, furculo per aurem traiecto, & postera die eadem hora exempto. Quod & experimentis nostræ atatis rusticorum compertissimum est: qui Veratri nigri vulgaris radicibus, pecorum suorum morbis medentur. Præstant simile & Veratri albi radices, ut Absyrus, & post eum Hierocles scribit: qui tamen Veratri albi radículas non in aurem, sed sub pectoris cutim infigunt. Quo modo etiam Vegetius Renatus, Consilagine utitur, Veterinaria sua lib. 1. cap. 12. de cura morbi subcutanei: tamen si lib. 3. cap. 2. de Malleo, ipsas etiam auriculas inserendas scribat. Quæ satis ostendunt, diuersas stirpes similes subinde habere facultates; & ea de causa nequaquam consequi, Buphtbalmum nostrum esse Consiliginem, quod perinde ac Consiligo pecorum morbus medeatur. Quod si ex facultatibus coniectura facienda est, Consiligo erit Veratrum album. Nam Vegetius eo omnino modo Consilagine utitur, quo Veratro albo Absyrus & Hierocles. Auget hanc suspensionem, quod Vegetius hanc curandi rationem à Græcis accepisse putetur. Quæ de causa, etiam plerisque nihil aliud, quam Veratrum album, Consiligo videtur. Quod si ita est, multum à Consilagine præsens Buphtbalmum differens erit: Veratro siquidem albo nequaquam asimile est.

Idem verò, Sesamoides, siue primum, siue alterum, non esse, notius est quam refelli debeat.

HELLEBORASTRUM verò & hoc ipsum improprie nuncupatur: proprie etenim helleborastrum dici potest, quod hellebori siue Veratri speciem ac similitudinem habet: istud autem Buphtbalmum Veratri nullam speciem habet.

QUIBUS omnibus de causis nullam harum appellationum huic stirpi convenire visum est, sed solum Buphtbalmi nomen, cum cuius descriptione, quæ apud Dioscoridem extat, quia exquisitissime hac stirps convenit, proprium ac legiti-

legitimum Buphtthalmum esse existimamus. Buphtthalmum siquidem cauliculos, ut Dioscorides ait, emittit molles & tenues, folia μαλαθροειδῆ, id est, speciem ac similitudinem foliorum fœniculi referentia; florem melinum, Anthenide maiorem, qualis omnino præsens stirps est, quæ tenuitate & multiplici sectione foliorum, speciem illam foliorum fœniculi tam exquisitè exprimit, ut nulla alia, parui folij, melius possit: ita ut citra omnem dubitationem hæc stirps legitimum Buphtthalmum esse videatur.

NOMINATUR autem Buphtthalmi etiam Cachla, aut potius Caltha. Caltha autem est Calendula, quam flore Buphtthalmum nostrum proximè refert dixerimus. Sunt verò & qui velint Buphtthalmum idem cum Chrysanthemo esse, Dioscoridemq; separatim locis, sub diuersis nominibus eandem herbam tradidisse. Sed hi si paulo diligentius Dioscoridis verba expendissent, aliter sentirent. Licet etenim in multis utriusque descriptiones conueniant, non abest tamen proprietas aliqua, quæ differentes esse stirpes ostendat. Folia Chrysanthemi πολυσχιδῆ, id est, in multas partes diuisa & dissecta traduntur: Buphtthalmi verò μαλαθροειδῆ. Non omnia autem quæ laciniosa sunt, & in multas partes dissecta, fœniculi foliorum speciem habent. Iam florem proferre Chrysanthemum Dioscorides ait ισχυρῶς σιλόγοντα, hoc est, multum relucentem: Buphtthalmi verò relucentem esse non tradit, neque etiam eius quod à nobis pingitur, flos ita splendet, ut multum relucens dici queat, aut debeat. An hæc euidentem Buphtthalmi & Chrysanthemi differentiam ostendunt, & legitimum esse à nobis depictum Buphtthalmum confirmant? Sentiant qui velint aliter, nobis ita videtur; & qui Chrysanthemum idem cum Buphthalmo esse volunt, aliud Buphtthalmum, si istud esse negent, requirant. Nam quod & ab alijs & à nobis pro Chrysanthemo

depingitur, legitimum Buphthalmū esse nequit : folia enim eius non sunt μαρσθενιδῆ, qualia omnino legitimi Buphthalmi esse debent.

QVOD verò ad facultates attinet : Matthiolus ait, in Bohemia omnes medicos & pharmacopœos huius radicibus, pro Veratri nigri vti, priuatim ad pecorum morbos : sed in medicamentis radices huius ἀντεμελλόμενας radicem Veratri esse non affirmat. Memini ego obseruasse me olim, à quibusdam medicis, huius radices, in quantitate satis magna adiectas fuisse, decoctis ad purgationem per inferna preparatis, sed nihilo plus ea aluum mouisse, quàm si non addita fuissent. Quod mihi suspicionem mouit nulla purgandi potentia huius herbæ radices donatas esse : & aliâ omnino facultate, quàm helleborum, per auriculas transmissas pecorum morbis mederi. Gentianæ radices ora fistularum nimis angustâ egregiè dilatant; idem possunt Aristolochiæ & Bryoniæ radices, ac spongiarum partes; quæ tamen viribus alijs multū inter se differunt. Quamobrem licet Buphthalmi radices simile aliquid Veratro nigro queant, idcirco tamen non omnia quæ illud possunt. Spina, aculei, ramenta lignorum & similia, dolorem inferunt, inflammationem excitant, vicinarum partium humores alliciunt, si in partem aliquam adigantur. Partem aliquam ladi absque dolore non contingit: is transmissa aut inposita vulnere quapiam intenditur. Fortasse etiam si quiduis aliud in auriculam perforatam imponeretur, idem qui huius stirpis radice inmissa, effectus subsequeretur. Nos nihil hic affirmamus; curiosi ut diligentius vires huius explorent viam aperimus.

DIOSCORIDES Buphthalmi, ait, flores cum cerato tritos œdemata & duritias discutere; & dici si statim ab exitu à balneis bibatur, bonum colorem ad aliquod tem-

pus Ictericis facere . Videntur autem hac ex cap. de Chrysanthemo huc translata ab his qui inter Buphtalmum & Chrysanthemum differentiam nullam esse existimarunt: Non aliter quàm nonnulla ex Asteris Attici facultatibus , Viola nigra apud Plinium accessere : & Dolicho legumini, in Dioscoridis exemplaribus, quadam Smilacis lauis: vt suis annotauimus locis. Quæ autem propria sint Buphtalmi vires, nondum compertum habemus.

DE CHRYSANTHEMO.

CAP. LXX.

CHRYSANTHEMO caules sunt ramosi, laeues, folia oblonga , digiti serè latitudine , dissecta & multifida: flores Anthemidis sed maiores, & non medio tantum vmbilico , sed & orbiculato ambitu lutei & auri quodammodo fulgore splendentes ; odore non insuauis: radices fibrosæ. Reperitur in aruis , in hortis inter olera , & alibi passim : & quibusdam quidem locis, folijs magis confectis, alijs minus. Iunio, Iulio & subinde Augusto floret.

A Germanis Sant Johans blum / & Bentsz blum appellatur: à nostris vulgo Wokelaet / & quandoq; Beel ganse bloemen. Græci ab aureo florum fulgore χρυσάνθεμον nuncupant . Est tamen & Chrysanthemum Anthemidis quadam species , vt suprâ scripsimus . Batrachion etiam Chrysanthemum dicitur , testis Democritus in Geponicis . Item & Elichrysum Chrysanthemum est . Sed hæc Chrysanthema ab isto præsentî differunt. Nominant verò & istud Chrysanthemum plerique Buphtalmum & Caltham ; quæ eius Buphtalmi propria nomina sicut, quod capite præcedenti descriptum est . Non desunt quoque qui



Bellidis speciem faciant, & luteam Bellidem dicant. Est autem Bellis alterius generis herba.

CAULES autem Chrysanthemi olerum modo, Dioscorides tradit, eduntur. Flores cum cerato triti, stentomata discutere dicuntur. Ipsa herba pota in balneis post exitum de folio, morbo Regio correptis, breui bonum colorem inducit.

DE BELLIDE. CAP. LXXI.

FOLIA Bellis è radicibus promit multa, parua, leuia, ¹ pingua, in rotunditate oblonga, lenissimè crenata, per terram plurima parte strata; inter qua flosculi exeunt, singuli suis tenuibus insidentes pediculis, Chamameli florum penè forma, sed minores, medio eorum luteo, quod multa exigua orbiculariter cingunt foliola, candida aliquatenus rubentia, ac in candore veluti purpurascentia: radices subsunt fibrose. Nascitur in pratis & similibus perinde palustribus ac humidis compluribus locis. Vernis mensibus floret.

HVIC similis est, & alia species, sed hortensis tantum, ² & floribus multiplicibus, speciosissimis, tam denso exiguorum foliolorum contextu, ut vix villo, aut nullo, apparente luteo orbiculo, vniuersum & ambitum & medium floris occupet; colore aliàs rubentibus, subinde candidis, nonnunquam ex utroque permixto varijs, rarè herbaceis aut virentibus; odor nullius. Circundant hos quandoque, sed tamen non frequenter, alij parui, sub ipsis, aut ex ipsis florum calycibus exorti quini seniue vel plures flosculi, matricibus suis similes, sed tamen minores. Floret hac Bellis Aprilis quoque & Maio mensibus.

GERMANI Maszlieben & Massuselen nuncupāt: Belgæ, Madelieuen/Verflouwen/Margrietten:



Plinij lo-
cus corru-
ptus.

Galli, Pasquettes & Marguerites : Plinius Bellidem, eiusq; meminit lib. 26. cap. 5. Bellis, inquit, in pratis nascitur, flore albo aliquatenus rubente. Est & apud Plinium lib. 21. cap. 8. de Bellio locus, quem non adducimus, quod corruptus sit, & in eo restituendo hactenus frustra docti laborarint. Recentiores Bellidem etiam Consolidam nominant minorem; plerique herbam Margaritam; alij Primulam

mulam veris. Sunt tamen & alia nuncupata *Prinula* veris, *Phlomidum* species, de quibus alias.


AD *Bellidus* genus referūt & nonnulli *sylvestrem* quandam, maiorem nuncupatam *Bellidem*: caules hæc profert *tenuis cubitum* altos aut longiores; *folia circa eos oblonga*; nonnihil serrata, *digiti ferè latitudine*: *flores in summo cauliculorum per circumferētiam candidos, medio luteos*, *Chamamelæ Leucanthemi & Cotulæ albæ* similes, nullius odoris; *radices fibrosas*. Nascitur in pratis & secus *margines agrorum locis non apricis*.

BELLIDEM, vt diximus, maiorem appellant: *Germani, Fuchsius auctore, Bentsblum*, nonnulli etiam *Consolidam* mediam. Alia tamen & *Consolidæ* sunt mediæ, vt *Bugula & Brunellæ* dictæ, quarum vtraque pro mediæ generis *Consolidæ* habetur.

CÆTERVM *Bellidis minoris folia humectandi refrigerandiq;* facultate donata sunt; & humectant quidem ordine secundo intenso, refrigerant verò eodem remisso. *Dolores omnes, sed præsertim articulares ac podagricos, ex calido siccoq;* humore, mitigant; cum butyro recenti & iussulso trita, ac locis dolentibus imposita, potissimum additis *Maltæ folijs*. Eadem oleribus addita, *facilem aluum faciunt*, & in *causonide febris, ac in intestinorum inflammationibus*, magna utilitate enematis admiscuntur.

DE ELICHRYSO. CAP. LXXII.

ELICHRYSON *caulículos* promit *graciles, videntes, lignosos, in alas quasdam subinde diuisos: folia confectæ abrotani similia, aliquantulum candicantia: flores in summo cauliculorum in umbellis coherentes, luteo auri colore fulgentes, forma florum Tanacetæ vel mediæ orbiculæ siue*



disci florum Anthemidis ; qui prius quàm flaccescant decerpti , speciem suam ac pulchritudinem diutiniè seruant. Qua de causa & deorum simulachra eo coronari solere ; & Ptolomæum Aegypti regem diligentissimè hoc seruasse, Plinius tradit. Ex ut plerisq; Italia ac Hispania locis incultis, in pratis solo gracili, ac circa fluuiorum alueos. In Belgij hortis floret Augusto, aut Septembri mense: Theophrastus tamen & Plinius Eliochryson inter veris flores numerant.

DIOSCORIDES ἐλίχρυσον appellat, nōnulli etiam χρυσάνθεμον, alij inter quos Galenus est, ἀμάραντον, propter floris diuturnitatem. Alius tamen & Amarantus est, purpureus, de quo suprà scriptum. Plinius hanc stirpem Eliochryson nuncupat : Theophrastus similiter ἐλεῖχρυσον, Gaza Aureliam vertit.

FACULTATIS, inquit Galenus, est incidentis & extenuantis. Prodest coma, Dioscoride auctore, è vino pota contra vrinæ difficultates, serpentium ictus, coxendicum dolores, & ad rupta; menses etiam prouocat : sanguinis grumos & in ventre, & in vesica cum vino mulso sumpta dissoluit : defluxiones à capite sistit, trium obolorum pondere ex vino albo diluto ieiunis data : vespibus inserta incorruptas eas conseruat. Theophrastus Eliochrysum ad ambusta etiam torrefactum, & melli permixtum valere tradit.

DE STOECHADE CITRINA, SIVE
CHRYSOCOME. CAP. LXXIII.

AUREI coloris coma Eliochryso similis est, à recentioribus Stœchas citrina nuncupata. Caulicnlos hæc edit dorantales, tenues: folia oblonga & angusta: vtræque incana & lanuginosa: flores in summo cauliculorum, in dissoluta inconditaq; veluti umbella, odoratos, exiguis bullis similes,



colore luteo splendentes, qui priusquam plenè maturuerint collecti, colorem & pulchritudinem non marcescentes, diu retinent: radices graciles ac nigras. Nasçitur locis asperis & sabulosis & in conuallibus, frequens iuxta Rheum, præsertim inter Spiram & Vormaciam. Iunio mense & post Solsitium floret.

GERMANI quòd in regionibus, quæ Rheno vicinæ sunt, proueniat, Rheinblumen nuncupant: Item & Jungling/ Motten blumen/ Motten kraut: Belgæ, Rhyñ bloemen/ Motten cruyt: Latine Tincariam: Officina Stœchadem siue Stichadem citrinam: Fuchsius & Tragus Elichrysum faciunt. Nihil autem, aut omnino parum, cum eo conuenire, ex ijs quæ superiore capite scripta sunt, palam est. Ageraton esse, etiam sunt qui sentiant, propterea quòd flos bullarum iustar globosus sit, & non facile aut citò marcescat: ἀγνεῖτον siquidem flos πομφολυγῶδες, id est, bulla modo tuberosus est, & diutissimè in sua coloris specie conseruatur: sed folium Agerati, Origani folio simile est, tale autem nequaquam Stœchadis citrinæ, quod diximus oblongum & angustum esse; rade etiam non esse Dioscoridis Ageraton, euident est. Nobis Stœchas citrina cum Chrysocome, quæ & Chrysitis, similitudinis plurimum habere videtur; breuis siquidem est herba, coma aurei coloris, eaq; diuisa & corymborum similitudinem referente, radices tenues sunt & nigre; qualem omnino Chrysocomen esse Dioscorides scriptum reliquit. χρυσικήμη, αὐτ, ῥαδὶς ἐστὶ σπιθαμιαῖον, ἔχον κόμην κορυμβοειδῆ, ὁμοίαν ὕσσώπῳ· ῥιζὴν δασύτην, λεπτὴν, αἶς ἐλλειψίου μέλανος, γυσταμένῳ δοκᾷ τινὶ, κυτρίφῳ ἴσιν ὅσταν, id est, Chrysocome herbula est dodrantalis, comam habēs corymborum specie, similem Hyssopo; radicem bisfutam tenuem, vt veratri nigri, gustu non iniucundam, Cypero similem.

IN qua descriptione occurrit observandum, verum & legitimum antiquorum hyssopum, corymborum quandam similitudinem summis cauliculis proferre; atque ea de causa vulgaris vsus hyssopum, nequaquam esse genuinum: utpote quod flores non in corymbis aut corymborum specie ferat, sed secundum cauliculos iuxta singula foliola edat; Thymbra videlicet modo, cuius haud dubio species, & maior quidem est.

- ² STOECHADI autem citrina & aliam similem observare contigit herbam, ramulis à radice multis tenuibus, folijs angustis, aliquantulum sed minus multo quam Stœchadis citrinæ albicantibus: floribus in umbella luteis, non tamen globosis, sed medio orbiculo florum Chamameli similibus, sed minoribus. Quo loco sponte exeat compertum non habemus, in Belgij hortis à nobis visa est. Anonymos quoque & absque nomine est. Elichrysi speciem angustifoliam nonnulli faciunt.


CAETERVM Stœchadis citrinæ flores in vino decocti, potu ventris lumbricos expellere feruntur: & cum lixivio pediculos & lentes delere.

CHRYSOCOMES radicem, Dioscorides ait, excofacere & adstringere, convenientemq; esse hepaticis & peripneumoniacis: sumi & cum hydromelste decoctam ad uteri purgationes.

DE SANTOLINA. CAP. LXXIIII.

AVREI coloris corymbos Santolina quoque veluti Elichryson & Stœchas citrina profert, odorata est & coronis non raro admiscetur. Eius aliquot sunt genera.

- ¹ PRIMA caudice surgit lignoso, ex quo virgule, ramulorum instar, tenues, cubitales complurimæ, folijs circundato



cundata parvis oblongis, angustis denticulatis: è summo virgularum, singuli eminent orbiculi, ex breuibz staminibus facti, Tanaceti floribus, & medijs discis florum Chamemeli similes, sed tamen aliquantulum latiores, colore lutei, qui in semina obscuri coloris permutantur: radix lignosa. Est ipse frutex cauleculis & folijs albicans, & suauiter cum granitate quadam odoratus.

² HVC similis est & altera species, folijs tamen longioribus, virentioribus ac minus candidis; flore pallidior.

³ TERTIA folijs brevissimis, tenuissimis & Erica proximis: floribus luteis, & aliarum similibus.

⁴ QUARTA folijs est minus denticulatis & cupressi similibus.

⁵ QUINTAE cauleculi non eriguntur, sed procumbentes per terram repunt: folia crassiora & lanuginosiora magis canescunt: flores in corymbis aurei, aliarum Santolinarum similes.

IN Belgio omnes peregrinae sunt, neque alibi quam in hortis repertuntur. Primum genus familiarissimum; reliqua rariora. Florent Iulio & Augusto. Appellantur haec omnes uno Santolina nomine: Belgae vulgo Cypres nominant. Chamacyparissum plerique faciunt, sed de Chamacyparisso aded brevis & succinctus est Plinius, ut ex eo, horum sententia nec rejici, nec probari queat. Officina semen, semen contra vermes, & semen sanctum appellant. Quod nonnulli ignorantes ex qua stirpe colligatur, Santonici semen esse existimant; alij Seriphij siue Absinthij marini. Vtrique autem à vero aberrant, nec etenim alterius quam Santolinae est. Hallucinantur etiam non parum, qui Santolinam Abrotanum feminam esse volunt. Abrotanum siquidem femina, folijs est maris, Seriphij videlicet, sed procerius & fruticis modo arborescens. Santolina humilior est & non Seriphium,

ripiū, sed proximius *Ericam* folio exprimit. Plus similitudinis cum *Abrotano* femina *Elochryson* habet, folio namq, *Abrotanum* refert, odoreq, ei vicinum est, non tamen *Abrotanum*, sed sui generis herba.

EST autem *Santolina* semen, gustu amarum, potentia calidum siccumq, tertio ordine: ventris lumbricos sumptum interimit, & aduersus eosdem efficax est.

PLINIVS *Chamacyparissum* herbam, ait, ex vino potam, contra venena serpentium omnium, scorpionumq, pollere.

DE MAIORANA, SIVE MARO.

CAP. LXXV.

POST flores, coronaria aliquot describenda sunt herba: inter quas *Maiorana*, qua humilis & fruticosa est stirps, candicans & suavis admodum odoris, sesquipalmum aut pedem alta; cauliculis siue furculis tenuibus, in plures alas diuisis; circa quos foliola sunt penè rotunda, mollia & incana; & in summo flosculi candidi perpufilli, è spicis *Heracliotici* *Origani* similibus exeuntes, exiguis videlicet, oblongis, & squamatis compactilibus: radicibus tenuibus. Reperitur hac quandoque maior, subinde tenuior ac minor, odoreque præstantior. *Hortensis* vtraque est. Vtraque æstare quoque floret.

ITALI *Persam*, & minorem *Persam* gentilem nominant: Germani, *Mayoran* & *Mayran*: Belgæ, *Marion*: Galli, *Mariolaine* & *Marone*: Officina & passim *Maioranam*. Creditur veterum *Sampsyichum*. Sed *Σαμψύχον* herba est, *Dioscoride* auctore, per terram repens; *Maiorana* verò non repit, sed in rectum & altum assurgit;



assurgit ; quod eam non esse Sampsychum, vel solum, manifestè innuit.

SCRIPSIMVS aliàs Maïoranam legitimum Ma-
rum

rum esse; confirmat sententiam nostram Maiorana nomen, quod à Maro videtur derivatum; sed apertius ipsa Mari descriptio, cum qua exactissimè convenit. Herba siquidem est fruticosa, flore ut diximus Origani, folijs candidioribus, flore odoratiore. Cuiusmodi Marum esse Dioscorides scriptum reliquit. Μάρων, ait, ἢ ὑσόβριον, πῶτα γνωρίμος, φρυγανώδης, ὁμοία τῷ ἀνθει ὀρεγάνῳ, τὰ μέντοι φύλλα τούτου λευκότερα πολλῶν, καὶ τὸ ἄνθος ἐρυθρότερον: hoc est, Marum siue Isobrion nota est herba, surculosa, flore Origano similis: folia tamen huius candidiora multo, & flos odoratior. Et substitutam pro Sampsycho Maioranam, alienum putari non debet, quando & ipso Galeni tempore Marum Sampsychi loco in Amaricinum vnguentum fuerit immissum: ut lib. 1. de Antidotis ipse testatur, ubi ait; Marum longè odoratius esse Sampsycho; & ea de causa hoc omisso, Marum fuisse compositionibus additum. Præbuit istud occasionem posteris, ut Marum siue Maioranam, Sampsychi loco habuerint, eiusq; nomine appellauerint.

EXCALFACIT autem Maiorana & resiccat, & in utraque qualitate secundi est ordinis: auxiliatur cerebri & capitis frigidis morbis quovis modo assumpta: naribus imposita sternutamentum facit & pituitam euocat: dentium dolores lenit commansa aut apposita; vrimas & aquosos humores in potu sumpta ducit, & menses mouet: admiscetur antidotis.

DE SAMPSYCHO, SIVE AMARACO EX
DIOSCORIDE, THEOPHRASTO,
ET ALIIS. CAP. LXXVI.

SAMPSYCHON, Dioscorides inquit, herba est πολύκλωνος, siue multum ramosa, serpens per terram, solia
R habens

habens hirsuta & rotunda, similia Calamintha tenuifolia: multum odorata & calida, quæ in coronis necitur, Cyzicenum & Cyprium laudatissimum. Secundum locum habet Aegyptium. Appellatur à Cyzicenis & Siculis Αμαράκων siue Amaracum.

THEOPHRASTVS Amaracum in censu φρυγανίων siue suffruticum satiuorum ac coronariorum lib. 6. enumerat, & præstare ait, seminis copia, quod εὐοσμὸν, id est, boni ac suavis est odoris; nasci semine & auulsione: ex astiuis esse, vnguentisq; misceri.

PLINIO lib. 21. cap. 11. auctore, Amaracum Diocles medicus & Sicula gens appellauere, quod Aegyptus & Syria Sampsyichum: seritur utroque genere, & semine & ramo: copiosum Amaraco aequè ac Abrotano semen.

VERGILIUS Aeneid. 1. Amaracum fruticem florum esse ostendit, sic scribens:

— Vbi mollis Amaracus illum

Floribus, & dulci aspirans complectitur umbra.

Idem testatur Catullus in Epithalamio Iulie & Melli:

Cinge tempora floribus

Suaue olentis Amaraci.

GALENVS Amaracum & Sampsyichum differentes facit stirpes, de utroque locis agit separatim, & suas cuique tribuit vires. Sed Amaracus Galeni Parthenium est: siquidem, uti Dioscorides testis est, Parthenion quidam Amaracum vocant; & in libris de simpl. Medica facult. Galenus nusquam Parthenij meminit.

PORRO Sampsyichum, ut Galenus ait, tenuium est partium & digerentis facultatis; deficcatur & excalescit tertio ordine. Dioscorides decoctum eius potum tradit, conuenire hydropicis in morbi initio; & vrinae difficultate, ac torminibus laborantibus: arida verò folia cum melle apposita,

fitā, tollere sugillatā; & menses ducere subdita, ad Scorpionum ictus cum sale & aceto imponenda; ad luxata verò cum cerato excepta, & similiter cedematis; ad oculorum verò inflammationes cum tenuissima polenta farina apponenda: misceri acopis & malagmatis calfacientibus.

DE MARO VVLGARI, SIVE CLINOPODIO. CAP. LXXVII.

QVOD à plerisque modo Marum nominatur, frutex parvus est, odoris admodum suavis, sesquipedem aut duos dodrantes altus: surculos habet tenues, ramosos, lignosos, & foliola circa eos exilia, durioris Thynni aut Serpylli vulgaris folijs similia, sed albicantia, candidiora, & aliquantulum maiora, ac in summo veluti lanuginosa capitula, & ambientes similes verticillos; è quibus perpusilli flosculi exeunt albi: radices tenues & lignosas. In Hispania passim unà cum Stœcade locus aridis desertusq; gignitur: aptud Belgas & alibi, non absque studio, & cura in hortis seritur. Aestate verticilli & capitula lanuginosa, cum floribus emicant.

MULTI hac ætate Marum vocant; Marum autem nequaquam est, verum Dioscoridis Clinopodium. Clinopodium autem Dioscorides θάμνιον, id est, exiguum fruticem esse refert, σφυαρώδην, siue surculaceum, duorum dodrantum, in petris nascentem, folia habentem Serpyllo similia; flores verò lecti pedibus, ex intervallis vii Marrubij. Cum qua descriptione hac odorata stirps satis convenit. Surculacea etenim est, & ad duorum dodrantum altitudinem assurgit; flores ita habet per verticillos digestos, ut quibusdam caulem veluti Marrubij ambientibus, alij in summo instar globosum lecti pedis capitulum emineant: folia Serpylli veri folijs colore similia, nempe candicantia; qualia



Serpylli esse Dioscorides ostendit, quando candidiora, quàm Origani esse ait: sunt eadē tenuia, veluti Serpylli esse Theophrastus testatur. Quæ omnia maximam huius stirpis cum Clinopodio similitudinem ostendunt. Appellatur verò κλη-
ροπόδιον, à quibusdam etiam Cleonicum, Ocymoides, Zo-
pyron, Latinis lectipes.

VIM autem, vt Galenus, Clinopodium excalfaciendū obrinet, cum essentia subtili, & in tertio est, cum excalfacientium, tum resciccantium ordine. Dioscorides bibi herbam scribit, & decoctum eius aduersus venenatarum bestiarum morsus, conuulsa, rupta, & vrinæ stillicidia; ducere menses: sæctus & acrochordonas ejcere aliquot diebus potum: alnum idem sistere ad tertias decoctum & bibitum; non febricitantibus in vino, febrientibus in aqua.

DE ROSMARINO CORONARIO.

CAP. LXXVIII.

CORONARIUS Rosmarinus frutex est lignosus, caudice subinde tres aut quatuor pedes alto; ramis multis tenuibus: folijs crebris, oblongis, angustis, duriusculis, subtus candicantibus, superius verò saturi viroris, cum gravitate non ingrata odoratis: floribus parvis ex ceruleo albicantibus, è foliolorum sinubus prodeuntibus: semine exili & nigro: radicibus tenuibus, fibrosis, non altè descendentibus.

IN Gallia, Hispania, & alijs provincijs locis syluestribus & incultis nascitur; tantus eius in Narbonensi Gallia prouentus, vt haud temere aliud incolæ lignum vrant. In Italia hortorum sepit areas: Belgarum etiam exornat. Floret primo quoque Veris tempore.

Λιβανωτίδα στεφανοματικὴν Græci, Latini Rosmarinum coronarium, nominant. Coronarium autem cognomi-

natur , ad differentiam aliarum umbelliferarum Libanotidum. Libanotidum siquidem species complures sunt , quaedam umbelliferae, vna non umbellifera, forma ab alijs differens, coronaria, de qua nunc agimus. Germani hanc Rosmarin, & similiter Galli nuncupant.

CALIDVM autem & siccum Coronarium Rosmarinum secundo est ordine, & simul adstringentis facultatis particeps ; vtpote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, cōpositum. Proinde & omnes vteri diurnos fluxus sistit, & sanguinis profusum supprimit. Conuenit etiam, & praesertim flores , omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidaq; causa malis : cerebrum etenim desiccant : sensus & memoriam acuunt: neruosas partes confortant.

SERAPIO Rosmarinum , quo Coronarij vtuntur, calfacere & multum reficcare, testis est ; & ex auctoritate Abin Mesuai, conferre, ait, corizae frigide cerebri.

DIOSCORIDES regium morbum sanare tradit, si quis ipsum in aqua coctum , ante exercitationem bibat, deinde exercitatus lauet, & vinum bibat.

DE LAVANDULA. CAP. LXXIX.

ODORATA & coronaria stirps lauandula est , sed humilis , ramulos siue virgas profert tenues, quadrangulares, geniculatas, cubitales aut longiores: folia circa singula genicula bina, oblonga, carnosae , vtraque parte albicantia, Rosmarini coronarij folijs multo longiora latioraq; ; & in summo spicas oblongas tenues, floribus refertas caruleis: radices lignosas in fibras diuisas. Spirant flores & folia copiosum caputq; implentem odorem.

VNA huius species folijs est maioribus, crassioribus & longio-



longioribus, quæ odoratior: altera minoribus & tenuioribus; inuenitur & flores candidos habens.

VESTIUNTUR in Hispania & Narbonensi Gallia plerique montes & campi deserti Lauandula. In reliqua Gallia, apud Germanos, & alibi in hortis feritur. Iunio ac Iulio flores exeunt.

ITALI maiorem, Nardum Italicam, & Spicam, vulgariq; lingua Spigo nuncupant: minorem, Lauandam & Lauandulam. Germania & Belgium vtrunq; Lauandulam & Lauendulam vocat: & maiorem quidem Lauandulam marem; minorem feminam: vulgo Lauender. Existimatur esse Casia odorata herba, cuius Vergilius subinde meminit, ut Bucolicôn Ecloga secunda:

Tum Casia atque alijs intexens suauibus herbis
Mollia luteola pingit Vacinia Caltha.

Et similiter Georgicôn quarto, vbi agit de statione & sedibus apibus deligenda, apiarioq; constituendo, his verbis:

Hæc circum Casia virides, & olentia latè
Serpilla, & grauius spirantis copia Thymbra
Floreat.

EST tamen & alia Casia σύριζ sine fistula, quæ passim hoc tempore Cinamomum & Canella appellatur. Plinius Casiam ab Hygino Cneoron appellari refert. Sunt autem Theophrasto ac Plinio auctoribus Cneora duo: vnum candidum, folio carnosio, oblongo, figura quodammodo oleagino simili, odoratum: alterum nigrum, nullius odoris: radix vtrique altè descendens, grandis, ramuli permulti, crassi, lenti: germinant florentq; post Autumni æquinoctium, & multum denique temporis florent. Talis autem nequaquam Lauandula est, quæ nec crassa est radice, nec altè descendente; ramulis non lentis, & non Autumno sed Æstate flores profert; proinde etiam nec Cneori aliqua species.


EST

Cncoron.

EST autem *Lauandula*, potentia ac viribus calida siccaq³, & ordine quidem tertio, tenuium item partium & ex multis aëreis spirituosissq³ partibus conflans: frigidis ea de causa capitis morbis quovis modo adbibita confert, & praesertim ijs, qui non ex copioso humore, sed ex sola potissimum qualitate originem ducunt. Proinde & stillatitius eius liquor odoratus, & temporibus ac fronti illitus, Catalepsi, leuiori hemiplexia, & subinde Comitiali morbo, ac non raro syncope laborantes rescit. Sed ubi humorum copia adest, praesertim sanguini permixtorum, non satis tutus huius usus est: sicuti neque compositionis, quæ ex stillatitio vino in quo huiuscemodi herbae, flores, seminaue, & aromata quadam macerata sunt, conficitur; quam plerique temerè & indifferenter exhibent. Nam calidorum huiuscemodi caput implentium usu, & morbus intenditur, & eger in periculum inducitur: praesertim quando sanguinis missio aut purgatio non praecesserunt. Quod ideo monendum duximus, quia passim plerique medici indocti, & temerarij audacesq³, nimium pharmacopœi, aliæq³ stolidæ mulieres statim similes compositiones, & id genus alia non modo apoplecticis, sed & Catocho cum febris occupatis insundunt, quibus nihil potest peius dari, cum plurimum obsint, & non raro ipsos egrotantes perimant.

DE STOECHADE. CAP. LXXX.

STOECHAS caudice est uti *Lauandula* breui & lignoso, sed tenuiore: ramulis siue virgulis multis ac tenuibus; folijs circumnuestitis oblongis, angustis, candicantibus, minoribus quam *Lauandule*; comantibus in summo capitulis, siue spicis densis, compactis, breuibus & crassis, e quibus flores purpurei & pusilli exeunt, & quadam eminentia foliola: semen in his subnigrum: radices lignosæ.



HISPANIA, Narbonensis Gallia, & Stæchades insula è regione Massilia, Stæchade herba siue frutice redundant. In Germania ac Belgio è semine sata prima æstate facile adolescit; sed hyeme, nisi intra ades aut penuarias cellas transferatur, perit; Hyemis siquidem & frigoris impatiens est.

A Dioscoride *στῖχας*, ab alijs, ac à Galeno *στοίχας*, per oi diphthongum syllaba secunda: Latine Stæchas. Florem officina Stæcados nuncupant.

CÆTERVM Stæchadis, Galenus inquit, temperies composita est, ex terrena essentia frigida exigua, vnde adstringit; & extenuata altera terrena copiosiore, à qua utique amara est, ob vtrorumq; verò conuenientiam, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareq; tum viscera omnia, tum totum corpus est nata. Dioscorides decoctum eius tradit, veluti hyssopi, ad pectoris vitia facere, & antidotis vtiliter admisceri. Posteriores medici Stæchadem, & præsertim flores eius, aduersus capitis dolores, & omnes eius ex frigidityte ac frigida causa morbos, valde efficaces esse affirmant: miscentur ea propter, omnibus ferè compositionibus, quæ aduersus Cephalalgiam diuturniorem, Apoplexiam, Catalepsin, Epilepsin, & similes affectus adhibentur.

DE THYMO. CAP. LXXXI.

THYMI duo apud veteres sunt genera: vnum Cephaloton dictum; alterum durius.

CEPHALOTON multis exilibus ac tenuibus fruticat virgis, folijs exiguis & copiosis circumdatis: capitulis in cacuminibus Stæchadis ferè similibus, sed minoribus; è quibus flosculi exeunt purpurei. In Creta insula copiosum nascitur:

tur: unde illi Cretico cognomen datum est. Dioscorides gracili solo & petroso provenire scribit.

- 2 DURIUS Thymum sirculosum quoque est, & perpusilla habet foliola; colore quod vulgatissimum est virentia; & suave odorata; candida verò & graueolentiora, quod rarius est: flores verò non in capitulis aut spicis, sed iuxta foliola: radices tenues. Huius generis Thymo, Hispania & Narbonensis Gallia loca deserta & inculta abundant: In Germania, Belgio, & alibi in hortis studiosè colitur.

GRÆCIS Θύμος dicitur, Latine Thymus, & Thymum. Prior κεφαλῶτος, id est, capitatus, & Θύσιον: alter σκληρότερος, id est, durior à Dioscoride, cap. de Epithymo, cognominatur. Plinius Thymi duo genera esse tradit: vnum candidum; alterum nigrum ac nigricans appellat: & candidum præstare ait, ac in collibus nasci; lib. 21. cap. 21: Vtrumq; ad durius genus referendum videtur, nam ut scripsimus, durioris Thymi quoddam folia habet candicantia; aliud verò virentia, quod nigricans dicitur, quia saturo colore & non candicante vireat. Germani ac Belgæ Thymum Thymus: Galli, du Thym nominant.

THYMYM autem, ut Galenus tradit, in excoalsaciendo exiccandoq; in tertio statuendum est ordine, incidit & calfacit veementem; ob id & vrinam & menses prouocat, factum euellit, viscera expurgat, educendis ex thorace & pulmone confert. Potum, Dioscorides scribit, cum sale & aceto pituitam per aluum ducit. Decoctum eius cum melle Orthopnoicis & Asthmaticis prodest. Lumbricos ventris, menses, foetus, & secundas pellit: vrinam cit. Mixtum melli & delinctum, faciles è thorace excreationes facit. Oedemata recentia cum aceto impositum discutit, sanguinis grumos dissolvit: thymos & ἀποχρηστικός siue pensiles verrucas

verrucae tollit. Ischiadicos cum vino & polenta impositum iuuat. Hebetibus oculis in cibo sumptū prodest. Vtile etiam pro condimento tempore sanitatis.


DE SERPILLO VULGARI.

CAP. LXXXII.

VULGARI Serpillo multi sunt exiles cauliculi, duri tamen & lignosi, nonnulli in rectum palmi altitudine surgentes, alij repentes, & alicubi terræ superficiei exiguis fibris annexi: folia exigua, virentia, Thymi similia: capitula in cacuminibus rotunda, è quibus flosculi exeunt, colore rubente purpurei, non raro etiam albi: radices tenuissimæ ac fibrosæ.

NASCITUR passim locis incultis, iuxta agrorum margines, pingui præsertim & sæcundo solo: subinde etiam locis petrosis: & non modò in Germania aut Belgio, sed & in Italia ac Gallia sponte exit. Matthioli apud Goritienses Saluatino monte copiosissimè nasci refert. Tota ferè Aestate floris eius prouentus.

GERMANI, Quendel/kumel' & kienlin: **BELGÆ**, Quendel/wilden Thymus/ & onser Thonwen bedstroo: **GALLI**, Pillolet: **OFFICINÆ**, Serpillum; pleraque verò etiam Pulegium montanum nuncupant. Et passim quidem Serpillum veterum existimatur: non tamen tam Serpillis, quàm Saxifrangæ Dioscoridis respondens. Si etenim diligenter, & ad Serpilli vtriusque, & ad Saxifrangæ descriptionem expendatur, exiguum Serpillis, plurimum verò Saxifrangæ simile esse comperietur. Primum etenim Serpillum, præter quod ramulis & folijs Origano simile est, in quantamcunque altitudinem adnunculo sultum, aut vicinis stirpibus innixum crescit, & quandoque ex Ocymo
per



per nimiam siccitatem mutato gignitur : alterum verò non serpit, & folio est Ruta, id est, Hyperici aut Cētaurij minoris (vt alibi ostendimus) longiore . Serpillum verò vulgare humile est , frutices non conscendit , ex Ocymo non prouenit, & folijs est, multo quàm Hyperici aut Centaurij minoris, minoribus & breuioribus ; omnino videlicet exiguis, ac Thymi, vt diximus, folijs similibus. Ex his Serpillum vulgare, non Serpilli veterum aliquam speciem, sed Saxifrangam Dioscoridis esse, palam est. Saxifrangam enim, ait, esse herbam Thymo similem, in petris nascentem. Serpillum autem vulgare Thymum folijs & capitulis refert , & non rarò in locis petrosis reperitur : propter eam siquidem quam cum
Thymo

Thymo similitudinem habet, sylvestre Thymum & à Belgis, & ab alijs nominatur.

VERBA Dioscoridis de Saxifraga sunt: Σαξίφραγον, Saxifraga. οἱ δὲ σαξίφραγον, οἱ δὲ ἐμπετρον: ῥωμαῖοι σαξίφραγα, Σάμνος ἐστὶ φρυγανώδης ἐν πέτραις καὶ τραχέσι τόποις φύμενος, Συμῶ ἐμπερὺς. hoc est, Sarxiphagon, alij Sarxiphangon, alij Empetrum, Romani Saxifraga, frutex est furculaceus in petris & asperis locis nascens, Thymo similis. Exemplaria quadam ἐπιθυμῶ ἐμπερὺς legunt, sed emendatiora Συμῶ habent.

Locus
Dioscori-
dis resti-
tutus.

FACULTATE autem Serpillum vulgare calidum & siccum est, tertio penè ordine; tenuium item partium & incidens: menses euocat; vrinam cit: calculos expellit; & in balneis ac fomentis adhibitum, sedorem euocat.

EADEM ferè de Saxifraga Dioscorides memoria prodidit: cocta, ait, in vino febricitantibus opitulatur: stranguriae prodest: singultum sedat: calculos vesicae frangit: & vrinam cit.

DE SERPILLO EX DIOSCORIDE,
THEOPHRASTO ET ALIIS.
CAP. LXXXIII.

SERPILLUM Dioscoride auctore, duorum est generum: hortense & sylvestre.

HORTENSE coronarium est, & odore Sampsychum refert: folia habet & ramulos Origani similia, multo candidiora; iuxta sepes relictum procerius assurgit.

ALTERUM non serpens sed erectum, ramulos emit: tenuis furculosos: folijs refertos Ruta similibus, angustioribus tamen, oblongioribus, durioribusque: flores gustu acres,

acres, odore suaves: radix inutilis. Nascitur in petris efficacius, & magis excalfaciens satiuo.

THEOPHRASTVS de historia stirpium, lib. 6. Serpillum tradit ex suffruticibus esse, lignosis ac coronarijs: ac ramis & folijs tota sua natura odoratum, veluti Helenium & Sisymbrium; apud nonnullos etiam Thymum penitus redolere: summae terrae adherere; radice multifida torrida; peculiarem illi auctiorem germinum; quippe cum in quantumvis longitudinis procedere valeat, nactum adminiculum, aut iuxta sepes aliquas satiuo: squalorem pati, atque aquae paucae indigum: nasci ex Ocimo per immodicam siccitatem degenerante; lib. de causis quinto, Ocimo videlicet ipso, minoris folij, sed odoris potentioris facto. Vnde colligendum, Serpillum Ocimo esse odoratius & folijs minoribus.

SYLVESTRE Serpillum idem, quoddam esse ait, quod deferentes ex montibus serunt, ut apud Sicyonem fieri solet, atque etiam Athenis ex monte Hymetto: apud alios verò, ut in Thracia, montes & plana omnia Serpillo scatere. Sylvestre autem istud, à Dioscoridis sylvestri aliud est: sola etenim cultura ab hortensi differt: veluti Theophrastus ipse ostendit ex montibus translatum seri referens.

DIOSCORIDI aduersatur Plinius lib. 20. cap. 22. ubi sylvestre ait serpere, satiuum verò minimè. Serpillum, inquit, à serpendo putant dictum, quod in sylvestri euenit maximè in petris. Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinem increfcit.

MEMINIT Serpilli Aelianus variae historiae lib. 9. & ipsum inter flores numerare videtur. Dionysius Iunior, inquit, in Locresium urbem veniens maximas ciuitatis domos occupauit, easque Rosas, Serpillis, alijsque id genus floribus strauit. Vergilius tamen Bucolicò ecloga secunda, Serpillum

pillum herbam esse manifestissimè testatur his verbis:

Thestylis & rapido seseis messoribus astu

Allia, Serpillumq³, herbas contundit olenteis.

Ex quo loco colligendum sunt qui putent, vulgare Serpillum, verum & legitimum esse, quod videlicet non aliud passum in Italia sponte gignatur: quasi nullibi quàm in agro reperiri, & non in hortis feri potuisset.

SERPILLUM autem Græcis ἔρπυλλος ἢ ἔρπυλλον dicitur. Marcellus verus auctor, à Gallis antiquitus Gilatum nominatum affirmat, ut verò Plinius Valerianus ab ἴisdem Laurio nuncupatur.

EXCALFACIT verò vsque adco Serpillum, ut Galenus dicit, ut & menses & vrinas moueat: gustu multum est acre. Prodest etiam, vti Dioscorides addit, ad tormina, rupta, conuulsa, iocinoris inflammationes, & ad serpentium morsus, & potum, & impositum; capitis dolores mitigat coctum rosaceo permixtum: cum aceto irrigatum maximè quidem lethargicis, sed & phreneticis. conuenit: sedat & sanguinis vomitus quatuor drachmis potus cum aceto succus eius.

DE OCIMO. CAP. LXXXIIII.

SATIVI Ocimi species magnitudine differentes duæ sunt vulgares, ambæ furculose, dodrantis aut pedis altitudine attolluntur; ramulis rotundis in plures alas diuisis. Et maior quidem folia habet lata; per margines leniter crenata, Mercurialis herba magnitudine & forma similia: minor verò minora: utraque splendida, & dilutè vi-² rentia: flosculos exiguos, colore vel candidos, vel obscurius purpurascens: semen exiguum, nigricans: radices oblongas duras non absque adhaerentibus fibris: odor utri-



que similis, nisi quod maioris, species quadam reperitur, quæ Citrium malum odore refert, quod Ocimum citratum appellant.

MATTHIOLVS præter hæc duo Ocima, etiam tertium quoddam maximum reperiri, memoria prodidit, folijs Amaranti maioribus, longis, latis & crassis, Citrea mali folijs similibus.

SERITVR Ocimum in hortis & in scitilibus; celerimè, ut Theophrastus auctor est, provenit. Quod Soli expositum est, eodem teste, transit in Serpillum; quia vehementius siccatur; folio namque minus, odoreq; vehementius redditur. Iunio ac Iulio Ocimum floret, & particulatim quidem, ac diu, ab inq; incipiens.

ΟΚΙΜΟΝ, & per ω prima syllaba ΟΚΙΜΟΝ Græci appellant; nonnulli etiam ὄζιμον: Latine Ocimum. Differt ab Ocymo quod ostendimus in Frumentorum historia, pabuli genus esse, & ad differentiam huius per υ secunda syllaba scribitur; tamen & per υ, odoratum Ocimum quandoque scriptum reperitur. Recentiores ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ, Latine Regium id est, quoque nominant: Officina, Basilicum: Germani, Basilgen, Belgæ, Basilicom: Galli, Basilic: Itali, Basilico, & quod minus est, Basilico gentile: pleriq; Basilicum Gariophyllatum hoc vocant.

OCIMUM autem, auctore Galeno, ex secundo quidem est ordine excalfacientium, sed humiditatem habet recrementitiam adiunctam, ob quam commodum non est ut intra corpus sumatur: sed foris adhibitum ad digerendum concoquendumq; idoneum est.

DIOSCORIDES Ocimum, ait, si multum edatur, visum hebetat; aluum mollit, flatum mouet, urinam cit, lac euocat, sed agrè conficitur: impositum verò cum polentæ tenui farina, rosaceo & aceto inflammationibus medetur, &

Draconis marini ac Scorpionis plaga ; per se & cum vino Chio, oculorum doloribus.

S V C C V S oculorum caligines purgat, & defluxiones exiccat.

S E M E N potum prodest atram bilem colligentibus, suspensiosis, & urinae difficultate laborantibus : facit idem sternutationes frequentes, si per nares attrahatur : idem ipsa herba facit. Claudere autem oculos oportet, sternutatione urgente.

S V N T qui Ocimum vitant, & non edunt ; eo quod commansum & in sole posuum vermiculos gignat. Aphri adiungunt eos qui à Scorpione icti sunt, & ipsum comedunt, absque dolore permanere.

R E C E N T I O R E S, inter quos Simeon Zethy est, Ocimum tradunt olfactu cordi capitique prodesse : semen cardiacis affectibus succurrere, animi moerorem ab atra bile ortum discutere, & hilaritatem latitantiâque procurare.

DE OCIMO SYLVESTRI VULGARI, SIVE
ACINO. CAP. LXXXV.

Q U O D recentiorum plerique Ocimum sylvestre nuncupant, cauliculos promit complures quadrangulares infirmos, terram versus reclinatos : folia ex intervallis bina contra se posita, parva longiuscula ac latiuscula, aliquantulum hirsuta & aspera, uti & cauliculi : flosculos è foliorum sinubus exeuntes, paruos, orbiculatim cauliculos ambientes, colore è candido nonnihil purpurascens : semen exile : radices fibris cohaerentes. Odore herba hæc multo quàm Ocimum est infirmiore ; vtpote exili ac obscuro, sed tamen cum gravitate quadam non insuavi ad Calamitæ aut Ocimi accedente. Exit multis Germania ac Italia locis



locis sua sponte, præsertim incultis & arenosis. Aestate tota floret, & non raro Septembri etiam mense.

OCIMUM sylvestre, ut diximus, appellant plerique recentiorum. Quod autem Ocimum sylvestre Plinio, alijs est Ocimastrum & ὀκυμαστρὸν. Ocimoides verò multum à presenti herbula differt. Siliquas siquidem Ocimoides habet, Hyoscyami siliquis similes, semine nigro, quale est Melanthij prægnantes: huius autem semina minima sunt, & vasculum omnino exiguis continentur, nullam cum Hyoscyami cyminis similitudinem habentibus: ita ut hinc herbulam istam, non esse legitimum Ocimum sylvestre siue Ocimastrum evidens sit. Quam ob causam ab alijs non pro Ocimo sylvestri, sed pro Clinopodio habetur: sed nec horum sententia laudanda videtur. Nam si propter florum secundum cauliculos ambitum, Clinopodium dici mereatur, multa alia eodem nomine nuncupanda erunt: ut, Calaminthes, Oruala, Ornimi, Lamiij, Dictamni, & Marubij species quadam, Pulegium, Salvia, Scordium, Melissophyllum, Sideritis, Galeni Alysson, recentiorum Bugula & Cardiaca, similesq; alia, quarum omnium flores orbiculatim cauliculos circundant, nulla tamen Clinopodium dicitur. Nobis hæc herba Acino haud dissimilis videtur. Acino enim Dioscorides ait, πῶτον λεπτοκαρπον siue herbam tenuium sarmentorum, coronariam Ocimo similem sed hirsutiorē & odoratam. Cum qua descriptione præsens nostra satis convenit.

FACULTATE autem aliquantulum calida est & sicca, non absque adstringendi vi ac potentia.

ACINON verò Dioscorides tradit, menses & aluum sistere potum; impositum verò Phygæbla & erysipelata curare.


Acinos.

DE ORVALA. CAP. LXXXVI.

ORVALÆ species prior (eius etenim tres aut quatuor numerantur) quæ propriè Oruala nuncupatur, caules promit crassos quadrangulos, duos pedes longos, in alas divisos : folia & è radicibus multa, & secundum caules ex internodiis bina contra se posita, magna, palmum lata vel ampliora, aliquantulum aspera, inæqualia, albicantiaq̃, ac nonnihil vti & caules hirsuta : flores formæ florum Salviæ aut Lamij, colore ex diluto caruleo candicantes, post quos oblonga denticulata vascula pro siliquis, in quibus semen nigrum : radices verò fibrosas. Tota herba grauem sortemq̃ spirat odorem caput opplentem, & maturato semine interit, quod altero fit à satione anno. Seritur ab olitoribus in hortis. Iunio ac Iulio floret.

GALLITRICVM Officinæ nuncupant. Dicitur & Oruala siue Orualla, Tota bona, Sclarea, Scarlea, Centrum Galli, Matrisaltia : à Gallis Oruale : à Germanis Scharlach : à Belgis Scharleye. Falluntur qui Alektorolophon existimant. Alektorolophon in Frumentorū siquidem historia multum ab Oruala differentem ostendimus. Videtur autem hac Orualæ species, Horminum sylvestre, quod Dioscorides ait, viribus magis pollere. Inter omnes etenim Orualæ ac Hormini species, nulla odore aut viribus hac potentior est.

ALTERA Orualæ species, caules habet similiter quadrangulares, sed proceriores, bicubitales videlicet vel altiores : folia quoque aspera, nigriora tamen ac minora : flores similes colore purpureo rubentes : radices vti prioris. Odore hac minus præstat, omnino exiguo prædita : rara est. Floret eodem quo prior tempore. Baccharim esse, sunt qui putent ; eorum autem sententia quàm sit probanda,



ostendet Baccharis descriptio, quam à subsequenti proximum dabit caput.

TERTIÆ Oriala, caules quoque quadrangulosi & 3 nonnihil hirsuti sunt: folia per ambitus serrata, Oruala prioris similia, sed minora: flores lutei: semen sufflaum nigricans: radix fibrosa, durabilis natura, & multis annis permanens. Apud Belgas à nonnullis in hortis seritur; in Alpibus autem Italiae iuxta Tridentum, sponte gigni fertur. Aestate floret. Horminum luteum & Horminum Tridentinum à plerisque appellatur.

POTEST his, & quarta addi species, quæ pro sylvestri Hormino à Fuchsio depingitur: cauliculi huic breviores, caterùm hirsuti quoque & quadrangulares: folia minora, oblonga, profundius incisa: flores cerulei: siliquæ per maturitatem deorsum nutantes: semen nigricans: radices similiter nigrae & fibrosæ. Fuchsius in Germania passim ait, omnia prata exornare, suæque sponte in ijs nasci. Tempore floreendi cum superioribus convenit. Oruala & Hormini hæc quoque species, sed iners, & nullius facultatis esse videtur.

AT prior, quam diximus propriè Orualam dici, calida & sicca est ordine tertio; menses modo quoniam sumpta movet: secundas eijcit: ceruisia aut vino permixta ebrietatem facit, caputq; implet.

ANTONIUS Mizaldus semen utile tradit, ad excutiendam oculorum caliginem, & educenda ea, quæ in illos inciderunt: in oculum siquidem inmissum, & multa reuolutione circa bulbum eius circumductum, tandem humore pregnans, & tenuibus membranulis ac sordibus onustum elabitur.

HORMINVM Oruala etiam quadam species est, sed reliquis minor: caules promit complures dodrantem aut pedem altos, angulosos similiter, subhirsutos: folia lata, rotundiuscula, subaspera, Oruala multo minora, Marrubij ferè similia, quorum quatuor aut sex superiora, purpureo nigra Viola colore, sed tamen dilutius emicant: flores iuxta folia cauliculos ambientes, colore purpureo diluto albicantes: semen exiguum oblongum nigricans, in oblongis receptaculis, veluti siliquis, quæ maturato semine radicem versus spectant: radicem longam, tenuem, non absq; fibris. Peregrinum Belgio Horminum est, & aliunde in hortos illatum. Aestiuis mensibus florum eius productio, semen interea maturatur.

Ορμινον Græci: Latini Horminum & Geminalem appellant.

CALIDVM autem, ut inquit Paulus Aegineta, Horminum est, mediocriter siccum & abstergens. Hormini semen, Dioscorides ait, putatur cum vino potum Venereum excitare: verum cum melle, argema & albugines oculorum depurgat: cum aqua impositum œdemata discutit & atuleos extrahit. Idem herba imposita facit. Galenus in libris de Alimentorum facultatibus, de Hormino: Hoc quoque, ait, frixo vtuntur, deinde catenus læuigant, ut farina euadat; mel quoque ei admiscet. Parum in seipso habet alimenti, ut quod media inter Erysimum & Cuminum sit natura.



DE BACCHARE, EX DIOSCORIDE ET
ALIIS. CAP. LXXXVIII.

BACCHARIS auctore Dioscoride, odorata & coronaria est herba, cuius folia *τῆαχία* ; id est, aspera, alias *δασία*, hoc est, densa sunt, magnitudine inter Violam & Verbascum media: canlis angulosus, cubitalis, subasper, *πασα-
κουέδας*, id est, iuxta adnatas propagines habens : flores purpurei, subalbicantes, odorati: radices Veratri nigri similes, odore Cinamomi. Amat aspera & squalida loca. Gracili solo nec humido provenit: Plinius.

Βάχχαρις Gracè dicitur, aut *τάνχαρις* quasi *πάνχα-
ρις*, ut plerisque placet: à quibusdam Nardum rusticum appellatur, ut Plinius lib. 21. cap. 6. testatur. Quin & ipse Plinius lib. 12. cap. 12. Nardum rusticum appellat. Sed lib. 21. cap. 19. perperam ita dici refert; statim videlicet, ut quosdam errore falso Barbaricam eam appellare scripsit: Sed eorum quoque error, inquit, corrigendus est, qui Bacchar rusticum Nardum appellauere. Est enim alia herba sic cognominata, quam Graci Asaron vocant. Idem eodem lib. cap. 21. Baccharim quosdam Perpensam appellare ait. Perpensa autem si Asarum est, veluti inter nothas & ascriptitias voces reperitur, non minus horum error, quam priorum refellendus. Nam Baccharis & Asarum non parum differunt, uti Plinius testis est, & ex utriusque descriptionibus collatis evidens. Proinde & perperam Officina Asarum, Asaram baccaram nuncupant, nomine ex Asaro & Bacchari composito; quasi idem sit Asarum & Baccharis. Qui error ex eo videtur manasse, quòd inter nothas Asari appellationes, Baccharis vox etiam reperiatur: aut quòd Baccharim Cratenas Asarum nuncupauerit. Quod siquidem Cratenas Asarum nominat, Dioscoridi nequaquam

quam *Asarum*, sed *Baccharis* est. Nam *Asarum* Dioscoridis caule caret: odoratum non est, nisi solis radicibus: nec etiam coronarium, si uti Plinius ait, vocitatum sit *Asarum*, quoniam in coronas non addatur. *Asarum* autem *Cratææ* caules facit, & odoratum ac coronarium est. Patet ex ipsa descriptione, quæ sic habet.

A S A R V M odorata & coronaria est herba: caules *Asarum*
eius geniculati: folia δασέα, id est, densa: flores purpurei: *Cratææ*.
radix boni odoris, similis *Veratri nigri*, odore *Cinamomo*
similis. Nascitur in asperis & squalidis.

Ex quibus verbis manifestissimum est, *Asarum* *Cratææ* idem cum Dioscoridis *Bacchari*, & ab *Asaro* eiusdem esse differens: & malè inter nothas voces *Asaro* *Baccharis* nomen attributum: peius verò adiectum *Asarum* coronariam & odoratam esse herbam, quod inter notha, etiam ascriptum reperitur.

M E M I N I T *Baccharis* etiam Vergilius in *Bucolicis* ecloga septima, & non modò coronariam esse stirpem ostendit, verum etiam fascini depulsoriam:

—Bacchare, inquit, frontem

Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.

E S T & *Baccharis* vnguentum apud Athenæum lib. 15. quod à *Bacchari* odorata herba nomen habere potest. Nam, uti Plinius, vnguenta ex ea radice fieri solita, apud antiquos Aristophanes prisca Comædia Poëta testis est.


C A T E R V M *Baccharis*, ut Paulus Aegineta paucis complexus est, radicis decoctum meatus obstruētes aperit, urinam & menses citat. Folia ipsius cum sint adstringentia, fluxionibus opitulantur.

BALSAMITA coronaria herba non est, sed foliorum eius cum gravitate quadam gratus est odor. Eius duo sunt genera, folijs multum differentia: Maior videlicet & minor.

- 1 MAIOR caulibus assurgit rotundis, duris, sesquipedalibus: folia eius oblonga, lata, leniter per oras crenata, Lappathi folijs ferè similia, minora tamen & viroris magis albicantis: coma aurei coloris ex multis flosculis veluti corymbis, Tanaceti ac Elichrysi modo in umbella coherentibus; quorum singuli ex multis exiguis staminibus luteis simul factis, compositi sunt; radices lignosae, durabilis natura, non absque multis adhaerentibus fibris. Apud Belgas hortensis est, passimq; etiam ab olitoribus colitur. Aestivis mensibus aurei coloris umbellas promit.

GERMANI, Frauwenkraut: Belgae, Balseme: & earum officinae Balsamitam, ac Balsamitam maiorem nuncupant. Est tamen & alia Balsamina, quae & Charantia ac Momordica; item Balsaminum genere neutro, herba ab hac Balsamita differens ac dissimiles. Matthiolus Mentham Gracam nominat: alij Saluam Romanam; item herbam Lassulatam, Costum hortensem, Mentham Saracenicam, herbam D. Mariae. Sunt qui volunt Panaces Chironium esse. Plinius etenim, & vulgaria Theophrasti exemplaria Chironium Panaces folio esse referunt Lappathi, floreq; aetereo; cuiusmodi haec herba est. Sed Dioscorides, & Nicandri interpretes testem citans Theophrastum, folio illud aiunt esse Amaraci: cuius solum Balsamitae nequaquam simile est.

- 2 MINOR Balsamita colore, odore, sapore & flore in umbellis aureo, maiore refert: cauliculos promit numerosos, tenues, rotundos: folia parva oblonga, serrata, ac profunde incisa;





*incisa; coniam aurei coloris, sed corymbos minores: radices
viti prioris. Rarior hæc est, nec alibi quàm apud cognitionis
herbarum studiosos reperitur. Floret eodem, quo præcedens
tempore. Balsamita haud dubio species minor est.*

ITALI *Giulam* vocant: *Valerius Cordus* *Mentham*
Corymbiferam minorem appellat: priorem verò *Mentham*,
Corymbiferam maiorem. Plerique *Eupatorium* *Mesues*:
alij *Dioscoridis* *Ageraton* esse volunt. *Eupatorium* autem
Mesues idem cum *Auicennæ* *Eupatorio* est: vires etenim
utrobique eadem: sed formæ descriptio in utroque auctore
corruptissima: ut satis ostendunt *Auicennæ* exemplaria, cuius
posteriora ex *Bellunensis* correctione, à prioribus hoc loco
multum differunt. *Eupatorium* autem *Auicennæ* à *Diosco-*
ridis *Eupatorio* nequaquam differt; quod vulgo *Agrimonia*
nominant herba ea notissima est, cum qua *Balsamita*
minor, siue *Giula* similitudinis nihil aut perexiguum habet.
Ageraton verò hanc herbam esse, non est quoque verisimile.
Nam *Agerato* folia *Dioscorides* tribuit *Origani*: at *Origa-*
ni folium subrotundum est: huius verò longum & ferra-
tum, ab *Origani* forma multum differens; quod *Giulam* &
Ageraton dissimiles esse stirpes ostendit.

CÆTERVM *Balsamita* utraque calida & sicca est
secundo ordine, cum amaritudine & adstringendi haud ob-
scura facultate. Auxiliatur foliorum eius quam *Conseruam*
appellant, diuturnis capitis doloribus matutino tempore
sumpta: defluxiones è capite reprimit ac resiccant: crudos
humores ad concoctionem perducit. Prodest item *Cacexia*
aut *Leucophlegmatia* laborantibus, præsertim in initio; ac
omnibus quibus iecur debile ac refrigeratum est. Semen
non secus ac *Santolina* lumbricos & ventris tinea expellit.

REMB. DODONÆI

AD LECTOREM

EPILOGVS.



VANDO eam stirpiū quam concepimus historiam non elementorum serie, sed alia methodo, per genera videlicet digerere, propositum esset, amice Lector, omni studio ac diligentia annisi sumus, stirpes ipsas in generalissima quædam genera distribuere, ac per communissimas differentias diuidere: diuisas in libros aliquot disponere; singulis libris non modò vnus generis, sed consimilium generum complures, suo ramen quæque ordine congerentes. In vno siquidem, flores herbasque coronarias, odoratas, tum & umbelliferas coniungere curæ fuit: in alio radices, *καθαρκτικάς* siue purgandi vi præditas, omnes excedentem qualitatem habentes, cuiusmodi sunt deleteriæ & somnificæ, ac alias nonnullas. In frugum historia, præter frumenta, leguminaque, frugum vitia, palustres & aquatiles complexi sumus. Proximus locus oleraceis relictus est: posterior arboribus ac fruticibus. Concessa etiam pars est, inconditæ multitudinī, quæ ad prima illa, commodè referri non potuit genera.

Sic autem digestam historiam, & iam olim vernaculo Brabantorum sermone, nec non Gallico idio-

co idiomate editam , dudum in animo fuit Latine conscriptam dare , sed dum impendentia negotia conatus nostros remorantur , nec integram mox absolueri conceditur , proximum fuit per otium particulatim ipsam exhibere ; vt in præfatione, frumentorum , leguminum , &c. historię latiùs scripsimus.

IT AQVE & nunc non opus totum , sed denuò partem eius , florum videlicet , & coronariarum , odoratarumque nonnullarum herbarum , historiam legendam communicamus. In qua flores quidem omnes , in coronas ac sarta receptos , tum & reliquos , qui propter eam , qua placent gratiam in hortis feruntur colunturque , contraximus : perpaucis admodum exceptis.

FLORES autem nomino eas stirpes , quæ propter flores commendatæ ac gratæ sunt: veluti radices Theophrastus appellat , quarum præcipuè in radicibus vires sunt ; herbas verò , in folijs eas habentes.

OMISSI autem & præteriti illi modo flores sunt , qui ad alia stirpium genera spectare videbantur : vt quam nostri Rosam Menapiam , siue Geldrensem nuncupant , Rhododendron , Rosa fera siue Hyemalis dicta , & tales pleræque ; quæ ad consimiles , quarum species sunt , aptiùs referuntur.

ROSA etenim Menapia Sambuci aquatici siue palustris species est , floribus multiplicibus , & in globum mali magni magnitudine coactis , ab

alia vulgari flōres in umbellis faciente solum differens . Appellat hunc fruticem Valerius Cordus *Lycostaphylum* , & utramque speciem eleganter describit : feminam nuncupat , cui flores in umbellis ; marem multiplicibus flosculis , qui sterilis est.

RHODODENDRUM frutex similiter est, quem inter flores numeratum nusquam observare contigit.

ROS A hyemalis aut potius Autumnalis , Maluæ sativa species est , quæ ad oleracea genera pertinet.

ANEMONES simili de causa prætermissæ ; ex
Anemone. acrium etenim herbarum genere sunt, Ranunculis haud multum absimiles . Vnius tamen hîc iconem addidimus, sativæ nempe siue hortensis à Dioscoride nuncupatæ . Depingit Matthiolus tres aut quatuor sativas , radicibus oliivis stantibus similes ; folijs multis , multifidis . Sed hæc nostra folia habet perpauca , Coriandri & Ranunculi cuiusdam palustris similia : flores verò pulchro quasi diluto rubore purpureos , aspectu gratissimos : radicem unius anni , oliivæ supinæ ac iacenti similem , non nihil geniculatam ; vetustiore verò , omnino nodosam , ex multis veluti oliivis supinîs congestam . Nascitur hæc in Germania nonnullis circa Rhenum locis . Floret non primo Vere , sed serius . Sylvestrem eius speciem Theophrastus *λειμώνιον* , id est , palustrem nominat . Floret hæc statim primo Vere . Fuchsius eam olim pro Ranunculi specie depinxit . Sunt qui Ranunculum phragmitem
voci-



vocitent . Flores eius aut lutei , aut candidi , aut purpurei .

H V I V S autem historiæ editionem dum paramus , duarum ecce rarissimarum stirpium , & ad hanc operis partem pertinentium , ad nos icones dantur , Chrysanthemum videlicet Perunianum , & Asphodeli palustris . Chrysanthemum Perunianum nobis communicavit integerrima ac honestissima domina Christina Bertolfia , à charissimo coniuge suo , clarissimo ac amplissimo viro D. Ioachimo Hoppero Regis consiliario ex Hispania sibi missam . Asphodeli autem palustris , misit multis modis ornatissimus ac nobilissimus D. Carolus à S. Audomaro , dominus de Dranoutre , vir non modò stirpium , verùm & historiæ animalium omnium studiosissimus , idemque peritissimus . Vtramque autem huic libro , coronidis vice addendam putauimus . Nequaquam enim tam celebris & admirandæ magnitudinis floris imago ; aut tam peregrini Asphodeli , prætermittenda videbatur .

E A D E M verò occasione & aliarum quarundam rarissimarum icones adiunximus prius non editas ; utpote Cirsij , Campanæ Lazuræ à recentioribus appellatæ , Panici Indici , & cuiusdam speciei Panacis ; quas stirpes , licet ad hanc florum historiam non pertineant , in notitiam tamen adduci incommodè accidere non potest . Stirpium siquidem cognitionem angeri non modò pulchrum iucundumque , verùm utile ac honestum .



Chrysan-
themum
Perunianũ.

EST autem Chrysanthemum Perunianum annua quidem, sed admodum proceræ stirps : flos pulcher & insolitæ magnitudinis . In Peru , alijsque quibusdam Americæ prouincijs repertum fertur . Satum Madritij apud Hispanos in horto Regio , ad pedes vsque 24. adoleuit : caulem promit rectum , brachij crassitudine : folia latissima : florem Chrysanthemo aliquatenus forma similem , sed amplissimum . Medius siquidem eius discus siue orbis pedem latitudine ad duas aut tres uncias excessit , singula verò ipsum orbiculariter ambientia folia , floris Lilij purpurei maioris quodammodo similia , sed maiora , auri luteo colore . Solem Indianum , quòd Solis modo radiatus videatur , appellant . Visa hæc nobis stirps est in horto amenissimo , ac variarum plantarum generibus refertissimo magnifici ac generosissimi D. Ioannis Brancionis , viri stirpium vatietatis studiosissimi , cuius liberalitate ac beneuolentia , non pauci flores huic historiæ accesserunt , qui aliàs non fuissent additi ; vtpote quos temerè alibi , quàm in eius hortis , quærere fuisset . In huius dico horto , Chrysanthemi Peruniani stirps visa est , sed ad 10. aut 11. tantum pedes adoleuit : folia aliquantulum aspera , eius quod in Hispanijs natum fuit multò minora : floris non nisi rudimentum apparuit , idque hyeme imminente ; qua de causa ad perfectionem peruenire non potuit . Eadem verò stirps Patavij in Italia multò quàm in Hispania procerior facta fuit ; ad pedes etenim x l. siue palmos Geometricos c x x. adoleuit ; & florem quidem perfecit , sed semen ad maturitatem non perduxit , vt ab

•••••


excellentissimo viro Iacobo Antonio Cortuso Patritio Patauino in simplicium palæstra exercitatissimo ac doctissimo accepimus; in cuius amœnissimo viridario enata fuit; qui etiam facultates huius cognoscere maximè curæ habuit. Nam pediculos foliorum teneros adhuc, pilisque derasis, in craticula decoctos, sale oleoque prius præparatos, esui suaues, & per quàm gratos esse, euidenti experimento cognouit; & similiter ipsos quibus floris foliola semenque insident calyces: quos & ipsius Cinaræ conis siue capitibus delicates suauioresque in cibo esse scribit, & non minùs, verùm amplius, *πρὸς τὰ ἀποδίσια*, ad quæ plurimum possunt, facere. Qua in re industria ac diligentia eius commendari ac laudari satis non potest, dignus certè est, quem omnes docti, ac simplicis Medicinæ studiosi venerentur ac colant: cum propter diligentiam & industriam, quibus in simplicium rarorum & peregrinorum facultatibus perquirendis utitur: tum vel maximè, quòd conatus multorum, qui circa hanc Medicinæ partem laborant, ingenuè etiam adiuuare conetur, & quàm plurimum non rarò adiuuet, eorumque studia multum promoueat. Veluti ex ipsius P. A. Matthioli commentatijs omnibus notissimum est, qui ipsius Cortusi opera maximum incrementum & haud exiguum splendorem sumpserunt: uti pluribus locis Matthiolus ipse candidè testatum reliquit. Potuissent & idem quoque historiæ nostræ testari, si absolueret & ad finem perducere eas licuisset. Non pauca siquidem ab eo & rarissima & valde peregrina accepimus, quæ reliquis partibus, quibus

seruantur , non exiguum auctuarium conferent , si aliquando eas absolnere ocium fuerit . Sed ad Chrysanthemum Perunianum excurrens redeat sermo . Existimari autem posset hic flos Plinij esse Bellio , si credibile foret , illa ætate Romæ vel visum , vel vlllo modo agnitum ; per ambitum siquidem luteus est , & plus quàm quinquaginta folijs , medius eius orbis cingitur . Talem etenim Plinius Bellionem esse , videtur innuere , lib. 21. cap. 8. Luteus, inquit, Bellio patulicantibus quinquagenis quinis barbulis coronatur . Sed verisimilius Bellionem omnino alium & minorem fore , & fortassè eundem cum Bellide ; vt non pauci eruditi suspicantur ; qui hunc Plinij locum corruptum iudicant.

Asphodelus palustris.

ASPHODELV S palustris folia promit pulchrè virentia , aliquantulum striata , Iridis aut Gladioli similia , sed angusta & dodrante breuiora : caulem rectum pedalem, Asphodeli satis similem : flores è senis foliolis , exiguis staminibus in medio , veluti Asphodeli ; minores tamen , colore è luteo pallentes : semen perexiguum in oblongis acuminatis vasculis : radix longa , geniculata ; non absque fibris , serpit Graminis modo . Reperitur huiusmodi Asphodelus locis humidis ac palustribus in Ericetis , haud procul à Brugis Flandriæ . Æstiuis mensibus floret . Anonymos vulgo est . Asphodeli esse speciem caulis cum floribus Antherico similis ostendit ; tametsi folia Gladioli sint , aut Iridis.

CIR-





Cirsion.

CIRSION ex Carduorum generibus est : folia habet oblonga, Lactuæ folijs quasi similia : verum acuminata, Buglossi vulgaris candidiora, per extrema aculéara & aliquantulum crenata : caules rectos duorum cubitorum in plures diuisos, in quorum singulis capitulum eminet hispidum, quod posteaquàm flos emarcuit, deorsum reflectitur, & tandem in lanugines resolvitur : flos ex multis staminibus, pulcher, colore purpureo rubet : semen oblongum, splendens, aliorum carduorum simile, sed quàm multorum minus : radix oblonga, in duas aut tres diuisa. Belgio peregrinum est, & aliundè in hortos illatum. Fertur alicubi in maritimis locis exire. Floret æstiuo tempore, aliter à quo fatum est anno. Matthiolus Cirsion etiam quoddam depingit, folijs ab isto haud multum differens, sed floribus in exiguis capitulis multis simul congestis ; aliter omnino quàm istius, cuius flores, vt diximus, singulares sunt, & è maioribus capitulis exeunt.

Campana
Lazura.

CAMPANA Lazura Conuoluuli species est, Belgio & alijs multis prouincijs peregrina. Folia eius lata, angulosa, vetustis & angulosis hederæ folijs maiora, non læuia, verum aliquantulum hirsuta : cauliculi teneri, qui appositis iuxta pedamentis ac perticis in altum scandentes se circumuoluunt : flores calathi figura, Smilacis læuis ferè similia, sed per oras angulosi, colore in cæruleo purpurei. Plerique Campanam cæruleam ea de causa nominant. Videtur Ligustri non fruticis, sed alterius, cuius veterum nonnulli meminere, species.





cies. Huius etenim Ligustri duæ sunt : vna flore candido , altera nigro.

ALBÆ Ligustri meminit Vergilius ecloga secunda, hoc carmine:

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.

Item & Martialis Epigrammatôn lib. primo , scribens in Procillum:

Quadam me cupit inuide Procille

Toto candidior puella Cygno,

Argento, niue, Lilio, Ligustro.

Nigri verò mentionem fecit Columella lib. 10. in hortis.

Fer calathis Violam, & nigro permista Ligustro

Balsama cum Casia nectens.

NIGRVM autem istud Ligustrum , Campana putatur esse Lazura siue cærulea . Nam è cæruleo purpureus color , etiam niger subinde nuncupatur : veluti Violæ nigræ . Ligustrum autem album huius generis Smilacis lævis flos est ; qui vilis nulloque colligente perit , quam ob causam cum cadere Virgilius scribit.

NON minus , immo magis peregrinum Panicum
cum Indicum nuncupatum est , culmos id promit Indicum.
crassos 8. aut 9. pedes altos , crebrò geniculatos ; folia è singulis nodis arundinacea , magna , lata , spicas siue verius paniculas crassas , densè compactas , breuiiores quidem quàm legitimi Panici, sed tamen crassiores ; quæ non è summo tantùm , sed ex sinubus foliorum , breuioribus ac tenuioribus veluti culmis insidentes exeunt : semen oblongum capillaceis glumis implicatur : radices vt similium fibrosæ



fibrosæ ac firmæ. Sub finem ætatis, etiam si feruens calidaque fuerit, maturitatem semen in Belgio vix consequitur : in calidioribus regionibus melius proficit . Panici speciem esse ipsa densè compacta panicula ostendit.

PANACIS species folia edit nonnihil hirsuta Panacis species.
asperaque, & terræ proxima, ampla & multiplicia, inque plura alia diuisa; circa caules verò contractiora & pauciora; quorum singulatia, ex quibus totius folij compositio, oblonga sunt, lapathi folijs quadantenus similia, sed tamen minora : caulem trium aut quatuor cubitorum in ramulares adnascentias superius diuisum : flores in umbellis suprâ eminentibus, luteos : semen inde latum, subflauum : radix longa est & candida, quibusdam locis veluti genicula habens. Floruit in Belgij hortis Iulio & Augusto . Panacis esse speciem constare videtur : semen etenim ex quo primum hic enata in Panacis lachryma (Opoponax nuncupatur) repertum fuisse à fidissimo ac diligentissimo pharmacopœo Antuerpiensi Petro Coldenbergo accepimus.

PANACES autem, auctore Theophrasto lib. 9. multiplex est. Quoddam in Syria nascitur : deinde & alia tria sunt, Chironium, Heraclium, & Asclepion, quæ à Dioscoride solum describuntur. Præter hæc & vnum est πλατύφυλλον siue latifolium; & alterum λεπτόφυλλον tenuifolium; ita vt in vniuersum sex à Theophrasto Panacis species referantur . Cum primo autem istorum vel cum Chironio conuenire præsens posse videtur , cum reli-



quis verò minimè . Heraclium siquidem folio est amplo, magno, ad ficulnea accedente : Asclepium verò Thapsiæ, aut vt Dioscorides ait, fœniculo simili . Istud verò nec huius, nec illius, sed omnino alterius formæ, neque ad ficus, neque ad Thapsiæ, aut fœniculi accedente . Rursus Panaces latifolium Centaurium magnum; tenuifolium verò Centaurium minus non temere esse putatur . Teste siquidem Plinio, Panaces à Chirone repertum, Centaurium cognominatur . Et Theophrastus Centaurij maioris aut minoris non meminit . Ex his apparet, nullum istorum quatuor, hanc Panacis speciem esse . Quòdnam verò ex reliquis duobus sit, certò etiam affirmari non potest; cum propter auctorum breuitatem; tum eorundem varietatem . Syriacum quale sit, Theophrastus non describit: Plinius illud esse ait lib. 12. cap. 26. folijs ampla Plinij error magnitudine rotundis: sed suspicio est, hæc ex Heraclij descriptione desumpta fore . Lib. etenim 25. cap. 4. Heracleoticum Origanum pro eo perperam supposuit . Chironium Theophrasti exemplaria & Plinij, folio tradunt Lapathi; Dioscoridis verò & Nicandri interpretis Amaraci . Expende Lector, & quæ magis lectio probanda veniat, cogita . Si Chironium folio est Lapathi, poterit istud Chironium esse : singularia eius siquidem folia, Lapathi similia esse scripsimus : si verò Amaraci, haud erit; sed Syriacum esse consequetur, quod verissimum videtur . Effundit etenim lachrymam, si caulis eius æstiuis mensibus, Sole feruente vulneretur : quod Syriacum facere Plinius apertè scribit, Theophrastus innuit; quam Chironium reddere nusquam

scriptum reperitur. Est autem lachryma hæc Oponaci colore similis, sed nullius aut exigui apud nos odoris, quod propter soli frigiditatem accidit. In calidis siquidem regionibus omnia odoratio-
ra; in frigidis verò minus odorata gignuntur, ut Theophrastus testis. Et de his hæcenus.

AT in florum historia, quid à nobis præstitum sit, qui æquum adhibiturus est iudicium, facile æstimabit. Nos ut in aliorum scriptis, sicubi veritati minus nitantur, eleuandis, nullis aut exiguis verbis utimur; ita in nostrarum lucubrationum commendatione non putamus inhærendum. Bene vale, Pridie Cal. Nouemb. Anno 1567.

F I N I S.

Hic liber nihil habet Romana Ecclesia fidei contrarium, aut Reipub. offensuum.

Quod attestor Sebastianus Baer, Delphinus, insignis Colleg. Eccles. S. Mariæ Antuerpiens. Plebanus.

H V I V S L I B R I

I N D E X.

A

A Cinos.	278	B	
Acoros.	155	Baaras.	116
Acroscorodon.	171	Baccaris.	279. & 284
Adonidis flos.	236	Balsamita.	286
Aegilops.	171	Baptifecula.	51
Ageraton.	289	Barba hirci.	222
Aglaophotis.	114	Barbarica.	66
Alabastri.	99	Basilicum.	275
Albucus.	137	Basilicum satyrium.	216
Alifina.	76. & 220	Bellis.	245
Allium caninum.	173	Bellio.	298
Alopecuros.	34	Betonica coronaria.	66
Amarantum.	249	Bifolium.	220
Amarantus purpureus.	89	Bolbocastanon.	129
Amaracus.	257	Bolbonac.	25
Anemone.	237. & 292	Bucinum.	56
Anthemis.	227	Bulbine.	171. & 173
Anthera.	99	Bulbus esculentus.	169
Anthericos.	137	Bulbus leucanthemus.	176
Antirrhinum.	82	Bulbus sylvestris.	179
Antirrhinum sylvestre.	84	Bulbus vomitorius.	187
Aphricanus flos.	60	Bupthalmum.	230. & 237
Aquileia.	80	Buzeiden.	219
Aquilina.	ibidem	C	
Armerij flores.	66	Calathiana Viola.	34
Afarum Crataegæ.	285	Calendula.	57
Asperugo.	132	Callionymos.	132
Asphodelus.	135	Caltha.	57. & 241
Asphodelus bulbosus.	140	Caltha Alpina.	59
Asphodelus luteus.	138	Camomilla.	227
Asphodelus palustris.	298	Campana lazura.	300
Astragilitis iris.	150	Campanula.	36
Aurelia.	249	Canina fentis.	100

I N D E X.

Canis cerebrum	82	Cotula alba	229
Cantabrica	66	Cotula foetida	228
Cassia	264	Corula lutea	231
Caryophyllei flores	64. & 66	Crocus	164
Caryophyllus Indicus	60	Cuminum sylvestre alterum	
Centrum Galli	279	56	
Cepa agraria	180	Cyanus flos	49
Cerucaria	31	Cyanus maior	51
Chamaecyparissus	254	Cyix	171
Chamaeiris	149	Cynosorchis	201. & 214
Chamaemelū odoratum	232	Cynobatos	101
Chamaemelū Romanum	234	Cynospastos	114
Chamaemelum sylvestre	228	Cynorhodon	123
Chamaemelum vulgare	225	Cypirus Plinij	157
Chironium panaces	286	D	
Chrysanthemum	231. & 243	Damaconium	76
Chrysanthemum odoratum	232	Damaconium nothum	77
	232	& 79	
Chrysanthemum Perunia-		Delphinium	55
num	294	Desiderium	74
Chrysis	251	Dichomenion	114
Chrysocome	251. & 249	Digitalis	40
Cirsion	300	Digitis citrini	219
Cistus	105	Dulcisida	114
Clauellata herba	18	E	
Cleonicon	261	Elichryson	247
Clinopodium	259	Empetron	271
Cneorum	264	Entaticos	214
Color ferrugineus	125	Equitis calcar	53
Color filis Artici	15	Eranthemum	235
Comosandalus	121	Eupatorium Mesuae	286
Concilium	39	F	
Confiligo	239	Ferrugineus color	125
Consolida media	247	Flores Armetij	68
Consolida minor	246	Flos Adonidis	236
Constantinopolitanus flos	72	Flos Aphricanus	60
Cornicis flos	ibid.	Flos caryophylleus	64
Corymbe	45	Flos Constantinopolitanus	
Costus hortensis	286	72	

Flos

I N D - E X.

Flos Cornicis	72	Intybum agreste	47
Flos Cyanus	49.& 51	Iouis flos	44
Flos frumentorum	51	Iris	142
Flos Hierosolymorum	74	Iris Astragalites	150
Flos Iouis	44	Iris bulbosa	163
Flos micancalus	49	Iris Illyrica	149
Flos petilius	62	Iris lutea	153
Flos Pothus	74	Iris sylvestris	151.& 153
Flos regius	53	Iris sylvestris lutea	155
Flos solis	109	Iris tenuifolia	148
		Iunonis Rosa	118
G			
Gallitricum	279	K	
Geminalis	282	Keyri	21
Gilarus	273	L	
Githago	49	Ladanum	108
Gith ex segete	ibidem	Lanaria	74
Giula herba	289	Lassulata herba	286
Gladiolus	157	Lanaudula	263
Gratia Dei	109	Lauria	273
		Lectipes	261
H			
Hastula regia	137	Ledon	108
Helianthe	109	Leo	84
Helianthemum	ibidem	Leucanthemum	227
Helleborastrum	240	Leucanthemum odoratū	232
Hemerocallis	121.& 130	Leucoion album	19
Herba casta	114	Leucoion bulbosum	191
Herba clauellata	18	Leucoion luteum	21
Herba D. Mariæ	286	Lilialis	146
Herba lassulata	286	Lilium	118
Herba simonina	82	Lilium cæruleum	36
Herba Trinitatis	18	Lilium consuallium	133
Hieris	146	Lilium non bulbosum	128
Hierobulbus	163	Lilium purpureum	121
Hirci barba	222	Lilium sylvestre	126.& 128
Horminum	282	Linaria	87
		Lingua ceruina	157
I			
Iacea	18	Lunatia	27.& 114
Iasione	39	Lunaria Græca	27
Idæus dactylus	114	Lunaris	114
		V 4	Lupā

I N D E X.

Lupi	146	Ocellus Damascenus	ibid.
Lychnis coronaria	42.& 44	Ocimastrum	47.& 178
Lychnis sylvestris	43.& 47	Ocimoides	278
Lychnitis	42	Ocimum	273
Lycepergium	63	Ocimum sylvestre	276
Lycollaphylos	292	Oculus Christi	44
Lysion	76	Oculus bouis	230
	M	Opalis grata	82
Maiorana	255	Ophris	220
Mariana Rosa	44	Orchies	201.& 214
Mariana Viola	27	Orninalis	214
Martagon	128	Ornithogalon	178
Marum	235.& 257	Orontium	86
Marum vulgare	259	Ornala	279
Matricaria	230	Osyris	38.& 89
Matrifalua	279	Othonna	62
Medion	29		P
Melandrium	231	Pæonia	110
Melanthium ex Tritico	49	Palma Christi	219
Menion	114	Panaces Chironium	286
Menogonion	ibidem	Panacis species	305
Mentha corymbifera	289	Panicum Indicum	304
Mentha Græca	286	Panion	214
Mentha Sarracenicæ	ibidem	Parthenium	230
	N	Petilius flos	74
Narcissus	180	Phyteuma	86
Narcissus luncifolius	187	Pneumonanthe	36
Narcissus luteus sylvestris	189	Pothus flos	74
Narcissus Marcelli	186	Pseudo acoros	155
Narcissus medio luteus	183	Pseudo iris	153
Narcissus medio purpureus	181	Pseudo Melanthium	49
		Pseudo Narcissus	189
Nardus Italica	264	Pseudo orchis	220
Nardum rusticum	284	Pulegium montanum	269
Naronica radix	146	Pytion	171
Nautica radix	156		R
Nigellastrum	47	Radix nautica	156
	O	Rapum sylvestre	27.& 31
Ocellus	66	Rapunculum	33
		Regium	

I N D E X.

Regium	275	Seranium	177
Regius flos	53	Silis attici color	15
Rhaphanitis Iris	149	Singentiana	156
Rhizotomos Iris	ibid.	Sinapi persicum	27
Rhododendron	292	Silymichium	159. & 161
Rosa	92	Solsequium	59
Rosa canina	100	Spatula	146
Rosa cæli	44	Spatula fœtida	151
Rosa dominarum	ibid.	Spica	264
Rosa fatuina	114	Sticas citrina	251
Rosa Græca	45	Stœcas	265
Rosa hyemalis	292	Stœcas citrina	249
Rosa Iunonis	118	T	
Rosa Menapia	291	Tanacetum Perunianum	60
Rosa syluatica	107	Taura	45
Rosinarius coronarius	261	Testiculus canis	201
S		Testiculus hirci	210
Salvia Romana	286	Testiculus leporis	208
Sampfychum	255. & 257	Testiculus Morionis	205
Santolina	253	Testiculus odoratus	213
Santonici semen	254	Testiculus Serapias	210
Saponaria	47. & 74	Thlaspi Crateuæ	27
Saxifragon	271	Thryallis	42. & 44. & 53
Satyrium	199. & 214	Thymum	267
Satyrium basilicum	216	Thymum capitatum	268
Saxifraga	271	Thymum durius	ibidem
Scarlata	70	Thyrus	78
Scarlea	279	Tinearum	251
Scleara	ibidem	Tora	45
Scorzonera	222	Tota bona	279
Selenion	114	Tragopogon	212
Selenogonion	ibidem	Tragorchis	208
Semen sanctum	254	Tricolor Viola	16
Semen contra lumbricos,		Trifolium Satyrium	199
ibidem		Trinitatis herba	18
Serapion	114	Tulipa	196
Serpentaria	225	V	
Serpillum	271	Vaccinium	15. & 168
Serpillum vulgare	269	Veneræ radix	156
		V 5	Venusta

INDEX.

Venuſta minor	82	Viola Mariana	27
Veratrum nigrum	237	Viola matronalis	23
Vettonica coronaria	66	Viola nigra	13. & 14
Viburnum	99	Viola parietina	23
Victorialis rotunda	157	Viola peregrina	25
Victorialis longa	159	Viola tricolor	16
Viola alba	19. & 21	Violaria	14
Viola alba bulbosa	193	Viperina	225
Viola arboreſcens	21	Vnguentaria	156
Viola Calathiana	34	Vniſolium	133
Viola flammea	18	Vrinalis	87
Viola hyemalis	25	X	
Viola lauiſolia	26	Xyris	152

ERRATA.

Pag. 8. lin. 10. palabundos 18. 25. quod φλόγιστ.
 19. 20. Micancalum. 51. 5. digeſtis. ibidem. 7. Cen-
 taurij. 62. 11. Orhonnam. 82. 14. ei videlicet cui.
 109. 30. Chironium. 155. 23. amaras. 162. LIRIVM
 MAIVS. 180. 9. nuncupatus. 188. IVNCIFOLIVS.
 202. ALTER. 227. 9. familiare. 236. 13. ἡράνθισμον.
 287. MINOR. 288. MAIOR. tranſpoſitæ ſiquidem his
 locis imagines ſunt. 300. 28. ſimiles.

INDEX GRÆCARVM

VOCVM.

A

A γλαφοντις
ἀγριοκάσων

ἀθάνατος

ἄκινος

ἄκορος

ἄκυλάνιον

ἀμάραντον

ἀμείβυσος

ἀνακτόριον

ἀνάρρινον

ἀνεμωνή

ἀνθιμὺς

ἀνθεων φυλλῶδες

ἀνθριπκός

ἄρθος τῶν ῥόδων

ἀντίρρινον

ἄνυδρος

ἄριον

ἄσφδελος

ἄτόκιον

ἄυτογενὲς

ἄφροδίσις

B

Βάκχαρις

βαλλάριον

βασιλικὸς

βειπόνικη

βολβοκάσων

βολβίγη

βόλβος ἀμειβικός

βόλβος ἐμειβικός

δε 189

βουκρέμιον

114

179 γιρανοπόδιον

45

278 γογγύλη ἄχρεια

156

45 δίαχυστις

91 δίαχυτος

82 δελφίνιον

157 διὸς ἄνθος

82

292 ἐλιδόχρυσον

227 ἐλίχρυσον

49 ἔμπετρον

137 ἐρυθρόνιον σατύριον

99

82 ἡμεροκαλλίς

184 ἡράνθημον

157

137 θαυμαστός

47 θειωίδη

184 θισδόνιον

156 θρυαλλίς

θύμος

284 θύμος κεφαλῶτός

45 θύμος σκληρότερος

275 θύσσιον

66 θύρσος

179

169. δε 171 ἱαστιώνη

131 ἱερακοπόδιον

184 ἱέρις

ἱεροβόλβος

82 ἱόν πορφυρεῶν

Γ

45

114

30

Δ

56

ibid.

55

44

E

249

ibid.

273

199

H

121. & 130. 131

227. & 236

Θ

146

ibid.

114

41. & 44

268

268

ibid.

ibid.

78

I

38. & 39

47

146

163

14

ἱέρις

		I N D E X.	
ἔρις		146 λευκότον	11.&169.&193
ἔρις ἄγρια		151 λευκότον μήλιον	13
	K	λάδον	108
καθαίρων		146 λιθωνατίς σιφανωματική	161
κακίος		152 λιμοική	157
κακός		ibid. λυχνίτης	41.&44
καλλείριον		118 λύκοι	146
κάμαρος		56 λυχνίς ἄγρια	47.&82
καρπῶς		87 λυχνίς σιφανωματική	44
κίτρου		66 λυχνίτης	ibid.
κίρσιον		300	M
κίτρες ἢ κίτθος		107 μαλδίον	45
κλιτοπόδες		161 μάρον	157
κομή		112 μαχαιρόφυλλον	157
κομοσάνδωλος		116 μαχαιρώσιον	ibid.
κορύμβιον		45 μελάνθιον ἐκ τῶν πυρῶν	49
κρινάνθειμον	118.&	131 μελάνσιον	14
κρίνον		118 μονόφυλλον	134
κρίνον ἄγριον		131	N
κρίνον πορφυρεῶν		121 Ναρκίσσος	184
κρινώνεια		118 Νηριάδιον	16
κρόνιον		56 Νήριον	ibid.
κρόκος		165	Ξ
κύβηξ		171 ξίφιον	157
κύμινον ἄγριον		56 ξυρίς	152
κυανθιμίς		230	O
κυανόσπερη		ibid. ὄθωνα	62
κυτοκοφάλιον		82 ὄκειμεν	175
κυτόροδος		100 ἐπερτρέτης	146
κυτόσθασον		101 ὄρμιον	181
κυτός ὄρχις	101.&	104 ὄρνιθόζαλον	178
κύπινος		107 ὄρχις	101.&114
	A	ὄρχις σιραπίας	111
λάδον		108 ὄσυρίς	89
λάδανον		ibid. οὐράνεια	146
λαμπάς		47	Π
λαίριον	118. 163.&	184 παιότια	114
λαίριον ἔπερον		163 πάχχαρις	184
λευκάνθιον		117 περήμεσις	56
			πίπων

I N D E X.

πειτών	169, & 199	πρώτων	212
πειθήκων	82	πρώτων	208
πόθος	74	πρώτων	31
πορφυρεοίς	123, & 131	Υ	
Ρ		υάκων	56, & 123, & 168
ρῶσθρον	107	υάκων	107
ρῶδον	98	υάκων	257
ρῶδων	ibid.	Φ	
Σ		φάσγανον	157
σαμψύχον	255	φλόγος	18
σαξίφραγος	271	φλόξ	ibid.
σαξίφραγος	ibid.	φύπωμα	86
σατύριον	159	Χ	
σατύριον βασιλικόν	216	χαμαίμελον	217
σισυρίχων	161	χρυσάνθεμον	217, & 243
σκῆπτρον	45	& 249	
στίχως	267	χρυσόκομη	251
στοίχως	ibid.	Ψ	
σώσανδρον	56	ψιχότροπον	66
Τ		Ω	
τέριον	45	ώκισσιδὺς	41, & 47
τεκτόνα	47	ώκισσι	275

PRIVILEGIUM CÆSAREVM.

MAXIMILIANVS II Diuina fauente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus; Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ & Sclauoniæ, &c. Rex; Archidux Austriæ; Dux Burgundiæ, Styriæ, Carnithiæ, Carniolæ, & Wirtēbergæ; Comes Tyrolis &c. Recognoscimus & notum facimus tenore præsentium vniuersis: inter alia maiorum nostrorum consilia, illud haud postremum fuisse comperimus, vt ad Imperij Romani decus & dignitatē plurimum facere arbitarentur, nō minus rem litterariam, quàm militarem disciplinam propagare: quod litterarum monumentis, quidquid fortiter & præclare gestum esset, illustrari cognoscerent, & æternæ memoriæ consecratum ad posteros ita transmitti, vt tam exteris quàm domesticis populis, exemplo ad virtutē esse posset: quodque optimarum artium studia, & quidquid ad humanæ vitæ cultum atque vtilitatem in quaque arte fuisset excogitatum, litteris & contineri & conseruari optimè didicissent. Illorum nos laudatis vestigiis insistere summo studio cupientes, dignum imprimis duximus prudenter & accuratè cauere; vt si quis ad eam rem quidquam vel industria vel laboribus & impensis suis cōtulerit, ne huic fraudi beneficium publicum sit. CVM itaque sincerè nobis dilectus Christophorus Plantinus ciuis & typographus Antuerpiensis nobis humiliter exponi curarit; se veteres nonnullos auctores, vel nunquam antea visos, & raros, vel emendatores, aliisque opera magni momenti; in primis verò Biblia Hebraica, Nouum Testamentum, Eunapium de vitis Philosophorum, Illustrium de poetis, Nonium Marcellum, Petronium Arbitrum, omnes veteres Poetas correctos vel commentariis illustratos: Emblemata Sambuci, Dictionarium Hebraicum, Dictionarium Græcum, L. Iulium Florum de Gestis Romanorum cum Commentatio Ioannis Stadii, & si quæ huius generis alia, vel antea non edita vel emendatiora, locupletiora, auctiora, & illustrata facta sunt, quacunque in lingua, imprimere cōstituisse: vti autem, ne, quod sæpenumero vsu venire consueuerit, alij non nulli, qui alieno labore & industria partis, fucorum more inhiare, & frui soleant, ea quæ ille magnis sumptibus & impensis collegit, & typis procuderit, mox ad suum cōpendium, minore sumptu & labore imitentur, atque effingant, illiue labor omnis,

nis, sumptus & impensæ, omne quoque lucrum & laboris præmium, atque adeo (quod dicti solet) oſtium & opera pereat: ideoque suppliciter à nobis petierit, vt contra huiusmodi improbos quorundam lucri cupidorum conatus, fraudem & iniurias, Priuilegij nostri prærogatiua munire illum dignaremur. Nos huiusmodi illius precibus æquis & iustis benignè annuentes, & prædicti Christophori Plantini honestos conatus promouete, atque indemnitati illius quàm maximè consultum cupientes, hoc publico edicto cantum volumus, & sancimus, ne quis cuiuscunque status, gradus, ordinis, aut conditionis fuerit, quacunque sacri Romani Imperij & ditioris nostræ fines patent, deinceps prædicta, aut alia quæcunque probatorum auctorum opera, quotquot vel hætenus nondum impressa, vel ab aliis quidē impressa, nouis autem deinceps scholiis, annotationibus, aut commentariis aucta & illustrata, præfatus Plantinus primus typis procuderit, intra proximum sexennium à prima cuiusque operis aut voluminis editione villo pacto eiusdem vel diuersi characteris forma excudat, aut excusa ab aliis intra nostros & Imperij fines vendenda importet, seu quouis modo distrahat manifestè vel occultè, sub pœna decem Marcharum auri puri, quarum dimidia fisco nostro imperiali fraudis vindici, residua verò pars prænominato Plantino cedat, præter librorum, sicut præmittitur, ad imitationem impressorum amissionem; quos idem Plantinus vbicumque locorum nactus fuerit per se, vel suos, adiumento magistratus loci, vel citra, propria auctoritate sibi vendicare inque suam potestatem redigere potest. In cuius rei fidem præsentis edicto manu nostra subscripsimus & sigillum nostrum apponi iussimus. Datum in ciuitate nostra Vienna Austriæ, die xxi. mensis Februarij, Anno Domini m. d. lxxv. Regnorum nostrorum, Romani, i. l. Hungarici, i. l. Bohemici verò xvi. l.

MAXIMILIANVS.

Ad mandatum sacre Cancellariæ
M. proprium.

Heller.

